

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

راميبيريل إينو فامد 2.5

راميبيريل إينو فامد 5

راميبيريل إينو فامد 10

أقراص

المادة الفعالة:

كل قرص من راميبيريل إينو فامد 2.5 يحتوي على:

Ramipril 2.5 mg

كل قرص من راميبيريل إينو فامد 5 يحتوي على:

Ramipril 5 mg

كل قرص من راميبيريل إينو فامد 10 يحتوي على:

Ramipril 10 mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 6. أظر أيضاً "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في الفقرة 2.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصحف هذا الدواء للعلاج من أمراض أخرى. لا تطهيه للأخررين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن جائزهم الطبي مشابهة لحالتك.

(1) لأى غرض مخصوص الدواء؟

الدواء مخصوص لمعالجة فرط ضغط الدم، لتخفيض خطرة حدوث نوبة قلبية أو سكتة، لتقليل خطرة أو إعاقة تفاقم مشاكل في الكلية (الدى متغلجين مع أو بدون مرض السكري)، لعلاج قصور القلب، للعلاج بعد نوبة قلبية مشتركة مع قصور قلبي.

الفصيلة العلاجية: خافض لضغط الدم، من فصيلة مثبطات ACE.

(2) قبل إستعمال الدواء: لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلية حيث يقل فيها تزويد الكلية بالدم - خلال الأشهر الستة الأخيرة من الحمل (أنظر فقرة "الحمل، الإرضاخ والخصوبة").

- إذا كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو غير مستقر. يتم هذا التقىمن قبل الطبيب.

- إذا كنت تعاني من السكري أو من خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وتناول دواء لانخفاض ضغط الدم يحتوي على أليسكرين. لا تتناول راميبيريل إينو فامد إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك. في حالة الشك، إستشر الطبيب قبل تناول راميبيريل إينو فامد.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بالدواء، إحدى الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في القلب، في الكبد أو في الكلية.

- كنت تعاني من فقدان الكثير من الأملأح أو السواطل (نتيجة تقييق، إسهال، زيادة التعرق، حمبة فقرة بالأملأح، تناول الأدوية المدرة للبول فترقة مطولة أو إذا اجتررت ديرلة).

- كنت مقدماً على إجراء لاج تقليل الحساسية للساعات النحل أو الديابير (إرالة التحسس).

- كنت مقدماً على تلقى مواد تؤدي خلال عملية جراحية أو علاج

الأسنان، من الحالات أن تناول الوعق عن العلاج بـ راميبيريل إينو فامد يوماً واحداً سيعيق استئصال الطبيب.

- نسبة البوتاسيوم في دمك (الدمة) سبب نتائج فحص الدم).

- كنت تتناول أدوية قد تؤدي إلى خفض نسبة الصوديوم في دمك أو تعاني من حالة طيبة قد تؤدي إلى خفض نسبة الصوديوم في دمك.

من شأن طبيك أن يوجهك إلى إجراء فحوص دورية لنسبة الصوديوم في دمك، خاصة إذا كنت مسنًا.

- كنت تتناول أدوية التي قد تزيد من خطورة حدوث رد فعل تحسسياً خطير سمي وذمة عاتية، مثل مثبطات mTOR (متلا: تيسميروليومس، إيفيروليومس، سيروليومس، فيلاجليتين، مثبطات نيرباليستين) (NEP inhibitors) (متلا: راسكاكوتريپ، ساكوبيرتيريل/فالساراتان، بالنسبة لـ ساكوبيرتيريل/فالساراتان، أنتظر أيضاً الفرقة "لا يجوز إستعمال الدواء").

- كنت تعاني من أمراض النسيج الضام مثل تصلب الجلد أو الذئبة (systemic lupus erythematosus).

- عليك إبلاغ طبيك إذا كنت تعقددين بأنك حامل أو من شانك أن تكوني حاملة. راميبيريل إينو فامد غير موصى به في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وقد يسبب ضرراً جدياً للجنين بعد الشهر الثالث (أنظر فقرة "الحمل، الإرضاخ والخصوبة").

- كنت تتناول إحدى الأدوية التالية التي تستعمل لخفض ضغط الدم: آدوية مشتبطة لمستقبل أتببيوتسين II (angiotensin-II receptor blockers، receptor blockers، المعرفة أيضاً بـ sartans).

- إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلى تتعلق بـ بـ أليسكرين.

- من شأن طبيك أن يجري فحوصات دورية للأداء الوظيفي الكلوي، لضغط الدم ولتناسب الأملاح في دمك (البوتاسيوم مثل). أظر أيضاً

فقرة "لا يجوز إستعمال الدواء".

الأطفال والمرأهقون: بالدم - خلال الأشهر الستة الأخيرة من الحمل، الإرضاخ والخصوبة".

- إذا كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو غير مستقر. يتم هذا التقىمن قبل الطبيب.

- إذا كنت تعاني من السكري أو من خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وتناول دواء لانخفاض ضغط الدم يحتوي على أليسكرين.

- لا تتناول راميبيريل إينو فامد إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك. في حالة الشك، إستشر الطبيب قبل تناول راميبيريل إينو فامد.

الاطفال والمرأهقون:

لا يوصى بإستعمال راميبيريل إينو فامد لدى أطفال ومرأهقين دون عمر 18 سنة لأن نجاعة وسلامة الدواء لدى الأطفال لم تحد بعد. إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك (أو في حالة الشك)، الرجاء إستشر الطبيب قبل تناول راميبيريل إينو فامد.

التعاطلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، لأن راميبيريل إينو فامد قد يؤثر على عمل أدوية أخرى وأيضاً أدوية أخرى قد تؤثر على عمل راميبيريل إينو فامد.

يجب إبلاغ الطبيب خاصة إذا كنت تتناول:

المشاركة مع الأدوية التالية قد تؤدي إلى تقليل نجاعة راميبيريل إينو فامد: أدوية لتخفيض الألم والإلتهاب (متلا: NSAIDs مثل إيبوبروفن أو إيندو-ميتاسين وأسيبرين).

- أدوية لعلاج ضغط الدم المنخفض، الصدمة، قصور القلب، الربو أو التحسس مثلاً إيفيدرين، نورأدرينالين أو أورينالين. على الطبيب متابعة ضغط دمك بحرص.

المشاركة مع الأدوية التالية قد تؤدي إلى زيادة احتمال حدوث أعراض جانبية: ساكوبيرتيريل/فالساراتان - دواء لعلاج نوع من القصور الكلوي المزمن لدى الكبار (أنتظر أيضاً الفرقة "لا يجوز إستعمال الدواء")

- أدوية لخفيف الألم والإلتهاب (متلا: NSAIDs مثل إيبوبروفن أو إيندو-ميتاسين وأسيبرين).

- أدوية لمعالجة السرطان (العلاج الكيميائي) ساكوبيرتيريل/فالساراتان.

- أدوية لمنع رضف سنج مزروع مثل سيكلوسيبورين.

- أدوية مدرة للبول مثل فوروسيميد.

- أدوية التي يمكنها أن تزيد نسبة البوتاسيوم في دمك مثل سپيرونولاكتون، ترياميتين، أمبوريدي، أملاك البوتاسيوم، تريميتوريم لوحده أو بمشاركة سولفامتيوكسازول (اللتونات) وهبارين (المتمييز)

- ستيرويدات لعلاج الإلتهاب مثل بريدينزيلولون (الدمل)

- أدوية لمنع رضف سنج مزروع مثل سيكلوسيبورين.

- تيسميروليومس، إيفيروليومس (لمنع رضف عضو مزروع)

- سيروليومس، فيلاجليتين (العلاج السرطان)

- راسيكاروتريپ، راسيكاروتريپ (مضاد للإسهال)

- من الحال أن يضرطط الطبيب إلى تغيير جرعتك الدوائية / أو يتخد

وسائل حذر أخرى إذا كنت تتناول أدوية متعدنة لمستقبل أتببيوتسين II (ARB) أو أليسكرين (أنتظر أيضاً الفرقتين "لا يجوز إستعمال الدواء" و "تحذيرات خاصة تتعلق بـ باستعمال الدواء").

المشاركة مع الأدوية التالية قد تؤثر على فعالتيها: أدوية السكري مثل الأدوية التي تعطي عن طريق الفم لتخفيض السكر والإنسولين. قد يقلل راميبيريل إينو فامد نسبة السكر في دمك، يجب

مراقبة ومتابعة نسبة السكر في الدم بحرص أثناء تناول راميبيريل إينو فامد.

- ليتوم (الذي يعطي للعلاج المشاكل النفسية). قد يؤثر راميبيريل إينو فامد إلى زيادة نسبة الليتوم في الدم، على الطبيب متابعة نسبة الليتوم بحرص أثناء تناول راميبيريل إينو فامد.

إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك (أو في حالة الشك)، الرجاء إستشر الطبيب قبل تناول راميبيريل إينو فامد.

استعمال الدواء والطعام:

يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

إن شرب الكحول أثناء العلاج - راميبيريل إينو فامد قد يسبب الدوار. إستشر طببك حول إمكانية شرب الكحول أثناء العلاج - راميبيريل إينو فامد، نظراً لأن الكحول يمكن أن يكون له تأثير إضافي على خفض ضغط الدم.

الحمل، الإرضاخ والخصوبة:

عليك إبلاغ طببك إذا كنت تعقددين بأنك حامل أو من شانك أن تصبغي حاملاً.

راميبيريل إينو فامد غير موصى به خلال الـ 12 أسبوعاً الأولى للحمل وينبع بانتها استعماله ابتداءً من الأسبوع الـ 13 لأن استعماله خلال فترة الحمل قد يسبب ضرراً جدياً للرضاخ.

احذر طببك فوراً إذا أصبحت حاملاً خلال فترة علاجك - راميبيريل إينو فامد، من الجائز أن يقرر الطبيب لك بتناول علاج بديل أمناً للاستعمال خلال فترة الحمل. إندا دعت الحاجة، فإن الانتقال لعلاج بديل ملائم يجب أن يتم قبل حل مخطط له.

الرضاخ

قبل تناولك - راميبيريل إينو فامد، إحذر طببك إذا كنت معرضة أو تخططين للرضاخ نظراً لتناولك معلومات محددة حول استعمال راميبيريل إينو فامد خلال فترة الرضاخ.

غير موصى بتناول راميبيريل إينو فامد خلال فترة الرضاخ.

السيارة و واستعمال الماكنات:

قد تشعر بدوران أثناء تناول راميبيريل إينو فامد. من المحمّل أكثر حدوث هذا الأمر في بداية العلاج أو بعد زيادة الجرعة الدوائية. إندا حدث هذا فلا يجوز لك أن تأخذ السيارة أو تشغل ماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

تحتوي الأقراص على الكتوز مونوهيرات (Lactose monohydrate)، إستشر طببك قبل بدء إستعمال الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات معينة. كذلك، تحتوى الأقراص على صوديوم كالملصل لاحقاً: في أقراص 2.5 ملغ - 1.49 ملغ صوريو، في أقراص 5 ملغ - 2.92 ملغ صوديوم، في أقراص 10 ملغ - 5.94 ملغ صوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليه الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريق العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريق العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المرضي المستحسن

قد يخفض ضربك الجرعة الدوائية الإبتدائية ويقوم بملاءمة الجرعة الدوائية بشكل أبسط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة التناول

• يجب تناول الدواء في ساعة محددة كل يوم.

• يجب بلع الفرسن بشكله الكامل مع ماء.

• لا يجوز مضغه أو سحقه القرص.

• بالإضافة شطر أقراص راميبيريل إينو فامد 2.5 ملغ، راميبيريل إينو فامد 5 ملغ و راميبيريل إينو فامد 10 ملغ وفقاً على نصف جرعة دوائية عند الحاجة. متساوين وتناول نصف جرعة دوائية عند الحاجة.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء:

توجه مباشرة إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علىة الدواء معلق، كي يعرف الطبيب ماذا تناولت. لا تقوم بالسياقة بنفسك، أطلب من شخص آخر نقلك أو إستدعى الإسعاف.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المُخصص فقم بتناول الجرعة الدوائية التالية في الموعد المعتاد واستشر الطبيب، لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة كتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية! يجب المواظة على طاعة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتاكيد من الجرعة الدوائية في كل مرة تناول فيها دواء ضعيف النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك، إذا توفرت لديك أسلمة إضافية بخصوص إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال رامبيبريل إينوفايد قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز الا عذانى أي منها.

توقف عن العلاج بـ رامبيبريل إينوفايد وراجع الطبيب فوراً إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض الجانبية الشديدة التالية - من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي مستجل:

- إنفاس شديد في الأنف أو في الشفتين أو في الحجرة الذي يؤدى إلى صعوبات في البلع أو التنفس، وكذلك خز وطفح - هذه الأمور يمكن أن تكون علامات لداء تحفيز تحسسي شديد بـ رامبيبريل إينوفايد.

- رد فعل جلدي شديد يشمل طفح، تقرحات في القدم، تفاقم مرضاً جلدي قائم، إحمرار، حروصلات أو اتسالح الجلد (مثل متازمة ستيفنس - جونسون Stevens-Johnson syndrome)، إخلال البشرة النخري السمي toxic epidermal necrolysis (erythema multiforme).

بلغ الطبيب فوراً إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض الجانبية التالية: - تزايد نظم القلب، ضربات قلب شديدة أو غير منتظمة (palpitations)، ألم في الصدر، ضغط في الصدر أو مشكلة أخطر مثل نوبة قلبية أو سكتة.

- ضيق تنفس أو سعال - هذه الأمور يمكن أن تكون علامات لمشكلة في الرئتين. - ظهور علامات رض بسهولة أكثر، تزف لفترة زمنية أطول من المعتاد، أي علامة لذف (متلازمة نزف من اللثة)، تناقل بفتحة الأنف، بقع على الحجرة وسخونة، الشعور بالتعب، إغماء، دوار أو لون جلد شاحب - هذه الأمور يمكن أن تكون علامات لمشاكل في الدم أو في محالن.

- ألم شديد في البطن يمكن أن يمتد إلى الظهر - يمكن أن يكون علامة لالتهاب البنكرياس.

- سخونة، تشعيرية، إرهاق، فقدان الشهية للطعام، ألم في البطن، غثيان، إصفرار الجلد أو الميدين (يرقات) - قد تكون هذه علامات لمشاكل في الكبد مثل التهاب في الكبد أو إصابة في الكبد.

أعراض جانبية إضافية تشمل:

الرجاء إبلاغ طبيبك فيما إذا تناقت إحدى الأعراض الجانبية المذكورة أدناه أو إذا إستمرت أكثر من عدة أيام.

6) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Starch pregelatinized, Lactose monohydrate, Sodium hydrogen carbonate, Croscarmellose sodium, Sodium stearyl fumarate, (Ramipril 2.5 mg – Ferric oxide yellow), (Ramipril 5 mg – Ferric oxide red).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

علبة لويحة (بليستر) لأقراص ضمن علبة كرتون.

مظهر الأقراص:

Ramipril Inovamed 2.5 mg - أقراص بلون أصفر فاتح حتى أصفر، مسطحة ذات أطراف مائلة، مستديرة، غير مطلية، طبع على جانب واحد منها 'H' و '18'. تم فصلها بواسطة خط للاشتهر وملسماء من الجانب الثاني.

Ramipril Inovamed 5 mg - أقراص مرقطة باللون الوردي الفاتح، مسطحة ذات أطراف مائلة، مستديرة، غير مطلية، طبع على جانب واحد منها 'H' و '19'. تم فصلها بواسطة خط للاشتهر وملسماء من الجانب الثاني.

Ramipril Inovamed 10 mg - أقراص بلون أبيض حتى أصفر، مسطحة ذات أطراف مائلة، مستديرة، غير مطلية، طبع على جانب واحد منها 'H' و '20'. تم فصلها بواسطة خط للاشتهر وملسماء من الجانب الثاني.

الم المنتج: أوروبيندو فارما.م.ض، بلوت رقم 2، مايتريفيهار، أميريت، حيدر آباد - 500038 - الهند.

صاحب الإمتياز والمُستورد: إينوفايد.م.ض، شارع بيتر چانيم 55، ص.ب. 62، أفن بودا، 40500.

لا تحتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضر، إذا توفر لديك أي سؤال أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما، الرجاء توجيه الطبيب.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

Ramipril Inovamed 2.5 mg - 166-47-35580

Ramipril Inovamed 5 mg - 166-48-35581

Ramipril Inovamed 10 mg - 166-49-35582

تم إعدادها في تموز 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتوهين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

- تناقص فحوص الدم تبدي إنخفاضاً في عدد خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية أو في كمية الهيموغلوبين.

أعراض نادرة جداً (ظهور لدى حتى مستعمل 1 من بين 10,000)

- حساسية زائدة لضوء الشمس.

أعراض جانبية إضافية بلغ عنها:

الرجاء إبلاغ طبيبك في حال تناقت إحدى الأعراض المذكورة أدناه أو إذا إستمرت لأكثر من عدة أيام:

- صعوبات في التركيز

- إنفاس في الفم

- تناقص فحوص الدم تبدي قلة خلايا الدم في دمك

- تناقص فحوص الدم تبدي نسبة أقل من المعتاد للصوديوم في دمك - بول مركب (ذو لون داكن) غثيان أو تقيؤ، تقلصات عضلية، إرتجاع والاحتلاجات، التي يمكن أن تكون نتيجة اضطراب في إفراز الهورمون الذي يُنظم إفراز البول (ADH). إذا كنت تشعر بذلك الأعراض، راجع الطبيب ياسرع ما يمكن

- تغير لون أصابع النساء والرجالين عندما تشعر بالبرد ومن ثم الشعور بالوخز أو الآلام عندما تشعر بالدافء (عرض يسمى Raynaud's phenomenon)

- ضخم الثديين لدى الرجال

- بطء أو تغير في الاستجابات

- شعور بحرق

- تغير في روائح شيء

- شفاق الشعر.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تناقت إحدى الأعراض الجانبية أو

عندما تعانى من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية بقلم علاج وتأتي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى التسويق المباشر للبلدي في موقع العلاج على الإنترنت.

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أبى ومجارى رؤية الأطفال و/ أو الرضع، وذلك لقىادي إصابتهم بالتسوس.

لا تسبب التسمم بدون تلقيمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز رمي أدوية في المجاري أو في القمامات، إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

شروط التخزين:

يجب التخزين درجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

أعراض شائعة (ظهور لدى حتى مستعمل 1 من بين 10)

- صداع أو الشعور بالتعب

- الشعور بدوران - من المعتدل أن يظهر عند بدء العلاج بـ رامبيبريل إينوفايد أو عند زيادة الجرعة الدوائية من رامبيبريل إينوفايد

- إنعام، ضغط دم منخفض بشكل شاذ، خاصة عند الوقوف أو الجلوس بسرعة

- سعال جاف، التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب القصبات الهوائية، ضيق في التنفس

- ألم في البطن أو في الأمعاء، إسهال، صعوبات هضمية، غثيان وقيءات

- طفح جلدي يتراافق أو لا يتراافق بأماكن بارزة

- ألم في الصدر

- تقلص أو ألم عضلي

- تناقص فحوص دم تبدي نسبة أعلى من المعتاد للبوتاسيوم.

أعراض غير شائعة (ظهور لدى حتى مستعمل 1 من بين 100)

- مشكل في التوازن (غير ثابت)

- حكة وآهاسيس غير اعتيادية في الجلد، مثل خدран، وخز، نزع، حرق

- ق福德ان أو تغير في حالة المناق

- مشكل في التوأم

- الشعور بالإكتئاب، قلق، عصبية زائدة عن المعتاد أو عدم الإرتياح

- ألم مسدو، صعوبات تنفسية أو تفاوت الدبو

- إنفاس في الأمعاء (intestinal angioedema)

- حرقان، تقيؤ أو إسهال

- حرقان، إمساك أو جفاف في الفم

- تبول زائد عن المعتاد

- تعرق زائد عن المعتاد

- إنخفاض أو فقدان الشهية للطعام

- زيادة أو تغير في نظم القلب

- إنفاس في الركاعين وفي الرجلين - يمكن أن يكون علامة لارتفاع السوائل في الجسم أكثر من المعتاد

- توّد

- تشوّش الرؤية

- ألم في المفاصل

- سخونة

- عجز جنسي لدى الرجال، تدنى الرغبة الجنسية لدى المرأة أو النساء

- زيادة خلايا دم بيضاء معينة (eosinophilia) ظهرت في فحوص الدم

- تناقص فحوص دم التي تدل على تغير في وظيفة الكبد، البتكرراس أو الكلى.

أعراض نادرة (ظهور لدى حتى مستعمل 1 من بين 1,000)

- شعور بقلة البلايين أو إرتجاع

- إحمرار وإنفاس اللسان

- تقرح شديد في الجلد، وخز، طفح على شكل كتل

- مشكل في الأظافر الجلد (متلازمة تحرر أو إنفصال الظفر عن قاعدته)

- طفح أو كدمات في الجلد

- بقع في الجلد وشعور ببرودة الأطراف

- في العينين - إحمرار، وخذ، إنفاس في العينين

- إضطرابات في السمع وطنين في الأذنين

- شعور بضعف عام