

פורמט עלון זה נקבע ע"י
משרד הבריאות ותוכנו
נבדק ואושר על ידי

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תקשיים) התשמ"ו – 1986

התרופה משוקת ללא כורשם רפואי

אַקְמוֹלִי® פּוֹרֶטָה 250 מ"ג/5 מ"ל

בְּטֻעַם תּוֹתֵה שָׁדָה סִירּוֹפֶן לְלָא סּוֹכֶר

אַקְמוֹלִי® פּוֹרֶטָה 250 מ"ג/5 מ"ל

בְּטֻעַם תּוֹתֵי-פְּרוֹטִי סִירּוֹפֶן לְלָא סּוֹכֶר

הרכב

כל 5 מ"ל מכילים:

פראצטמול (Paracetamol) 250 מ"ג
לרשימת החומרם הבלתי פעילים בתכשיר
ראה סעיף 6 – "מידע נוסף". ראה גם
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של
התרופה, בסעיף 2.

קרא בעינך את העלון עד סוף בטרם
תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע
תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות
נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם
רופא. התרופה מיועדת לילדים, אך
בילדים מתחת לגיל 3 שנים, יש ליטול
להיוועץ ברופא לפני השימוש. יש לפנות
אם הנר זקוק למידע נוספת – 3 ימים
לרופא אם החום נמשך יותר מ- 5
ימים למשך השימוש בתרופה.

התרופה מיועדת לילדים וכיולה להילוך
גם על ידי מבוגרים. המידע ועלון זה
מיועד עבור ילדים ועבור מבוגרים
הנותלים תרופה זו.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת
חום.

קבוצה תרפואיית:

משכך כאבים והוריד חום.

2. לפניהם השימוש בתרופה

א אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש בתרופה זו אם יודעה
רגישות לפראצטמול או לאחד
מרכיביה האחרים של התרופה
(ראה סעיף 6).

azimuthot-noguot-leishem

אם פיתחתה בעבר תופעות לוואי עוריות
כתוצאה מנטיילת תכשירים המכילים
פראצטמול, אין ליטול תכשירים
המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו
שוב תופעות עוריות חמורות.

אם אתה או יליך רגישים למחוז כלשהו
או לתרופה כלשהי, יש להודיע על כך
לרופא לפני נטילת התרופה.

התקשרות מכל פראצטמול הולל גרים
למנק בכבב כאשר:

ניתן במינון גבוה מהמומלץ או
لتגובה ממושכת.

בתקופת הטיפול שותים משקאות
אלכוהוליים.

נטלים תרופה נוספות נסיפות המשפיעות
על פעילות הגוף.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים
קרובות בלבד להיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות נוספות להורדת
חום ושיכוך כאבים או תרופות
להצענות ללא התיעיצות עם רופא
או רוקח, למונעת מין יתר/הרעה
של פראצטמול.

יש להימנע מלקלחת מין גובה של
תרופה זו (גם אם בתוך טוח המין
המומלץ) בזמן צום.

ב יש להיוועץ ברופא לפני התחלת טיפול אם אתה או יליך סובלים אן לבב:

ליקוי בתפקוד הכלבי
ליקוי בתפקוד הכליה
אלכוהוליזם
צחבת

אם אתה לוקח, או אם נתלת
לאחרונה, תרופות אחרות כולית-תרופות,
ספר על כן ל佗פא או לרוקח. במידוד
יש לידע את הרופא או הרוקח אם אין
נטול תרופה מהקבוצות הבאות או אם
גמרה זהה עתה הטיפול בתרופה:

פניטואין, קרבומזפין (לטיפול
באפילפסיה)

תרופות נגד קריישת דם

תרופות המאייצות יצור אכימינים בכבב
(כגון ברבטורטים)

תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים

מטולופרמיז או דומפרידון (לטיפול
בכחילה, הקאה וביעילות עכול אחרים)

אנטיביוטיקות (כגון ריפמפיקין או
כלורומפניקה)

פרובאנציג (לטיפול בשיגdon)

קולטירמין (להפחמת עורף שומנים
בדם)

אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים
אחרים המכילים פראצטמול

בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך
אלכוהול גיגל הגדרת סיכון לנק בכב.

הrixon והנקה

אם את בהרין או מניקה, יש להיוועץ
ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל
תרופות הלואין וכן על כל תרופה נוספת
הניתנת לך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים:

יקבע המינון על פי היגיל כבב
יקבע המינון על פי השם הרפואי
אלכוהוליזם

סבלתם בעבר מ:

ליקוי בתפקוד הכלבי
ליקוי בתפקוד הכליה
אלכוהוליזם

צחבת

אם אתה לוקח, או אם נתלת
לאחרונה, תרופות אחרות כולית-תרופות,
ספר על כן ל佗פא או לרוקח. במידוד
יש לידע את הרופא או הרוקח אם אין
נטול תרופה מהקבוצות הבאות או אם
גמרה זהה עתה הטיפול בתרופה:

פניטואין, קרבומזפין (לטיפול באפילפסיה)

תרופות נגד קריישת דם

תרופות המאייצות יצור אכימינים בכבב
(כגון ברבטורטים)

תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים

מטולופרמיז או דומפרידון (לטיפול
בכחילה, הקאה וביעילות עכול אחרים)

אנטיביוטיקות (כגון ריפמפיקין או
כלורומפניקה)

פרובאנציג (לטיפול בשיגdon)

קולטירמין (להפחמת עורף שומנים
בדם)

אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים
אחרים המכילים פראצטמול

בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך
אלכוהול גיגל הגדרת סיכון לנק בכב.

הrixon והנקה

אם את בהרין או מניקה, יש להיוועץ
ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל
תרופות הלואין וכן על כל תרופה נוספת
הניתנת לך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים:

יקבע המינון על פי היגיל כבב
יקבע המינון על פי השם הרפואי
אלכוהוליזם

סבלתם בעבר מ:

ליקוי בתפקוד הכלבי
ליקוי בתפקוד הכליה
אלכוהוליזם

צחבת

אם אתה לוקח, או אם נתלת
לאחרונה, תרופות אחרות כולית-תרופות,
ספר על כן ל佗פא או לרוקח. במידוד
יש לידע את הרופא או הרוקח אם אין
נטול תרופה מהקבוצות הבאות או אם
גמרה זהה עתה הטיפול בתרופה:

פניטואין, קרבומזפין (לטיפול באפילפסיה)

תרופות נגד קריישת דם

תרופות המאייצות יצור אכימינים בכבב
(כגון ברבטורטים)

תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים

מטולופרמיז או דומפרידון (לטיפול
בכחילה, הקאה וביעילות עכול אחרים)

אנטיביוטיקות (כגון ריפמפיקין או
כלורומפניקה)

פרובאנציג (לטיפול בשיגdon)

קולטירמין (להפחמת עורף שומנים
בדם)

אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים
אחרים המכילים פראצטמול

בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך
אלכוהול גיגל הגדרת סיכון לנק בכב.

הrixon והנקה

אם את בהרין או מניקה, יש להיוועץ
ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל
תרופות הלואין וכן על כל תרופה נוספת
הניתנת לך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים:

יקבע המינון על פי היגיל כבב
יקבע המינון על פי השם הרפואי
אלכוהוליזם

סבלתם בעבר מ:

ליקוי בתפקוד הכלבי
ליקוי בתפקוד הכליה
אלכוהוליזם

צחבת

אם אתה לוקח, או אם נתלת
לאחרונה, תרופות אחרות כולית-תרופות,
ספר על כן ל佗פא או לרוקח. במידוד
יש לידע את הרופא או הרוקח אם אין
נטול תרופה מהקבוצות הבאות או אם
גמרה זהה עתה הטיפול בתרופה:

פניטואין, קרבומזפין (לטיפול באפילפסיה)

תרופות נגד קריישת דם

תרופות המאייצות יצור אכימינים בכבב
(כגון ברבטורטים)

תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים

מטולופרמיז או דומפרידון (לטיפול
בכחילה, הקאה וביעילות עכול אחרים)

אנטיביוטיקות (כגון ריפמפיקין או
כלורומפניקה)

פרובאנציג (לטיפול בשיגdon)

קולטירמין (להפחמת עורף שומנים
בדם)

אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים
אחרים המכילים פראצטמול

בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך
אלכוהול גיגל הגדרת סיכון לנק בכב.

הrixon והנקה

אם את בהרין או מניקה, יש להיוועץ
ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל
תרופות הלואין וכן על כל תרופה נוספת
הניתנת לך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים:

יקבע המינון על פי היגיל כבב
יקבע המינון על פי השם הרפואי
אלכוהוליזם

סבלתם בעבר מ:

ליקוי בתפקוד הכלבי
ליקוי בתפקוד הכליה
אלכוהוליזם

צחבת

אם אתה לוקח, או אם נתלת
לאחרונה, תרופות אחרות כולית-תרופות,
ספר על כן ל佗פא או לרוקח. במידוד
יש לידע את הרופא או הרוקח אם אין
נטול תרופה מהקבוצות הבאות או אם
גמרה זהה עתה הטיפול בתרופה:

פניטואין, קרבומזפין (לטיפול באפילפסיה)

תרופות נגד קריישת דם

תרופות המאייצות יצור אכימינים בכבב
(כגון ברבטורטים)

תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים

מטולופרמיז או דומפרידון (לטיפול
בכחילה, הקאה וביעילות עכול אחרים)

אנטיביוטיקות (כגון ריפמפיקין או
כלורומפניקה)

פרובאנציג (לטיפול בשיגdon)

קולטירמין (להפחמת עורף שומנים
בדם)

אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים
אחרים המכילים פראצטמול

בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך
אלכוהול גיגל הגדרת סיכון לנק בכב.

הrixon והנקה

אם את בהרין או מניקה, יש להיוועץ
ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל
תרופות הלואין וכן על כל תרופה נוספת
הניתנת לך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים:

יקבע המינון על פי היגיל כבב
יקבע המינון על פי השם הרפואי
אלכוהוליזם

סבלתם בעבר מ:

ליקוי בתפקוד הכלבי
ליקוי בתפקוד הכליה
אלכוהוליזם

צחבת

אם אתה לוקח, או אם נתלת
לאחרונה, תרופות אחרות כולית-תרופות,
ספר על כן ל佗פא או לרוקח. במידוד
יש לידע את הרופא או הרוקח אם אין
נטול תרופה מהקבוצות הבאות או אם
גמרה זהה עתה הטיפול בתרופה:

פניטואין, קרבומזפין (לטיפול באפילפסיה)

<p