

01-2022

Piperacillin /tazobactam -Fresenius 2g/0.25g-

פיפרצילין/טזובקטם – פרצניאס 2 גראם / 0.25 גראם

Powder for solution for infusion

חומר פעיל:

Piperacillin (as sodium salt)	2.0g/vial
Tazobactam (as sodium salt)	0.25 g/vial

Piperacillin /tazobactam -Fresenius 4g/0.5g –

פיפרצילין/טזובקטם – פרצניאס 4 גראם / 0.5 גראם

Powder for solution for infusion

חומר פעיל:

Piperacillin(as sodium salt)	4.0g/vial
Tazobactam (as sodium salt)	0.5 g/vial

Powder for solution for infusion

רופא/ה, רוקחת/ת נקבע/ה,

- ניאופרם (ישראל) בע"מ מבקשת להודיע על עדכון העלון לרופא של התכשירים Piperacillin /Tazobactam -Fresenius 2g/0.25 g & 4g/0.5 g

• עלון התכשירizado ב-01-2022

- בהודעה זו כוללים שינויים בתיבות מהותיים שמופיעים **בכחול** – טקסט חדש מופיע **בכחול**, טקסט שהוסר מופיע **באדום** עם **קו-הצזה**. טקסט שעבר מקום מופיע **בירוק**. עלון קיימים עדכונים נוספים.

להלן נוסח התווiot המאושרות לתוכשיר:

- Treatment of systemic and/or local infections caused by susceptible organisms.
- Piperacillin/Tazobactam in combination with an aminoglycoside is indicated for the treatment of suspected bacterial infections in neutropenic adults and children above 2 years.
- Appendicitis complicated by rupture with peritonitis and/or abscess formation in children aged 2-12 years.

העדכוניים נעשו בסעיפים הבאים:

4.4 Special warnings and precautions for use

Renal impairment

Combined use of piperacillin /tazobactam and vancomycin may be associated with an increased incidence of acute Kidney injury (see section 4.5)

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Oral-a-Anticoagulants

During the simultaneous administration of heparin ,.....monitored regularly

Vancomycin

No pharmacokinetic interactions have been noted between piperacillin / tazobactam and vancomycin.

~~However ,a limited number of retrospective s~~Studies have detected an increased incidence of acute kidney injury in patients concomitantly administered piperacillin / tazobactam and vancomycin as compared to vancomycin alone(see section 4.4)

Some of these studies have reported that the interaction is vancomycin dose dependent.

No pharmacokinetic interactions have been noted between piperacillin / tazobactam and vancomycin.

4.8 Undesirable effects

System Organ Class	Very common (≥ 1/10)	Common (≥ 1/100 to < 1/10)	Uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100)	Rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000)	Frequency not known (cannot be estimated from available data)
--------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------

Psychiatric disorders		insomnia			delirium*
Nervous system disorders		headache	seizure*		

Beta-lactam antibiotics class effects

Beta-lactam antibiotics, including piperacillin/tazobactam, may lead to manifestations of encephalopathy and convulsions (see section 4.4)

העלון נשלח למשרד הבריאות לצורך העלאתו למAGER התרופות שבאחר משרד הבריאות.

נition לקבול עלון זה מודפס על ידי פניה ישירה לבעל הרישום: ניאופרム (ישראל) 1996 בעמ', בניין ניאופרם, רח' השילוח 6, ת.ד.
טלפון: 03-9373737, פקס: 03-9373770, ס. 7063, פתח תקווה 4917001.

ברכה,
עוֹז ווָלֵךְ, רוקח ממונה של בעל הרישום