

ינואר 2022

Enaladex® 5, 10, 20, tablets

צוות רפואי נכבד,

חברת דקסל בע"מ מבקשת להודיעיכם על עדכון בעлон לרופא ובullen לצרכן של התכשירים אנדקס® 5, 10, 20.

בהתשובה זו מפורטים העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי בלבד. מידע מלא, יש לעיין בעلون. העלונים נשלחו לפרסום במאגר התרופות באתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לבעל הרישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל, טל': 04-6364000.

הרכב התכשיר:

Each tablet contains Enalapril Maleate 5, 10 or 20 mg respectively

התווויות מאושרות:

Treatment of essential hypertension, renovascular hypertension congestive heart failure and to reduce mortality in patients with all degrees of heart failure. To retard the development of symptomatic heart failure in asymptomatic patients with left ventricular dysfunction.

הullen לרופא עודכן בינואר 2022. להלן העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי (מוסומנים באדום):

4.4. Special warnings and precautions for use

...

Hypersensitivity/Angioneurotic Oedema

...

Concomitant use of ACE inhibitors with racecadotril, mTOR inhibitors (e.g., sirolimus, everolimus, temsirolimus) and **vildagliptin** may lead to an increased risk of angioedema (e.g. swelling of the airways or tongue, with or without respiratory impairment) (see section 4.5). Caution should be used when starting racecadotril, mTOR inhibitors (e.g. sirolimus, everolimus, temsirolimus) and **vildagliptin** in a patient already taking an ACE inhibitor.

...

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

...

Ciclosporin

Hyperkalaemia may occur during concomitant use of ACE inhibitors with ciclosporin. Monitoring of serum potassium is recommended.

...

הullen לצרכן עודכן בינואר 2022. להלן העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי (מוסומנים באדום):

2. לפני השימוש בתרופה

... אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- **לפני הטיפול באנולדקס, ספר לרופא אם:**

- אתה נוטל אחת מהתרופות האלו, יתכן שתהיה בסיכון מוגבר לאנגיאודמה:

- **ילdegliptin, תרופה לטיפול בסוכרת.**

... **תגובה בין תרופתיות:**

- תוספי אשלגן (כולל תחליפימלח), משתנים אוצריאשלאגן כגון ספирונולקטון, טריامتן או אמיולוריד ותרופות אחרות שועלות להעלות רמות האשלגן בדם (למשל טרימטופרים וקו-טרימוקסוזול לטיפול בחיזומים חידקיים; **ציקלוסופוני**, תרופה לדיכוי מערכת החיסון למניעת דחיתת שתל והפרון, תרופה המשמשת לדילול דם למניעת היוצרות קריישי דם). ראה מידע נוסף בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

- תרופה המכילה מעכבי נפריליסין כגון סקוביטריל (קיים בתכשיר משולב עם ולסרטן), רצקdotril או **ילdegliptin**. הסיכון لأنגיאודמה (ນີ້ຫອດທິພຸນ, ຂສົກຕິພຸນ, ຂລັງອາວຸງ ແລະ ຂອບໃຈ ເຊື່ອນີ້ຫອດທິພຸນ) עלול לעלות. ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם" ואזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה."