

نشرة المريض وفقاً للوائح (منتجات) الصيادلة - 1986

يصرف هذا الدواء فقط بوصفة من قِبَل طبيب

ستريبيلد®

أقراص مطلية بغضائـ

المكونات الفعالة: يحتوي كل قرص على -

إلفيتيرافير (Elvitegravir)

كوبيسيلات (Cobicistat)

إيمترسيتابين (Emtricitabine)

تينوفوفير دايزوبروكسيل (Tenofovir disoproxil)

(ما يعادل 300 ملغم من فومورات تينوفوفير دايزوبروكسيل (tenofovir disoproxil fumarate) أو 136 ملغم من

تينوفوفير (tenofovir)

المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية: انظر القسم 6 "معلومات إضافية".

اقرأ هذه النشرة بأكملها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك. تحتوي هذه النشرة على معلومات أساسية عن هذا الدواء. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، فاسأل طبيبك أو الصيدلي. احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرأتها مرة أخرى. لقد وصف هذا الدواء لك فقط. فلا تطهه لآخرين. فقد يضرهم، حتى لو بدا لك أن مرضهم يشبه مرضك. إذا أصبحت بأي تأثيرات جانبية، فتحدث مع طبيبك أو الصيدلي، حتى إذا أصبحت بأي تأثيرات جانبية غير مدرجة في هذه النشرة (انظر القسم 4).

يستهدف هذا الدواء البالغين الذين أعمارهم 18 سنة فما فوق.

1. ما هي دواعي استعمال ستريبيلد؟

ستريبيلد هو علاج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية-1 (HIV-1) في البالغين الذين أعمارهم 18 سنة فما فوق، والذين لم يسبق لهم العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية أو الذين هم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية-1 (HIV-1) دون طفرات معروفة مرتبطة بمقاومة أي من المركبات الثلاثة المضادة للفيروسات القهقرية في ستريبيلد.

المجموعة العلاجية:

إلفيتيرافير (elvitegravir)، هو دواء مضاد للفيروسات يعرف بأنه مثبط لإنزيم الإنترغرين.

•

كوبيسيلات (cobicistat)، معزز (محسن الحراك الدوائي) لتأثيرات إلفيتيرافير.

•

إيمترسيتابين (emtricitabine)، دواء مضاد للفيروسات القهقرية يعرف بأنه مثبط نيوكلويوسايد المنتسخة

(NRTI).

•

تينوفوفير دايزوبروكسيل (tenofovir disoproxil)، دواء مضاد للفيروسات القهقرية يعرف بأنه مثبط

نيوكليوتايد المنتسخة العكسية (NtRTI).

يقلل ستريبيلد من كمية فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في جسمك. وهذا من شأنه تحسين الجهاز المناعي عندك والحد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

2. قبل تناول ستريبييلد

X لا تتناول هذا الدواء:

- إذا كانت لديك حساسية من المكونات الفعالة إلفيتيرغافير (elvitegravir)، كوبيسستات (cobicistat)، إيمترسيتابين (emtricitabine)، تينوفوفير (tenofovir)، أو تينوفوفير دايزوبروكسيل (tenofovir disoproxil) أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم 6 من هذه النشرة).
 - إذا كنت توقفت عن العلاج بأي دواء يحتوي على تينوفوفير دايزوبروكسيل (tenofovir disoproxil) بناءً على نصيحة طبيبك بعد حدوث مشاكل في وظائف الكلى.
 - إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية:
 - الفوزوسين (يستخدم لعلاج غدة البروستات المtorsمة)
 - الأميدارون و الكينيدين (يستخدمان لتصحيح عدم انتظام ضربات القلب)
 - دابيغاتران (يستخدم لمنع و علاج جلطات الدم)
 - كاريمازيبين و الفينوباربital و الفينيتوبين (تستخدم لمنع النوبات)
 - ريفامبيسين (يستخدم لمنع و علاج السلس وغيره من الأمراض المعدية)
 - دايهيدروإير غوتامين و إرغومترین (تستخدم لعلاج الصداع النصفي)
 - سيسابرايد (يستخدم لتخفيف بعض مشاكل المعدة)
 - نبتة سانت جون (Hypericum perforatum)، علاج عشبي يستخدم للاكتئاب والقلق) أو المنتجات التي تحتوي عليها
 - لوفاستاتين و سيمفاستاتين (يُستخدمان لخفض الكوليسترول في الدم)
 - بيموزايد، لوراسيدون (يُستخدمان لعلاج الأفكار أو المشاعر غير الطبيعية)
 - سيلدينافيل (يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي - مرض رئوي يجعل التنفس صعباً)
 - ميدازولام و تريازولام اللذان يعطيان عن طريق الفم، (يُستخدمان لمساعدتك على النوم و/أو تخفيف القلق)
- ← إن كانت أي من هذه تطبق عليك، فلا تتناول ستريبييلد ويجب عليك أن تخبر طبيبك فوراً.

! تحذيرات خاصة فيما يتعلق باستعمال ستريبييلد

يجب أن تبقى تحت رعاية الطبيب أثناء تناول ستريبييلد.

لا يزال بإمكانك تعرير فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عند تناول هذا الدواء، على الرغم من أن الخطر ينخفض بالعلاج الفعال المضاد للفيروسات القهقرية. نقاش مع طبيبك الاحتياطات الالزمة لتجنب إصابة آخرين.

هذا الدواء ليس عاملًا يؤدي إلى الشفاء التام من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). لا يزال بالإمكان أن تتطور عندك عدوى أو غيرها من الأمراض المرتبطة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أثناء تناول ستريبييلد.

تحدد مع طبيبك قبل تناول ستريبييلد:

- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، أو كنت تعاني من مشاكل في الكلى من قبل، أو إذا أظهرت الاختبارات مشاكل في الكليتين. سيقوم طبيبك بالنظر بعناية فيما إذا كان سيعالجك بستريبييلد.

قد يؤثر ستريبييلد على الكليتين. قبل البدء في العلاج، سوف يطلب طبيبك اختبارات الدم لتنقية وظائف الكلى. سيقوم طبيبك أيضًا بطلب فحوص الدم أثناء العلاج لمراقبة الكليتين.

لا يؤخذ ستريبييلد عادة مع أدوية أخرى من التي يمكن أن تضر بكليتين (انظر الأدوية الأخرى و ستريبييلد). إذا كان هذا أمراً لا مفر منه، فسيقوم الطبيب بمراقبة وظائف الكلى بشكل متكرر.

- قد تحدث أيضًا مشاكل في العظام (تظهر على شكل آلام مستمرة أو متقطنة في العظام وتؤدي أحياناً إلى كسور) بسبب تلف خلايا نبيبات الكلى (انظر القسم 4، التأثيرات الجانبية المحتملة). أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من آلام أو كسور في العظام.

قد يتسبب تينوفوفير دايزوبروكسيل (tenofovir disoproxil) أيضًا في فقدان كتلة العظام.

بشكل عام، تُعد تأثيرات تينوفوفير دايزوبروكسيل (tenofovir disoproxil) على صحة العظام على المدى الطويل ومخاطر الإصابة بالكسور المستقبلية لدى المرضى البالغين والأطفال غير مؤكدة.

أخبر طبيبك إذا كنت تعلم أنك تعاني من هشاشة العظام. حيث إن المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام أكثر عرضة لخطر الإصابة بالكسور.

• إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو تاريخ لأمراض الكبد، بما في ذلك التهاب الكبد. المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد بما في ذلك التهاب الكبد المزمن B أو C، الذين يعالجون بمضادات الفيروسات القيصرية، يكون لديهم خطر أكبر من المضاعفات الكبدية الشديدة وربما القاتلة. إذا كانت لديك عدوى التهاب الكبد B، فسوف ينظر طبيبك بعناية لأفضل نظام علاجي لك.

إذا كان لديك التهاب الكبد B، فإن مشاكل التهاب الكبد قد تصبح أسوأ بعد التوقف عن تناول ستريبييلد. من المهم عدم التوقف عن تناول ستريبييلد دون التحدث إلى طبيبك: انظر القسم 3، لا تتوقف عن تناول ستريبييلد.

• إذا كنت أكبر من 65 عاماً من العمر. لم يدرس ستريبييلد في المرضى الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. إذا كنت أكبر من هذا العمر وتم وصف ستريبييلد لك فسيقوم طبيبك بمرافقتك بعناية.

← إذا كان أي من هذه ينطبق عليك، فتحدد مع طبيبك قبل تناول ستريبييلد.

أثناء تناولك ستريبييلد

بمجرد البدء في تناولك ستريبييلد، انتبه إلى ما يلي:

• أي علامات التهاب أو عدوى
• مشاكل في العظام

← إذا لاحظت أيّاً من هذه الأعراض، فأخبر طبيبك فوراً.

الأطفال واليافعون

لا تعطِ هذا الدواء للأطفال واليافعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. لم تتم بعد دراسة استعمال ستريبييلد في الأطفال واليافعين.

الأدوية الأخرى وستريبييلد

هناك بعض الأدوية التي ينبغي عدم تناولها مع ستريبييلد مطلقاً.
هذه الأدوية مذكورة أعلاه تحت عنوان "لا تتناول هذا الدواء – إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية".

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي دوائية أخرى، بما في ذلك الأدوية والمكمّلات الغذائيّة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، فأخبر طبيبك أو الصيدلي. قد يتفاعل ستريبييلد مع أدوية أخرى. ونتيجة لذلك، قد تتأثر كميات ستريبييلد أو الأدوية الأخرى في دمك. قد يؤدي ذلك إلى إيقاف أدويتك عن العمل بشكل صحيح، أو قد يؤدي إلى جعل أي تأثيرات جانبية أسوأ. في بعض الحالات، قد يحتاج طبيبك إلى ضبط جرعتك أو التحقق من مستوياتها في الدم.

من المهم بشكل خاص أن تستشير طبيبك إذا كنت تتناول أيّاً مما يلي:

• أي أدوية أخرى تحتوي على:
- تينوفوفير دايزوبروكسيل
- تينوفوفير لايفيناميد
- لاميفودين
- أديفوفير دايبيفوكسيل

الأدوية التي قد تلحق الضرر بكلتيك، وتشمل الأمثلة التالية:

- أمينو غليوكوزيدات (مثل الستربوتومايسين والنديومايسين والجنتاميسين)، فانكومايسين (للعدوى البكتيرية)
- فوسكارنيت، غانسيكلوفير، سيدوفوفير (للعدوى الفيروسية)
- الأمفوتريسين B و بنتاميدين (العدوى الفطرية)
- إنترلوكين 2، ويسمى أيضاً الدسلوكين (العلاج السرطان)
- العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs، لتخفييف آلام العظام أو العضلات)

من المهم أيضاً إخبار الطبيب إذا كنت تتناول أيّاً من أنواع الأدوية التالية:

مضادات الفطريات، وُتُستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية، مثل:

- كيتوكونازول، إتراكونازول، فوريكونازول، فلوكونازول و بوساكونازول
- مضادات الفيروسات، وُتُستخدم لعلاج عدوى التهاب الكبد C، مثل:

- ليديباسفير / سوفوسبيفير، سوفوسبيفير / فيلباتاسفير / فوكسيلابريفير

المضادات الحيوية، المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية ومن ضمنها السل، والتي تحتوي على:

- ريفابوتين، كلاريثروميسين أو تيليثروميسين

مضادات الاكتئاب، وُتُستخدم لعلاج الاكتئاب:

- الأدوية التي تحتوي على ترازودون أو إسيتالووبرام
- المهدئات والمنومات، وُتُستخدم لعلاج القلق:

- بوسبيرون، كلورازيبات، الديازيبام، إستازولام، فلورازيبام وزولبيديم

مثبطات المناعة، وُتُستخدم للسيطرة على استجابة الجسم المناعية بعد عملية زرع، مثل:

- سيكلوسبيورين، سيروليموس و تاكروليموس

الكورتيكosteroidات بما في ذلك:

- بيتاميثازون، بوديسونيد، فلوتيكason، موميتازون، بريدينزون، تريامسسينلون.

وُتُستخدم هذه الأدوية لعلاج الحساسية والربو وأمراض الأمعاء الالتهابية، والحالات المرضية الالتهابية للجلد والعيون والمفاصل والعضلات وغيرها من الحالات الالتهابية. بشكل عام، تؤخذ هذه الأدوية عن طريق الفم أو الاستنشاق أو الحقن أو توضع على الجلد أو العين. إذا لم يكن بالإمكان استعمال البدايل، يجب أن يتم استعماله فقط بعد التقييم الطبي وتحت إشراف دقيق من قبل طبيبك عن الآثار الجانبية للكورتيكosteroid.

الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري:

- ميغورمين

حبوب منع الحمل، وُتُستخدم لمنع الحمل

أدوية اختلال الانتصاب، وُتُستخدم لعلاج العجز الجنسي، مثل:

- سيلينافيل، تادالافيل و فاردينافيل

أدوية القلب، مثل:

- ديجوكسين، ديسوبراميد، فليكاينيد، ليدوكائين، مكسيليتين، بروبافينون، ميتوبرولول، تيمولول، أملوديبين، ديلتيازيم، فيلوبيبين، نيكارديبين، نيفيديبين و فيراباميل

الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي:

- بوزنان

مضادات التخثر، وُتُستخدم لمنع و علاج جلطات الدم، مثل:

- وارفارين، إيدوكسانابان، أبيكسابان، و ريفاروكسانابان

موسعات الشعب الهوائية، وُتُستخدم لعلاج الربو وغيره من المشاكل ذات الصلة بالرئة:

- سالميتروول

أدوية تخفيض الكوليسترول، مثل:

- روزوفاستاتين، أتورفاستاتين، برافاستاتين، فلوفاستاتين و بيتافاستاتين

الأدوية المستخدمة لعلاج النقرس:

- الكولشيسين

مضادات تجمع الصفائح الدموية، وُتُستخدم لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم، مثل:

- كاربيدوغريل

الأدوية أو المكمولات الغذائية التي تؤخذ عن طريق الفم والتي تحتوي على معادن (مثل المغنيسيوم، الألومنيوم،

الكالسيوم، الحديد، الزنك)، مثل:

- المكمولات الغذائية المعدنية والفيتامينات (بما في ذلك الفيتامينات المتعددة) ومضادات الحموضة والملينات

← إذا كنت تتناول أدوية أو مكممات غذائية تؤخذ عن طريق الفم أو مضادات للحموضة أو ملينات تحتوي على معادن مثل (المغنيسيوم، الألومنيوم، الكالسيوم، الحديد، الزنك)، يجب تناولها قبل 4 ساعات على الأقل أو بعد 4 ساعات على الأقل من تناول ستريبيبلد.

← أخبر طبيبك إذا كنت تتناول هذه أو أي أدوية أخرى. لا تتوقف عن علاجك دون الاتصال بطبيبك.

استعمال الدواء والطعام
تناول هذا الدواء مع الطعام.

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك طبيعياً، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لإنجاب طفل، فاسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.

- أخبري طبيبك فوراً إذا أصبحت حاملاً أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لإنجاب طفل. ينبعي للسيدات الحوامل عدم تناول ستريبيبلد. قد تتخفض كمية هذا الدواء في دمك أثناء الحمل مما قد يمنعه عن العمل بشكل صحيح.
- عليك استعمال وسائل منع حمل فعالة عند تناول ستريبيبلد.

لا ترضعي طفلك رضاعة طبيعية أثناء العلاج بستريبيبلد. وذلك لأن بعض المواد الفعالة في هذا الدواء تمر في حليب الثدي البشري. إذا كنت امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية فمن المستحسن ألا ترضعي من الثدي لتجنب تمرير الفيروس إلى الطفل في حليب الثدي.

القيادة واستعمال الآلات
يمكن أن يسبب ستريبيبلد الدوخة أو الشعور بالتعب أو الأرق. فإذا تأثرت بهذه الأعراض أثناء تناول ستريبيبلد، فلا تقد ولا تستخدم أي أدوات أو آلات.

معلومات مهمة عن بعض مكونات الدواء

يحتوي ستريبيبلد على اللاكتوز

إذا أخبرك طبيبك أنك تعاني من عدم تحمل بعض السكريات، فتواصل مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي ستريبيبلد على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغم) لكل قرص، وهذا يعني أنه "حالٍ من الصوديوم" بشكل أساسي.

3. كيف تتناول ستريبيبلد

دائماً تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك به الطبيب. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد بشأن الجرعة والنظام العلاجي.

الطبيب فقط هو من سيحدد الجرعة والنظام العلاجي.

الجرعة المعتادة:

قرص واحد كل يوم عن طريق الفم، مع الطعام. لا توجد معلومات متاحة بشأن سحق/تقسيم المنتج. لا تمضغ أو تسحق أو تقسّم القرص.

لا تخطي الجرعة الموصى بها.

دائماً تناول الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب. وهذا لغرض التأكد من أن الدواء الخاص بك فعال تماماً، والحد من خطر تطوير المقاومة للعلاج. لا تغير الجرعة ما لم يخبرك الطبيب بذلك.

إذا كنت تتناول أدوية أو مكمالت غذائية تؤخذ عن طريق الفم أو مضادات للحموضة أو ملينات تحتوي على معادن (مثل المغنيسيوم، الألومنيوم، الكالسيوم، الحديد، الزنك)، فتناولها قبل 4 ساعات على الأقل من تناول ستريبييلد أو بعد 4 ساعات على الأقل من تناوله.

إذا كنت تناولت ستريبييلد أكثر مما يجب

إذا كنت قد تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكثر من الجرعة الموصى بها من ستريبييلد أو إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ، فقد تكون/يكون في خطر متزايد من التعرض للتآثيرات الجانبية المحتملة لهذا الدواء (انظر القسم 4، التآثيرات الجانبية).

اتصل بطبيبك أو أقرب قسم طوارئ على الفور للحصول على المشورة. احتفظ بقنية الأقراص معك بحيث يمكنك بسهولة وصف ما كنت قد تناولت.

إذا كنت قد نسيت تناول ستريبييلد

فمن المهم عدم تقويت جرعة ستريبييلد.

إذا كنت قد نسيت جرعة:

- **وتلاحظ ذلك في غضون 18 ساعة من الوقت الذي عادة ما تتناول فيه ستريبييلد، يجب أن تتناول قرصاً في أقرب وقت ممكن.** دائماً تناول قرصاً مع الغداء. ثم تناول الجرعة التالية كالمعتاد.
- **وتلاحظ ذلك بعد 18 ساعة أو أكثر بعد الوقت الذي عادة ما تتناول فيه ستريبييلد، فلا تتناول الجرعة الفائتة.** انتظر وتناول الجرعة التالية، مع الطعام، في الوقت المعتاد.

إذا كنت قد تقيأت بعد أقل من ساعة واحدة من تناول ستريبييلد، فتناول قرصاً آخر مع الطعام.

لاتتوقف عن تناول ستريبييلد

لا تتوقف عن تناول ستريبييلد دون التحدث إلى طبيبك. يمكن أن يؤثر وقف تناول ستريبييلد تأثيراً خطيراً على استجابتك للعلاج في المستقبل. إذا تم إيقاف تناول ستريبييلد لأي سبب من الأسباب، فتحث إلى طبيبك قبل إعادة تناول أقراص ستريبييلد.

عندما ينخفض تجهيزك لكمية ستريبييلد، فاحصل على المزيد من الطبيب أو الصيدلي. هذا مهم جداً لأن كمية الفيروس قد تبدأ في الزيادة إذا توقف الدواء ولو لفترة قصيرة. قد يصبح هذا المرض أكثر صعوبة في العلاج.

إذا كانت لديك عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهاب الكبد B، فمن المهم بشكل خاص عدم وقف العلاج بستريبييلد دون التحدث إلى طبيبك أولاً. قد تحتاج إلى اختبارات دم لعدة أشهر بعد توقف العلاج. في بعض المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المتقدمة أو تليف الكبد، لا ينصح بوقف العلاج لأن هذا قد يؤدي إلى تفاقم التهاب الكبد عندك، والذي قد يكون مهدداً للحياة.

← أخبر طبيبك فوراً بأعراض جديدة أو غير عادية بعد التوقف عن العلاج، وخاصة الأعراض التي تترافق مع عدوى التهاب الكبد B (مثل اصفرار جلدك أو اصفرار بياض عينيك أو أسوداد لون البول "بلون الشاي"، أو البراز الفاتح أو فقدان الشهية لعدة أيام أو لفترات أطول، العثيان أو الإحساس بالعثيان، أو الألم في منطقة المعدة)

لا تأخذ الأدوية في الظلام!

تحقق من التسمية والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواعه.
ارتدي النظارات إذا كنت في حاجة إليها.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيدلي

4. التأثيرات الجانبية

خلال علاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قد تكون هناك زيادة في الوزن ومستويات الدهون في الدم والغلوكوز. ويرتبط ذلك جزئياً باستعادة الصحة وأسلوب الحياة، وفي حالة الدهون في الدم، فإنها أحياناً تعود إلى أدوية علاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) نفسها. سبب طبيبك الاختبارات للكشف عن هذه التغيرات.

كما هو الحال في جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء تأثيرات جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث للجميع. لا تنزعج من قراءة قائمة التأثيرات الجانبية، فقد لا تواجه أي منها. عند معالجة عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، فإنها ليس من الممكن دائمًا معرفة ما إذا كانت بعض التأثيرات غير المرغوب فيها هي بسبب تناول ستريبييلد أو الأدوية الأخرى التي تتناولها في نفس الوقت، أو بسبب فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) نفسه.

التأثيرات الجانبية الخطيرة المحتملة: أخبر الطبيب فوراً

• **الحماض اللبناني** (حامض اللاكتيك الزائد في الدم) هو تأثير جانبي نادر ولكن يحتمل أن يهدد الحياة لبعض الأدوية علاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). يحدث الحمامض اللبناني في كثير من الأحيان في النساء - لا سيما إذا كانت هناك زيادة في الوزن وفي الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد. قد يكون ما يلي علامات الحمامض اللبناني:

- التنفس العميق والسريع
- التعب أو النعاس
- الشعور بالمرض (الغثيان)، والمرض (التقيؤ)
- آلام في المعدة

← إذا كنت تعتقد أنه قد يكون لديك حمامض لبناني، فأخبر طبيبك فوراً.

• **أي علامات لالتهاب أو عدوى.** في بعض المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) المنقدمة (الإيدز) وتاريخ للعدوى الانتهازية (الالتهابات التي تحدث في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي)، علامات وأعراض التهاب من عدوى سابقة قد تحدث بعد وقت قصير من بدء العلاج بالأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV). ويعتقد أن هذه الأعراض يرجع سببها إلى تحسن في الاستجابة المناعية للجسم، مما يمكن الجسم من مكافحة العدوى التي قد تكون موجودة مع عدم وجود أعراض واضحة. بالإضافة إلى العدوى الانتهازية، قد تحدث اضطرابات المناعة الذاتية (وهي الحالة التي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم السليمة) بعد البدء في تناول الأدوية لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). قد تحدث اضطرابات المناعة الذاتية بعد أشهر عديدة من بدء العلاج. إذا لاحظت أي أعراض للعدوى أو أعراض أخرى مثل ضعف العضلات والضعف بدءاً من اليدين والقدمين والانتقال نحو جذع الجسم، والخفقان، ورعاش أو فرط النشاط، يرجى إبلاغ طبيبك فوراً للحصول على العلاج اللازم.

← إذا لاحظت أي أعراض لالتهاب أو عدوى، فأخبر طبيبك فوراً.

تأثيرات جانبية شائعة جدًا
(قد تؤثر على الأقل 1 في كل 10 من المرضى الذين تمت معالجتهم)

- إسهال
- تقيؤ
- الشعور بالمرض (الغثيان)
- ضعف
- الصداع، والدوخة
- طفح جلدي

قد تظهر الاختبارات أيضًا:

- انخفاض الفوسفات في الدم
- ارتفاع مستويات كلينيز الكرياتين في دمك التي قد تؤدي إلى ألم العضلات والضعف

التأثيرات الجانبية الشائعة

(يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 1 إلى 10 في كل 100 مريض)

- فلة الشهية
- صعوبة النوم (الأرق)، والأحلام غير الطبيعية
- ألم، وألم في المعدة
- مشاكل في الهضم مما يؤدي إلى عدم الراحة بعد وجبات الطعام (عسر الهضم)
- الشعور بالانتفاخ
- الإمساك والرياح (انتفاخ البطن)
- الطفح الجلدي (بما في ذلك البقع الحمراء أو البقع في بعض الأحيان مع تفتق وتورم في الجلد)، والتي قد تكون تفاعلات تحسسية، والحكمة، والتغيرات في لون البشرة بما في ذلك سواد الجلد في بقع
- تفاعلات تحسسية أخرى
- التعب

قد تظهر الاختبارات أيضًا:

- انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للعدوى)
- زيادة السكر والأحماض الدهنية (ثلاثيات الجليسيريدات) والبيليروبين في الدم
- مشاكل في الكبد والبنكرياس
- مستويات مرتفعة في كرياتينين الدم

التأثيرات الجانبية غير الشائعة

(يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 1 في كل 100 مريض تمت معالجتهم)

- القنطرة الانتحاري ومحاولة الانتحار (في المرضى الذين يعانون من الاكتئاب أو مشاكل الصحة النفسية من قبل)، والاكتئاب
- آلام الظهر الناجمة عن مشاكل في الكلى، بما في ذلك الفشل الكلوي. قد يقوم طبيبك بإجراء فحوص الدم لمعرفة ما إذا كانت الكليتان تعملان بشكل صحيح
- تلف خلايا نبيبات الكلى
- تورم في الوجه والشفتين واللسان أو الحلق
- ألم البطن الناجم عن التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس)
- انهيار العضلات، آلام أو ضعف في العضلات

قد تظهر الاختبارات أيضًا:

- فقر الدم (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء)
- انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم
- تغييرات في البول

التأثيرات الجانبية النادرة

(يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 1 في كل 1000 مريض تمت معالجتهم)

- الحمامض اللبناني (انظر التأثيرات الجانبية الخطيرة المحتملة: أخبر طبيبك فورًا)
- اصفرار الجلد أو العينين، حكة، أو ألم في البطن ناجم عن التهاب الكبد
- الكبد الدهني
- التهاب في الكلى
- تمزير الكثير من البول والشعور بالعطش (سكر الكلوي الكاذب)
- تليين العظام (مع آلام العظام ويؤدي أحياناً إلىكسور)

انهيار العضلات، تليين العظام (مع آلام العظام وأحياناً يؤدي إلىكسور)، آلام في العضلات، وضعف العضلات وانخفاض في البوتاسيوم أو الفوسفات في الدم قد تحدث بسبب الأضرار التي لحقت بخلايا نبيبات الكلى.

← إذا أصبح أيٌ من التأثيرات الجانبية خطيراً، فأخبر طبيبك.

التأثيرات الأخرى التي قد تشاهد خلال علاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

لا يعرف تواتر التأثيرات الجانبية التالية (لا يمكن تقدير التواتر من البيانات المتاحة).

- مشاكل العظام. بعض المرضى الذين يتناولون الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مثل ستريبييل قد يتطور لديهم مرض عظمي يسمى تخثر العظم (موت الأنسجة العظمية الناجمة عن فقدان إمدادات الدم إلى العظام). إن تناول هذا النوع من الدواء لفترة طويلة، وتناول الكورتيزون، وشرب الكحول، وجود نظام مناعة ضعيف جداً، وزيادة الوزن، قد تكون بعض عوامل الخطر الكثيرة لتطوير هذا المرض. علامات تخثر العظم هي:
 - تصلب المفاصل
 - آلام وألم المفاصل (وخاصة في الورك والركبة والكتف)
 - صعوبة في الحركة

← إذا لاحظت أيّاً من هذه الأعراض فأخبر طبيبك.

← إذا ظهر أحد التأثيرات الجانبية أو إذا تفاقم أي تأثير جانبي أو إذا كنت تعاني من تأثير جانبي غير مذكور في النشرة، فاستشر الطبيب.

الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية

يمكنك الإبلاغ عن أي تأثيرات جانبية إلى وزارة الصحة عن طريق النقر على رابط "الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية الناجمة عن العلاج الطبي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يعيد توجيهك إلى نموذج الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية عبر الإنترنت أو عن طريق النقر على الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>.

يمكنك أيضاً إبلاغ حامل التسجيل عبر البريد الإلكتروني التالي: DrugSafety.Israel@gilead.com. يمكنك أن تساعد في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء بإبلاغك عن التأثيرات الجانبية.

5. كيف تخزن ستريبييل

تجنب التسمم! يجب أن يحفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق وبعيداً عن بصر ومتناول الأطفال و/or الرضع لتجنب التسمم. لا تقم بتحريض القيء دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الكرتون والقنينة بعد أحرف (exp. date). تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يخزن بعلبته الأصلية من أجل حمايته من الرطوبة. احفظ القنينة مغلقة بإحكام.

لا تخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعمل. من شأن هذه التدابير أن تساعد في حماية البيئة.

يخزن في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي ستريبييل

بالإضافة إلى المكونات الفعالة، يحتوي ستريبييل على:

لب الفرق: السيليلوز البلوري المكرري (E460)، كروسكارملوس الصوديوم، ستيرات المغنيسيوم، ثاني أكسيد السيلikon (E551)، كبريتات لوريل الصوديوم، مونوهيدرات اللاكتوز، هايدروكسي بروبيل السيليلوز (E463).

طلاء القرص:

كحول البولي فينيل (E1203)، كارمين الألومنيوم (صباغ FD&C أزرق رقم 2 النيلي البحيري (E132)، غليكول بولي إيثيلين (E1521)، ثاني أكسيد التيتانيوم (E553b)، ثلث (E171)، أكسيد الحديد الأصفر (E172).

ما هو شكل ستريبيلد وما هي محتويات العلبة

أقراص ستريبيلد المطلية هي خضراء اللون، على شكل كبسولة، ومحفور عليها من جانب واحد أحرف "GSI" وعدد "1" محاط بمربع على الجانب الآخر من القرص. يأتي ستريبيلد في قناني تحتوي على 30 قرصاً (مع هلام السيليكا المجفف الذي يجب أن يبقى في القنينة للمساعدة في حماية الأقراص). ويوجد هلام السيليكا المجفف في كيس منفصل أو علبة ولا ينبغي ابتلاعه.

يتألف حجم العبوة التالية: كارتون خارجي يحتوي على قنينة واحدة تحتوي على 30 قرصاً مطلياً.

حامل التسجيل:

جلعاد للعلوم إسرائيل المحدودة،
4 شارع هاهاراش،
hood haSharon,
4524075
إسرائيل

الشركة المصنعة:

جلعاد للعلوم أيرلندا المحدودة يو سي
آي دي إيه بزنس وتكنولوجى بارك
كاريغتوهيل
كاونتي كورك
أيرلندا

رقم تسجيل الدواء في السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة: 33963

لبساطة وسهولة القراءة، فقد صيغت هذه النشرة بصيغة المذكر. ومع ذلك، فإن المقصود من الدواء هو لكلا الجنسين

تمت المراجعة في يناير/كانون الثاني 2022 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة (MoH).

المراجع: ملخص خصائص المنتج في الاتحاد الأوروبي (EU) من أكتوبر/تشرين الأول 2021.