

# לשקורטאן® משחה

הרכב

פארומומיצין (כסולפאט) 15%  
Paromomycin (as sulfate) 15%

מתייל בנזתוניום כלורייד 12%  
Methylbenzethonium chloride 12%

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף  
6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשמש  
בתרופה. עלון זה מכיל מידע חמציתי על התרופה.  
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל  
הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר  
תרופה זו לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו  
אם נראה לך כי מצבם הרופאי דומה.

## 1. למה מיועדת התרופה?

טיפול מקומי בשונות יתרוח.

### קובוצה תרופיטית:

פארומומיצין: אנטיביוטיקה אמינוגליקוזידית.  
מתייל בנזתוניום כלורייד: אמוניום רב עוני בעל  
פעילות אנטימיקרובילית.

## 2. לפניה השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה זו:

- אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה או  
לאומיצין.
- אם השתמש בעיניים.
- אם השתמש באזון החיצונית בקרה של  
עור תוך מנוקב.

ازהוורת מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה:  
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא  
פני התחלת הטיפול:

- אם את בהירין או מניקה.
- אם אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד  
הכבד, הכליה/מערכת השתן או השמיעה.
- אם אתה גיש לזמן כלשהו או לתרופה כלשהי,  
כגון נאומיצין, עליך להודיע על כך לרופא לפני  
ניסיית התרופה.

### תגובה בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לך חקת לאחרונה, תרופות  
אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה,  
ספר על כך לרופא או לרוקח.

הירין, הנקה ופוריות

אין להשתמש בתרופה אם את בהירין או מניקה,  
ובלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול.

## 3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות  
הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם  
אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
המינון ואופן הטיפול יקבע על-ידי הרופא בלבד.

הוראות שימוש:

- יש נזקوت את האזoor הנגוע ולכוסות לגמרי עם  
המשחה. ניתן לחבוע עם החבושת סטרילית.
- יש למלוח את המשחה פעמיים ביום בימי למשך  
כ- 10 ימים. במידה ולא הושגה חלהמה מלאה,  
הרופא ישקול מתן קורס טיפול נוסף של  
10 ימים.

יש להשתמש בתרופה זו בזמןים קצרים כדי  
שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

אין לעبور על המנה המומלצת.

יש להשלים את כל הטיפול התרופתי. אף אם  
חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק שימוש  
בתרופה אלא לפחות הוראות הרופא.

צורת הנטילה

תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.



**Rückseite / Backside**

Die Textrichtung (quer- oder hochstehendes Format) und die Anzahl der Textspalten können frei gestaltet werden.

The direction of the text (landscape or portrait) and the number of columns is not specified.

**PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) – 1986**

The medicine is dispensed with a doctor's prescription only

**LESHCUTAN® OINTMENT**
**Composition**

Paromomycin (as sulfate) 15%

Methylbenzethonium chloride 12%

For information on inactive ingredients, see section 6 – "Further Information".

**Read the leaflet carefully in its entirety before using this medicine.** This leaflet contains concise information about the medicine. If you have further questions, refer to the doctor or pharmacist. This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment. Do not pass it on to others. It may harm them even if it seems to you that their medical condition is similar.

**1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?**

Topical treatment of cutaneous leishmaniasis.

**Therapeutic group:**

Paromomycin: aminoglycoside antibiotic.

Methylbenzethonium chloride: quaternary ammonium with antimicrobial activity.

**2. BEFORE USING THE MEDICINE**
**Do not use this medicine:**

- If there is a known sensitivity to any of its ingredients or to neomycin.
- Do not use in the eyes.
- Do not use in the external ear in case of a perforated eardrum.

**Special warnings regarding use of the medicine:**
**Do not use the medicine without consulting a doctor before starting treatment:**

- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of the liver, kidney/urinary system or hearing.
- If you are sensitive to any food or medicine, such as neomycin, inform the doctor before taking the medicine.

**Drug interactions:**

If you are taking, or if you have recently taken, other medicines, including non-prescription medicines and nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist.

**Pregnancy, breastfeeding and fertility**

Do not use the preparation if you are pregnant or breastfeeding without consulting a doctor before starting treatment.

**3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?**

Always use the medicine according to the doctor's instructions. Check with the doctor or pharmacist if you are uncertain regarding the dosage and treatment regimen of the preparation.

**The dosage and treatment regimen will be determined by the doctor only.**
**Directions for use:**

- 1- Clean the affected area and completely cover with the ointment. A sterile dressing can be used to dress the area.
- 2- Apply the ointment twice a day, for about 10 days. If full recovery is not achieved, the doctor will consider administration of an additional 10-day course of treatment.

Use this medicine at set time intervals, as determined by the attending doctor.

**Do not exceed the recommended dose.**

Complete the entire medicinal treatment. Even if there is an improvement in your health condition, do not stop using the medicine unless instructed to do so by a doctor.

**Mode of administration**

This medicine is intended for external use only.

**Avoid contact with the eyes or external ear canal.**

**If you accidentally took a higher dosage**  
If you took an overdose, or if a child has accidentally swallowed the ointment, immediately refer to a doctor or proceed to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

Adhere to the treatment regimen as recommended by the doctor.

**Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take medicine. Wear glasses if you need them.**  
**If you have further questions regarding use of the medicine, consult the doctor or pharmacist.**

**4. SIDE EFFECTS**

As with any medicine, use of Leshcutan ointment may cause side effects in some users.

Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not suffer from any of them.

**Discontinue treatment and refer to the doctor immediately** if a severe local reaction occurs (rare).

**Additional side effects**

- Redness
- Irritation
- Local inflammation
- Local burning sensation
- Local pain or swelling

If a side effect occurs, if one of the side effects worsens or if you suffer from a side effect not mentioned in the leaflet, consult with the doctor.

**Reporting of side effects**

Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on the link "Report Side Effects of Drug Treatment" found on the Ministry of Health homepage ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) that directs you to the online form for reporting side effects, or by entering the link:

<https://sideeffects.health.gov.il>

**5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?**

- Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must be kept in a safe place out of the reach and sight of children and/or infants in order to avoid poisoning. Do not induce vomiting without explicit instruction from the doctor.
- Do not use the medicine after the expiry date (Exp. Date) that appears on the package. The expiry date refers to the last day of that month.

**• Store this medicine below 25°C.**

- Do not discard medicines in wastewater or waste. Ask the pharmacist how to dispose of medicines no longer in use. These measures will help to protect the environment.

**6. FURTHER INFORMATION**

In addition to the active ingredients, the medicine also contains:

Light mineral oil, White petrolatum

**What the medicine looks like and the contents of the package:**

An ointment in a white-yellowish color.

**Manufacturer and license holder:**

Teva Israel Ltd., 124 Dvora HaNevi'a St., Tel Aviv 6944020

The leaflet was revised in November 2021 according to MOH guidelines.

**Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health:**

138 89 27616

**teva**

LESH OINT PL SH 071221

الضغط على الرابط «تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الموقع المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

- (5) **كيفية تخزين الدواء؟**
- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان ملائم بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
  - لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
  - يجب حفظ هذا الدواء دون 25 درجة مئوية.
  - لا يجوز رمي أي دواء في المجاري أو في القمامه. إسأل الصيدلي عن كيفية إلقاء أي دواء لم تجد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) **معلومات إضافية:**

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً:

Light mineral oil, White petrolatum

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

مرهم بلون أبيض ضارب إلى الصفرة.

الم المنتج وصاحب الإمتياز:

تيفع إسرائيل م.ض.

شارع دفورة متفيه 124، تل أبيب 6944020

تم إعداد النشرة في تشرين الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

138 89 27616

من أجل سهولة وتوسيع القراءة، تحت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

نتمة طريقة الاستعمال

هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

يجب الامتناع عن تمسك الدواء بالعينين أو مع قناة الأنف الخارجية.

إذا استعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

من هذا المرض، عليك التوجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

يجب المواظفة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الممتدة! يجب تشخيص طابع

الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا تزرت الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء،

استشر الطبيب أو الصيدلي.

**(4) الآثار الجانبية**

كما بكل دواء، إن استعمال مرهم ليشكوتان قد يسبب آعراض جانبية لدى بعض المستعملين.

لا تندهى من قائمة الآثار الجانبية. من الجائز لأنها

تعانى أيا منها.

يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً إذا ظهر رد فعل موضعي حاد (نادر).

**آعراض جانبية إضافية:**

• أحمرار

• تهيج

• إثبات موضعي

• الشعور بحرق موضعي

• ألم موضعي أو إنتفاخ

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الآثار الجانبية،

أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة.

عليك استشارة الطبيب.

**التبليغ عن اعراض جانبية**

بالإمكان التبليغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

**typo**  
pharma