

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة  
**(مستحضرات) - 1986**  
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

# ليشكوتان مرهم

التركيب

باروموميسين (ك سولفات) 15%

ميتيل بنزيثيونيوم كلوريد 12%

Methylbenzethonium chloride 12%

معلومات عن المركبات غير الفعالة أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إن النشرة بمعنى حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.  
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفر لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.  
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطي هذا الدواء للأخرين.  
فهؤلئك يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

**(1) لأي غرض مخصص الدواء؟**  
معالجة داء الليشمانيات الجلدي موضعياً.

**الفصيلة العلاجية:**

باروموميسين: هو مضاد حيوى أمينوچليکوكوزيدي.  
ميتيل بنزيثيونيوم كلوريد: نشار رباعي ذو تأثير مضاد للجراثيم.

**(2) قبل إستعمال الدواء**

**لا يجوز إستعمال هذا الدواء:**

- إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته أو للنيوميسين.
- لا يجوز الإستعمال في العينين.
- لا يجوز الإستعمال في الأذن الخارجية في حال كانت طبلة الأذن مثقبة.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:**  
لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

- إذا كنت في فترة الحمل أو في فترة الإرضاع.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد، الكلى /المسالك البولية أو السمع.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء مثل نيوميسين، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمالك للدواء.

**التدابير بين الأدوية:**

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرأ، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

**الحمل، الإرضاع والخصوبة**  
لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت حامل أو مرضعة، دون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج.

## 3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.  
عليك الإستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.  
المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

**تعليمات الإستعمال:**

- 1- يجب تنظيف المنطقة المصابة وتنطفيتها تماماً بالمرهم.  
بالإمكان التفصيد بضماد عميق.
  - 2- يجب دهن المرهم مرتين يومياً لفترة 10 أيام تقريباً. إذا لم يحصل شفاء تام، على الطبيب التفكير بإعطاء دورة علاجية إضافية قدرها 10 أيام.
- يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب تعليمات الطبيب المعالج.

**لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.**

يجب إتمام كامل العلاج الدوائي. لا يجوز التوقف عن إستعمال الدواء إلا حسب تعليمات الطبيب حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي.

## طريقة الإستعمال

يجب الإمتناع عن تماس الدواء بالعينين أو مع قناة الأذن الخارجية.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بقع طفل بالخطأ من هذا المرهم، عليك التوجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أستلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال مرهم ليشكوتان قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين.

لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً إذا ظهر رد فعل موضعي حاد (نادراً).

## أعراض جانبية إضافية

• إحمرار

• تهيج

• التهاب موضعي

• الشعور بحرق موضعي

• ألم موضعي أو انتفاخ

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

## التبليغ عن أعراض جانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

## 5) كيفية تخزين الدواء؟

- تحفب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأو الرضيع وذلك لتفادي إصطيهات بالتسنم. لا تنسى التقيق بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب حفظ هذا الدواء دون 25 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي أدوية في المجاري أو في القمامه. إسأل الصيدلي عن كيفية إتلاف أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

## 6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً:  
Light mineral oil, White petrolatum

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:  
مرهم بلون أبيض ضارب إلى الصفرة.

الم المنتج وصاحب الإمباراز:  
تيفع إسرائيل م.ض.

شارع دفورة هنفيته 124، تل أبيب 6944020

تم إعداد النشرة في تشرين الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

138 89 27616

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.