

نشرة طبيَّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالِية

(مستحضرات) 1986

يُستَوَق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

ألبراليد أقراص 0.25، 0.5، 1 ملغ

ألبراليد **0.25**: يحتوي كلُّ قرص على:

ألبرازولام 0.25 ملغ

ألبراليد **0.5**: يحتوي كلُّ قرص على:

ألبرازولام 0.5 ملغ

ألبراليد **1**: يحتوي كلُّ قرص على:

ألبرازولام 1 mg

لمعالجة المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في المستحضر - انظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

أقرأ النشرة **بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**.
يحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأطفال.
قد يضرهم هذا الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

ما هي أهم المعلومات التي يجب عليك معرفتها عن ألبراليد؟

استعمال هذا الدواء مع أدوية من فصيلة الأفيونيّات، مع أدوية أخرى منبّطة للجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو مع الكحول قد يسبب شعوراً بالميل الشديد إلى النوم، صعوبات في التنفّس (تنبّيطاً تنفّسياً)، غيبوبة وموتاً.

مقمّمة لنشرة المستهلك للبينزوديازيبينات

ينتمي هذا الدواء إلى فصيلة البيّنزوديازيبينات، التي تتّصف بصفتها خاصّة تستوجب الحذر الشديد عند استعمالها. هناك أهمية كبيرة للمتابعة الطبيّة عن كثب عند استعمال هذا الدواء.

عند استعمالك لهذا الدواء احرص على مراجعة الطبيب بعد **4-2 أسابيع**، لأنّ العلاج خصّص لفترات زمنيّة قصيرة فحسب.

قد يؤدي الاستعمال المتواصل للدواء إلى تقليل تأثير الدواء. قد يسبب الاستعمال المتواصل لعرض الاعتماد الشديد، الذي يجعل إيقاف استعمال المريض للدواء صعباً.

- يكون إيقاف العلاج غير المرافق مصحوباً بأعراض الانسحاب، مثل: التوتّر، العصبية، الارتباك، الارتجاج، الأرق، آلام البطن، التقيؤات، التقيؤ، التعرّق، التشنّجات، والتقلّصات وآلام العضلات.

- أحياناً، قد يؤدي الاستعمال المتواصل للدواء إلى حدوث تغيّرات في أنماط السلوك وإلى نشوء الأفكار المزعجة. - بعضيها يتوخى الحذر عند المشي خاصة لدى المسنين، لأنّ الدواء يقلل اليقظة ويخلّ أحياناً بتناسق حركات الجسم، ولذلك هناك تحوّف من التصرّف أو السقوط.

1. لأي غرض مخصّص هذا الدواء؟

الدواء مخصّص لعلاج أعراض التوتّر والقلق، القلق المصحوب بالانكباب وحالات الهلع المصحوبة أو غير المصحوبة بالرّهاب.

الفصيلة العلاجية: بينزوديازيبينات.

2. قبل استعمال الدواء:

✗ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة ألبرازولام، لبيّنزوديازيبينات أخرى أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كنت تستعمل أدوية لعلاج التوتّرات الفطرية، بما في ذلك كيتوكونازول وإيتراكونازول.

❗ تحذيرات خاصّة تتعلّق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بألبراليد، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت من انكباب، أمزجة منقبّلة، أفكار

انتحارية أو سلوك انتحاريّ.

- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكليتين.
- كنت تعاني من مرض في الرئتين أو من مشاكل في التنفّس.
- كنت حاملًا أو تخططين للحمل (انظري لاحقاً "الحمل، الإرضاع والخصوبة")
- كنت مرضعًا أو تخططين للإرضاع (انظري لاحقاً "الحمل، الإرضاع والخصوبة")
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من المعاقرة أو الاعتماد على الكحول، أدوية ملزّمة بوصفة طبيب أو المخدرات.

❗ التدخين:

يقال للتدخين من تركيز الدواء في الجسم بالمقارنة مع غير المدخّنين.

❗ الأوالد والمراهقون:

هذا الدواء غير مخصّص لاستعمال لدى الأولاد والمراهقين الذين سنّهم دون الـ **18** لعدم توفّر معلومات بخصوص سلامة استعمال هذا الدواء وفعاليّته لدى الأوالد والمراهقين.

❗ الاستعمال لدى المسنّين:

المرضى المسنّون حسّاسون بشكل خاصّ للأعراض الجانبية المرتبطة بالجرعة الدوائية خلال فترة استعمال ألبراليد.

❗ التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب، فيّتامينات وإضافات غذائية، فإخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

- الأفيونيّات، لأنّ الإعطاء بالمجم مع ألبراليد قد يزيد من خطر التنبّيط التنفّسيّ (انظر في بداية هذه النشرة "ما هي أهم المعلومات التي يجب عليك معرفتها عن ألبراليد؟").
- أدوية مضادّة للقلطريّات (على سبيل المثال كيتوكونازول، إيتراكونازول) (انظر في بداية هذا الفصل "لا يجوز استعمال الدواء إذا").
- أدوية لعلاج القلق أو الاكتئاب (على سبيل المثال فينازودون، فلوروفكسامين، فلوكسيتين، پاروكسيتين، سيرترالين).
- مسكن الإلام الناركوتيّ پروبيوكسيفين.
- حليب منع الحمل.
- أدوية لعلاج المرع (على سبيل المثال كاربامازيبين).
- أدوية مضادّة للذهان تستعمل لعلاج الأمراض النفسية مثل الفصام.

- مضادات الهيستامين المستعملة لتخفيف الأرجيّا.
- مضادات حيويّة معنيّة من فصيلة الماكروليدات (على سبيل المثال إريثروميسين، كلاريثروميسين).
- إيزونيازيد (لعلاج السل).
- سيميثيدين (لعلاج قرحة المعدة).
- مضادات الاكتئاب ثلاثيّة الحلقات (على سبيل المثال إيميبرامين، ديسبرامين).
- حاصرات قنوات الكالسيوم (على سبيل المثال نيليتازيم، نيكاردين، نيفيديين).
- سيكلوسبورين.
- إيزوتامين (لمنع وعلاج الميجرينا).
- أمبودارون (لعلاج اضطرابات النظم).

- المخدرات أو أدوية إضافية تسبب الميل إلى النوم أو الدوار. قد يفاقم ألبراليد الميل إلى النوم أو الدوار عند تناول مع المخدرات أو مع أدوية تسبب الميل إلى النوم أو الدوار.

- ❗ استعمال الدواء والطعام:** عصير الجريبفروت - قد يرفع تركيز ألبراليد في الدم.
- ❗ استعمال الدواء واستهلاك الكحول:** لا يجوز شرب الكحول أو تناول أدوية أخرى قد تسبب كلاً ميلاً إلى النوم أو دوخًا أثناء ذلك استعمال ألبراليد، دون استشارة طبيبك. عند استعمال ألبراليد سوية مع الكحول أو مع أدوية تسبب الميل إلى النوم أو الدوار، فإن ألبراليد قد يفاقم الميل إلى النوم أو الدوار. لذلك:

- ❗ استعمال الدواء والطمعام:** عصير الجريبفروت - قد يرفع تركيز ألبراليد في الدم.
- ❗ استعمال الدواء واستهلاك الكحول:** لا يجوز شرب الكحول أو تناول أدوية أخرى قد تسبب كلاً ميلاً إلى النوم أو دوخًا أثناء ذلك استعمال ألبراليد، دون استشارة طبيبك. عند استعمال ألبراليد سوية مع الكحول أو مع أدوية تسبب الميل إلى النوم أو الدوار، فإن ألبراليد قد يفاقم الميل إلى النوم أو الدوار. لذلك:

استشيري طبيبك إذا كنت حاملًا أو تخطّطين للحمل، لأنّ ألبراليد قد يضرّ جنينك. يجب على طبيبك أن يقرّر ما إذا كان عليك استعمال ألبراليد خلال فترة الحمل.

الإرضاع
استشيري طبيبك إذا كنت مرضعًا أو تخطّطين للإرضاع. لا يجوز الإرضاع والخصوبة"

لا يجوز الإرضاع خلال فترة استعمال ألبراليد، لأنّ ألبراليد ينتقل إلى حليب الأمّ الحامض بك وقد يضرّ طفلك الرضيع. كلّمَي طبيبك عن أفضل طريقة لإطعام طفلك الرضيع، إذا كنت تستعملين ألبراليد.

❗ المساقاة واستعمال الماكناّت:

قد يجعلك ألبراليد نعسانًا أو مصابًا بالدوار وقد يبطئ التفكير والفعالية الحركية لديك، لا يجوز المساقاة، تشغيل الماكناّت الخطرة أو القيام بنشاطات خطيرة، إلى أن تعرف كيف يؤثر ألبراليد عليك.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي ألبراليد على اللاكتوز، وهو نوع من السكّرّيّات. إذا أخبرك طبيبك بأنّ لديك عدم تحمّل لسكّرّيّات معينة، فاستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

يحتوي ألبراليد على بينزوات الصوديوم بكميّة تعادل 0.12 ملغ في القرص. قد يفاقم بينزوات الصوديوم اليرقان (اصفرار الجلد

والعينين) لدى المواليد الجدد (الذين يبلغون حتى 4 أسابيع من العمر).

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في القرص فلذلك يعتبر خاليًا من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّدًا من الجرعة الدوائية وما هي كميّته العلاج بالدواء.

- الجرعة الدوائية وكميّته العلاج سيجدها الطبيب فقط.
- الجرعة الدوائية المتبّعة عادة هي:**

لدى البالغين:

لعلاج القلق: يبدأ العلاج عادةً بتناول قرص واحد من 0.25 ملغ أو قرص واحد من 0.5 ملغ 3 مرّات على اليوم. لذلك، تستمّثل الجرعة الدوائية اليوميّة على 0.75 ملغ إلى 1.5 ملغ. يمكن رفع الجرعة الدوائية بالتدريج (يمكن زيادة الجرعة بـ 1 ملغ كل 3-4 أيّام) حتّى الوصول إلى جرعة دوائية يوميّة شاملة من 3 ملغ، متّمة على طول اليوم.

يمكن رفع الجرعة الدوائية للوصول إلى التأثير العلاجيّ الأقصى، بوميّة قصوى من 4 ملغ، يتمّ إعطاؤها بجرعات مقسّمة.

لعلاج الهلع: يبدأ العلاج عادةً بتناول قرص واحد من 0.5 ملغ 3 مرّات في اليوم. يمكن رفع الجرعة الدوائية بالتدريج اعتمادًا على ردّ الفعل (يمكن زيادة الجرعة بـ 1 ملغ كل 3-4 أيّام) حتّى الوصول إلى جرعة دوائية يوميّة أكبر من 4 ملغ، مقسّمة على طول اليوم. عندما تكون هناك حاجة إلى رفع الجرعة الدوائية، فمن المتّبع ابتداءً رفع الجرعة الدوائية في ساعات الليل قبل رفع الجرعة الدوائية في ساعات النهار، للتأكد من أنّك ستكون يفظًا أكثر خلال النهار. إذا بدأت تشعر بأعراض جانبية، فقد يقال

الطبيب الجرعة الدوائية.

المسنّون أو متلقّ العلاج الذين يعانون من مرض يسبّب الإرهاق: الجرعة الدوائية الابتدائية المبيّمة هي 0.25 ملغ مرّتين إلى ثلاث مرّات في اليوم. يمكن رفع هذه الجرعة الدوائية بالتدريج، وفقًا لتعليمات الطبيب، بحسب الحاجة وإذا لم تُعان من أعراض جانبية.

مُدّة العلاج:

ألبراليد مخصّص للعلاج القصير الأمد (ليس أكثر من 8-12 أسبوعًا).

سيقوم الطبيب عادةً بتقييم وضعك عند نهاية 4 أسابيع على الأكثر وسيقرّر ما إذا كان يُطلَب استمرار العلاج.

دوائية مفرطة وأعراض جانبية خطيرة، بما في ذلك الغيبوبة والموت. حدثت أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك الغيبوبة والموت لدى الأشخاص الذين عافروا البيّنزوديازيبينات أو استعملوها بشكل خاطئ، بما في ذلك ألبراليد. بل قد تشتمل هذه الأعراض

القرص إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم فقد تعاني من ميل إلى النوم، ارتباك، خلل في التناسق الحركي، قلة المعسكات وغيبوبة. تمّ التبليغ أيضًا عن الموت.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد أو شخص آخر ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فتناولوا لحظة تتدرّك إلا إذا حان تقريبا موعد تناول الجرعة القادمة. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة تعويضًا عن الجرعة المنسية.

لا تجوز زيادة الجرعة الدوائية دون استشارة الطبيب، حتّى إذا كنت تعتقد أنّك قد نسيت الدواء. قد تسبّب الأدوية من فصيلة البيّنزوديازيبينات اعتمادًا عاطفيًا أو بدنيًا، حتّى لو أوصي باستعمالها.

إذا توفّقت عن تناول الدواء:
حتّى لو طرأ تحسّن على حالتك الصحيّة، فلا يجوز إيقاف العلاج بدون دواء دون استشارة الطبيب، لأنّه يجب تقليل الجرعة الدوائية بشكل تدريجيّ.

الاعتماد البدني وعودة الفعل الانسحابية.
قد يسبب ألبراليد اعتمادًا بدنيًا وعودة فعل انسحابية.

إذا توفّقت عن تناول الأقراص دفعة واحدة (وليس تدريجيًا)، فقد تعاني من أعراض جانبية شديدة وتشكّل خطرًا على الحياة بما في ذلك حركات ارتداد فعل أو تعابير وجه شاذة، اختلاجات، تغيرات خطيرة في الوضع النفسي أو في الجهاز العصبي، انكباب، رؤية أو سماع أشياء لا يراها أو يسمعا الآخرين، زيادة متطرّفة في النشاط أو الكلام، فقدان الاتصال بالواقع وأفكار أو أفعال انتحارية. اتصل بطبيبك أو توجّه إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى فورًا إذا كنت تعاني من أيّ هذه الأعراض.

- قد يعاني بعض متلقّي العلاج الذين يتوقّفون عن تناول البيّنزوديازيبينات دفعة واحدة (ليس تدريجيًا) من أعراض جانبية قد تستمرّ لمدة أسابيع إلى أكثر من 12 شهرًا، بما في ذلك قلق، مشاكل في الذاكرة، التعلّم أو التركيز، انكباب، مشاكل في النوم، إحساس كأنّ هناك حشرات تزحف تحت الجلد، ضعف، ارتجاج، تقلّصات في العضلات، إحساس بالذّع أو بالوخز في اليدين، الذراعين والرجلين والطنين في الأذنين.
- بالإضافة إلى ذلك فقد تعاني من أعراض الانسحاب (انظر البند 4 "الأعراض الجانبية").

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملتصق وتأكّد من الجرعة في كل مرّة تتناولون فيها الدواء. ضع النظارات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل كلِّ دواء، قد يؤدي استعمال ألبراليد إلى نشوء أعراض جانبية عند تعاطي المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيّ واحد منها.

إذا نشأت أعراض جانبية لألبراليد فإنّها تشاهد غالبًا في بداية العلاج وتحقّي عادةً مع استمرار العلاج الدوائيّ. قد يسبب ألبراليد أعراضًا جانبية خطيرة، تشمّل (انظر في بداية هذه النشرة "ما هي أهم المعلومات التي يجب عليك معرفتها عن ألبراليد؟"):

خطر المعاقرة، الاستعمال الخاطئ والإدمان.
هناك خطر للمعاقرة، الاستعمال الخاطئي والإمان عند استعمال البيّنزوديازيبينات بما في ذلك ألبراليد، مما قد يؤدي إلى جرعة دوائية مفرطة وأعراض جانبية خطيرة بما في ذلك الغيبوبة والموت.

حدثت أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك الغيبوبة والموت لدى الأشخاص الذين عافروا البيّنزوديازيبينات أو استعملوها بشكل خاطئ، بما في ذلك ألبراليد. بل قد تشتمل هذه الأعراض

الجانبية الخطيرة أيضًا على هلوسات، جنون الارتباب (بارانويا)، أفكار أو أفعال انتحارية، اختلاجات وصعوبات في التنفّس. اتصل بطبيبك أو توجه إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى فورًا إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض الجانبية الخطيرة.

- قد تدمن على ألبراليد حتى لو كنت تستعمله وفقًا لإرشادات الطبيب.
- الاختلاجات: قد يسبّب إيقاف ألبراليد الاختلاجات والاختلاجات من دون توقّف (ستاتوس إيبينيتيكيوس - حالة صرعية).
- الهوس: قد يسبب ألبراليد زيادة في النشاط والكلام (هوسًا خفيفًا (هيبومانيا) وهوسًا) لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

توجه فورًا لتلقّي المساعدة الطبية المستعجلة في الحالات التالية:

- تباطؤ في التنفّس أو تنفّس سطحي
- توقف التنفّس (قد يؤدي إلى توقف القلب)
- ميل مفرط إلى النوم

تشمل الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لألبراليد:

النعاس، الشعور بالدوار.
أعراض جانبية أخرى:

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - قد تؤثر على أكثر من 10 بين 100 مستعملين:

نعاس، شعور بالدوار، انكباب، صداع، جفاف الفم، إمساك، إسهال، إرهاق وتعب، مشاكل في التناسق الحركي، عصبية، تضمر الذاكرة، دوام، أرق، اضطراب معرفي، اضطراب في الكلام (رّة - عُسر النطق)، قلق، حركات لاإرادية شاذة، انخفاض الشهوة الجنسيّة، ارتباك، انخفاض في إفراز اللعاب، غثيان، تقيؤ، انزعاج في البطن، احتقان الأنف، بضع سريع (تسرّع القلب)، الأام في الصدر، تشوّش الرؤية، تعرّق، طفح جلدي، زيادة في الشهية، انخفاض في الشهية، ارتفاع الوزن، نقصان الوزن، صعوبة في التبول، اضطرابات في الدورة الشهرية.

أعراض جانبية شائعة (common) - قد تؤثر على مستعمل 1 محذ أقصى من بين 10 مستعملين:

إغماء، عدم الهدوء البدنيّ (تملّط)، تزايد في إفراز اللعاب، دقات قلبيّة، ضعف دم منخفض، تصلّب، ارتعاش، التهاب الجلد، أرجية، تشنّج العضلات، ارتفاع في الشهوة الجنسيّة، تغيّر في الشهوة الجنسيّة (غير محدّد)، ضعف، اضطرابات في التوتّر العضليّ، عدم الهدوء (هياج)، انعدام المكياج، تململ، ثرثرة، اضطرابات وعائية حركيّة، شعور غير واقعيّ، أحلام شاذة، خوف، شعور بالحر، فرط التنفّس، تلوّث المسالك التنفّسية العلويّة، طنين (ضجيج في الأذنين)، تقلّصات في العضلات، تصلّب العضلات، اضطراب حركيّة في الأداء الجنسيّ، وُدمة، سلس البول، تلوّث. إذا ظهر عرض جانبي، إذا تقام أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة المتّصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، عن طريق إدخال الحقول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il/

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمّم! هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومحال روثبهم، وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. date) المدوّن على العبوة الكرتونية وعلى شريط الحويصلات الموجود داخلها. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركّب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

ألبراليد 0.25:

Lactose, Microcrystalline Cellulose (PH-101), Pregelatinized Oxidized Potato Starch, Microcrystalline Cellulose (PH-102), Magnesium stearate, Docusate Sodium, Colloidal Silicone Dioxide, Sodium Benzoate

ألبراليد 0.5:

Lactose, Microcrystalline Cellulose (PH-101), Pregelatinized Oxidized Potato Starch, Microcrystalline Cellulose (PH-102), Magnesium stearate, Docusate Sodium, Colloidal Silicone Dioxide, Sodium Benzoate, Iron Yellow Oxide

ألبراليد 1:

Lactose, Microcrystalline Cellulose (PH-101), Pregelatinized Oxidized Potato Starch, Microcrystalline Cellulose (PH-102), Magnesium stearate, Docusate Sodium, Colloidal Silicone Dioxide, Sodium Benzoate, Indigo Carmine (E132).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

يتوفّر الدواء على شكل عبوات كرتونية تحتوي على مستطيّلة الشكل، مع خطّ للسطر في جانب واحد، ومقوّش عليها (لويحات).

قد لا تسوّق جميع أحجام العبوات.

ألبراليد 0.25: أقراص باللون الأبيض المائل إلى الصفرة، مستطيّلة الشكل، مع خطّ للسطر، ومقوّش عليها "CTS".

ألبراليد 1: أقراص باللون الأزرق الفاتح، مستطيّلة الشكل، مع خطّ للسطر، ومقوّش عليها "CTS".

المنتج/صاحب الامتياز وعلوانه: ك ص ط للصناعات الكميائيّة م.ض، هاكيدما 3، كريات مآخي. تمّ تحرير هذه النشرة في 01/2022 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الأدوية في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

ألبراليد 0.25: 1030128371

ألبراليد 0.50: 1030228372

ألبراليد 1: 1030328373

من أجل التبسيط والتسهيل للقراء، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة الملكر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.



LFL 343 01/22