

## עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **אג'ובי**

תמייסה להזרקה תת-עורית  
בمزרק מוכן לשימוש

#### **הרכב**

כל מזרק מכיל:  
Fremanezumab 225 mg / 1.5 ml

פרמאנזומאב 225 מ"ג / 1.5 מ"ל

למידע על מרכיבים בלתי פעלים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעין את העלון עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.  
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

אג'ובי משמש למניעת מיגרנה במוגדים שסובלים לפחות 4 ימי מיגרנה בכל חודש.  
**קבוצה רפואיית:** נוגדן מונוקלוני הומאני ספציפי לפפטיד הקשור לנ-לקלאציטונין.

אג'ובי הוא תרופה שמכילה את המרכיב הפעיל פרמאנזומאב, נוגדן מונוקלוני, שהוא סוג של חלבון שמחזה ונקשר למטרה ספציפית בגוף.

בגוף ישנו חומר שנקשר לפפטיד הקשור לנ-לקלאציטונין (CGRP) שיש לו תפקיד חשוב במיגרנה.  
פרמאנזומאב נקשר לנ-CGRP ומונע את פועלתו. הירידה בפעולות של CGRP מפחיתה את התקף המיגרנה.

אג'ובי מפחית את שכיחות התקף המיגרנה ואת הימים עם כאבי ראש. תרופה זו מפחיתה גם את קשיי התפקוד הקשורים למיגרנה ואת הצורך בתרופות המשמשות להתקף מגרנה.

### **2. לפני השימוש בתרופה**

#### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרג) לחומר הפעיל פרמאנזומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

**ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**  
פנה מיד לרופא, לרוקח או לאחות אם יש לך תגובה כלשהם של תגובה אלרגית חריפה, לדוגמה,  
קשיי נשימה, נפיחות של השפתיים או הלשון או פריחה חמורה לאחר ההזרקה אג'ובי. תסימנים אלה  
עלולים להתרכש תוך 24 שעות מתחילת הטיפול בתרופה, אך לעיתים יכולים להופיע מאוחר יותר.

ספר לרופא אם יש לך או היו לך מחלות לב וכלי דם לפני השימוש בתרופה, כיוון שาง'ובי לא נחקר במטופלים עם מחלות לב וכלי דם מסוימות.

#### **ילדים ומתבגרים**

าง'ובי אינו מיועד לטיפול ילדים ובמתבגרים מתחת גיל 18 שנים כיוון שהוא לא נחקר בקבוצת גיל זו.

#### **תగובות בין תרופתיות**

אם אתה לוקח, או אם לוקח אחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח.

#### **הירין והנקה**

אם את בהירין, חושבת שיתכן שאתה בהירין או מתכנתת בהירין, היועצי לרופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו. עדיף להימנע משימוש באג'ובי במהלך ההירין כיוון שההשפעות של תרופה זו על נשים בהירין לא ידועות.

אם את מיניקה או מתכנתת להניק היועצי לרופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה. את והרופא שלך תצטרכו להחליט אם תשתמש באג'ובי במהלך הנקה.

**נהיגה ושימוש במכונאות**  
תרופה זו אינה צפואה להפעיל על היכולת שלך לנוהג או להפעיל מכונות.

**מידע חשוב על חלק הממרכיבים של התרופה**  
תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן במזרק ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח ב涅געים למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

าง'ובי ניתן בזירה מתחת לעור (זרקה תת-עורית). הרופא או האחות יסביר לך או למטפל שלך איך לתת את הזרקה. אל תזריק אג'ובי לפני שאתה או המטפל שלך הודרכתם על ידי רופא או אחות.  
קרא בעיון את "הוראות השימוש" למזרק המוקן לשימוש לפני השימוש באג'ובי.

**כמה ומהי להזריק**  
הרופא שלך ידוע ויחילט יחד איתך על משטר המינון שהכי מתאים לך. ישנן שתי אפשרויות למשטר מינון:

- זריקה אחת (225 מ"ג) פעם בחודש (מינון חודשי) או
- שלוש זריקות (675 מ"ג) פעם בשלושה חודשים (מינון תלת-חודשי)

אם המינון שלך הוא 675 מ"ג, הזרק את שלוש הזריקות אחת אחרי השניה, כל אחת במקום אחר.  
**אין לעברו על המנה המומלצת.**

השתמש בשיטת תזכורת כמו תזכורות בלוח השנה או ביום שיעזרו לך לזכור את המנה הבאה כדי שלא תפספס מנה או תיקח מנה מוקדם מדי.

**אם השתמשת ביוטר אג'ובי ממה הייתה צריכה**  
אם הזרקת יותר אג'ובי ממה שנרשם לך, יש לפנות לרופא.

**אם שכחת או פספסת הזרקה של אג'ובי**

אם פספסת מנה של אג'ובי, הזרק את המנה שנשכחה מיד כשתוכל. אל תזריק מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. אם אין בטוח מותך להזריק את המנה הבאה, פונה לרופא, לרוקח או לאחות.

יש להתמיד בטיפול כפי שהוא מילץ על ידי הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הין זוקם להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו **בכל תרופה, השימוש באג'ובי עלול לגרום לתופעות לוואי** בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לוואי, שועלות להופיע:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להשפיע על יותר מ- 1 מתוך 10 אנשים)  
כאב, התקששות או אדמדומים באזור ההזרקה.

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 אנשים)  
גירוד באזור ההזרקה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים)  
פריחה באזור ההזרקה.

תופעות אלרגיות כמו פריחה, נפיחות או חרלה (מחלת עור) (ראה סעיף 2).

תופעות לוואי נדירות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 1,000 אנשים)  
תגובהות אלרגיות חמורות (התסמים עלולים לכלול קשי נשימה, נפיחות של השפטים או הלשון או פריחה חמורה) (ראה פרק 2 "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה")

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואו חמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי  
שלא צינה בעלוון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי"  
על בוט טיפול תרופה" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעליה! תרופה זו וככל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חדש.
- **תנאי אחסון**
- יש לאחסן במדריך (C-8°-2). אין להקפיא.
- יש לאחסן את המדריך המקורי לשימוש בהאריזה המקורי על מנת להגן על התרופה מאור.
- ניתן להוציא את התרופה מהמדריך ולשמור אותה בטמפרטורה מתחת ל - 24 עד 25°C במשך 24 שעות. יש להשליך את התרופה אם היא נשארה מחוץ למדריך במשך יותר מ - 24 שעות.
- אין לחושף לשמש ישירה או לחום קייזני.
- אין לנער.
- אל תשתמש בתרופה אם אתה מב Hinן שהאריזה החיצונית פגומה, המדריך ניזוק או אם התרופה עכורה, שינויה את צבעה או מכילה חלקיקים.

- המזרק הינו לשימוש חד פעמי בלבד.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

## **6. מידע נוסף**

### **נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Sucrose, L-histidine hydrochloride monohydrate, L-histidine, polysorbate 80, disodium ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) dihydrate and water for injections.

#### **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:**

תמיישה שקופה חסרת צבע עד צהבהבה במזרק מוקן לשימוש עם מחט להזרקה תת-עורית, ארזה  
בארייזת קרטון.

כל מזרק מוקן לשימוש מכל 1.5 מ"ל תמיישה להזרקה. כל אריזה מכילה 1 או 3 מזרקים מוכנים  
לשימוש.  
יתכן שלא כל גודלי הארייזות משווים.

#### **שם בעל הרישום, הייצור וכתובתו:**

טבע ישראל בע"מ  
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

העלון נערך בינואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 162.86.35836

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני  
המינים.


**הוראות שימוש**  
**אג'ובי 225 מ"ג תמייסה להזרקה בمزרק מוקן לשימוש**  
**פרמאנזהומאב**

לפני השימוש באג'ובי מזרק מוקן לשימוש, קרא ועקוב בזהירות שלב אחר שלב אחרי הוראות השימוש.

**מידע חשוב:**

- אג'ובי מזרק מוקן לשימוש הינו לשימוש חד פעמי בלבד.
- כל מזרק מוקן לשימוש של אג'ובי מכיל 225 מ"ג של פרמאנזהומאב. בהתאם למינון שאתה מקבל תצטרכך להשתמש במזרק אחד או בשלושה מזרים מוכנים לשימוש.
- אג'ובי מזרק מתחת עור (זריקה תת-עורית). אל תזריק לעצמך עד שתתקבל הדרכה מהרופא או מהאחות.
- קרא בזהירות את העלוון לצריך של אג'ובי כדי ללמידה עוד על התורופה.
- בשום שלב, אין לשורר אחרה את הבוכנה, כיון שהיא עלול לשבור את המזרק המוקן לשימוש.
- אין לנער את המזרק המוקן לשימוש.
- אם נותרו בתוך הארייה החיצונית מזרים בהם לא השתמשת, יש להחזיר אותם מיד למקרר.


החלקים של מזרק אג'ובי מוקן לשימוש:



**שלב 1: הכנות לפני ההזרקה**

- a. אוסף את הציוד הבא עבור ההזרקה.
  - 1 או 3 מזרים של אג'ובי, שיאפשרו זריקת אחת או 3 זריקות בהתאם למינון שלך.
  - 1 ספוגית אלכוהול לכל זריקה.
  - פד גזה או כדור צמר גפן לכל זריקה.
  - מיכל איסופו למזרקים משומשים או מיכל איסופו עמיד בפni ניקוב.
- b. סדר את הציוד שאספה על משטח נקי ושטוח.
- c. המתן 30 דקות כדי לאג'ובי להגיע לטמפרטורת החדר על מנת להפחית אי-נוחות במהלך ההזרקה.
  - אין להשאיר את המזרק המוקן לשימוש לאור שמש ישיר.
  - אין לחמם את המזרק המוקן לשימוש בעזרת מיקרוגל או בכל מקור חום אחר.
- d. שטוף את ידיך בסבון ומים, ויבש אותן היטב עם מגבת נקיה.
- e. בוחן את המזרק המוקן לשימוש של אג'ובי.
  - בדוק את תוכית המזרק. ודא שהכתב "AJOVY" מופיע על גבי התווית.
  - בדוק שההתויפה בתוך המזרק נראית צלולה ובבעה שקוף עד צהבהב.
  - יתכן שתוראה בעות אויר קטנות בתוך המזרק המוקן לשימוש. זה תקין.
  - אל תשתמש במזרק המוקן לשימוש אם אתה מבחין באחד מהדברים הבאים:
    - המזרק נראה פגום.

- תאריך התפוגה חלף.
- התרופה נראהית עכורה, שינוי את צבעה או מכילה חלקיים.



#### a. בחר את אזור ההזרקה.

- בחר את אזור ההזרקה מהאזורים הבאים:
  - אזור הבطن, למעט כ- 5 ס"מ סביב הבטוב.
  - החלק הקדמי של הירכיים, לפחות כ- 5 ס"מ מעל הברך ו- 5 ס"מ מתחת למפשעה.
  - החלק האחורי העליון של הזרועות, באזוריים בשניים של החלק האחורי העליון.
  - אם נדרשות זריקות רבות ניתן להזריק אותן באותו אזור או באזורי שונים (בטן, ירכיים, זרועות), אך עליך להימנע מהזרקה בדיאק באותו המיקום.




#### d. נקבעת נקهة את אזור ההזרקה.

- נקבעת נקهة את אזור ההזרקה הנבחר באמצעות שימוש בספוגית אלכוהול חדשה.
- המנתן 10 שניות כדי לאפשר לעור להתיבש לפני ההזרקה.
- אין להזריק אג'יב לאזור רגיש, אדום, חם, חבול, נוקשה, מכועך או אזור המכיל צלקות או סימני מתיחה.

### שלב 2: איך להזריק


#### a. משוך את מכסה המחט ישר וזרוק אותו.

- אין להרכיב חזרה את מכסה המחט על המזרק המקורי לשימוש, כדי למנוע פציעה ויז hom.
- אל תיגע במחט.



#### b. הזרק על פי 4 השלבים שלහן.

1. צבוט בעדינות לפחות 2.5 ס"מ מהעור שיקית.	2. החדר את המחט לתוך העור שאתה צובט בזווית של 45° עד 90°.	3. דוחף את המכונה פנימה באיטיות.	4. דוחף את המכונה באיטיות עד הסוף ככל הניתן, כדי להזריק את כל התרופה.
--	---	----------------------------------	---



**ג. הוצאה המחט מהעור.**

- לאחר שהזרקה את כל התויפה, משור את המחט ישר החוצה.
- אל תרכיב מחדש את מכסה המחט על המחט בשום שלב על מנת למנוע פציעה ויזhom.



**ד. הפעל לחץ על אתר ההזרקה.**

- השתמש בצדור צמר גפן יבש ונקי או בפֶד גזה, כדי ללחוץ בעדינות על מקום ההזרקה לשער מספר שניות.
- אין לשפשף את אתר ההזרקה או להשתמש שוב במזרק מוכן לשימוש.

**שלב 3: השליך את המזרק המוכן לשימוש.**

**א. השליך מייד את המזרק המוכן לשימוש.**

- הניח את המזרקים המשומשים (עם המחט מחוברת אליו) בambil לאיסוף מזרקים משומשים מייד לאחר השימוש.
- אין לזרוק (להשליך) מזרקים, או מזרקים מוכנים לשימוש לאשפפה הביתית.
- אין למחרז את מיכל האיסוף המשומש.

**ב. שאל את הרופא, הרוקח או האחות איך לזרוק את המיכל עם המזרקים המשומשים.**

אם המינון שנרשם לך הוא 675 מ"ג, חזור על שלבים 1ה' עד 3א' עם המזרקים השני והשלישי כדי להזריק את כל המנה שנרשמה לך.