

## سيمفاكور 20، 40، 80

### أقرص صلبة

#### التريكي:

يحتوي كل قرص مطلي من سيمفاكور 20 على سيمفاستاتين 200 ملغ  
يحتوي كل قرص مطلي من سيمفاكور 40 على سيمفاستاتين 400 ملغ  
يحتوي كل قرص مطلي من سيمفاكور 80 على سيمفاستاتين 800 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومواد الحساسية في المستحضر، الرجاء أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية". انظر أيضاً الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

إن الخضرة يتمنح حتى نهايتها حتى يستعكلك للدواء.  
تحذري هذه النشرة على معلومات موجزة عن سيمفاكور. إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، توجه للطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجله. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.  
الدواء غير مخصص للأشخاص دون عمر 20 سنة.

#### 1) أقرص غرض الصبلة

يقلل سيمفاكور من نسب LDL ومركبات دهنية أخرى في الدم، ويرفع نسب HDL لدى مرضى يعانون من فرط شحوم الدم (ارتفاع نسبة الشحوم في الدم). لدى مرضى يعانون من مرض قلبي تاجي وفرط كوليسترول الدم، سيمفاكور يقلل من خطورة الوفيات العامة وذلك بتقليل الوفاة نتيجة الأمراض القلبية؛ يقلل من خطورة حدوث نوبة قلبية غير معينة؛ يقلل من خطورة تنفيذ إجراءات إعادة تدفق الدم للقلب (مثل عملية التصلب الجفائي أو القسطرة بواسطة البالون)؛ ويقلل من خطورة حدوث سكتة دماغية وتوقف انقباض عيارية (TIA - Transient Ischemic Attack)، HMG-CoA reductase إنزيم مبطئ الانزيم.

#### كيف يعمل سيمفاكور:

يحتوي سيمفاكور على مادة فعالة تسمى سيمفاستاتين. يستعمل (total cholesterol) نسبة خفض الشحوم الكوليسترول الإجمالي في الدم (LDL) ونسب المركبات الدهنية الصمصة الشحوم الثلاثية بالإضافة لذلك ليرفع سيمفاكور من نسب الكوليسترول "الجيد" (كوليسترول الـ HDL).

الكوليسترول هو أحد المركبات الدهنية الموجودة في الدم. يتألف الكوليسترول العام بشكل أساسي من كوليسترول الـ LDL والـ HDL. يسمى كوليسترول الـ LDL في كثير من الأحيان بالكوليسترول "السيء"، لأنه قد يتراكم على جدران الشرايين ويسبب وتكسب اللويحات. مع مرور الوقت فإن تراكم اللويحات قد يؤدي إلى تضيق الشرايين. إن هذا التضيق قد يبطئ أو يسد جريان الدم لأعضاء حيوية مثل القلب والدماع. قد يؤدي انسداد جريان الدم إلى نوبة قلبية أو إلى سكتة. يسمى كوليسترول الـ HDL في كثير من الأحيان بالكوليسترول "الجيد"، لأنه يساعد في منع تراكم اللويحات في الشرايين؛ ويمنع مرض القلب. الشحوم الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم التي قد تزيد من خطورة حدوث مرض قلبي. يمكن للحرص على اتباع عناية مقبولة بالكوليسترول خلال فترة تناولك لهذا الدواء

#### 2) قبل استعمال الدواء

##### لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البرجي) لـ سيمفاكور أو لكل واحد من المركبات الإضافية في يحتويها (البرجي) لـ سيمفاكور (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء").
- تتعاني حالياً من مشاكل في الكبد.
- كنت حاملاً أو مرضعة.
- كنت تتناول أدوية تحتوي على واحد أو أكثر من المواد الفعالة التالية:
  - إيتراكونازول، كيتوكونازول، بوساكونازول أو فلوكونازول (المستعملة لعلاج التلوثات الفطرية).

- إيريتروميسين، كلاريثروميسين أو تيليثروميسين (المستعملة لعلاج التلوثات).
- ميثبات بروتياز HIV مثل إيندينافير، نيفينديافير، ريتونايفير وساكوينافير (ميثبات بروتياز) المستعملة لعلاج تلوثات (HIV).
- بوسيفيريفر أو تيلابريفير (المستعملان لعلاج تلوث التهاب الكبد (C).
- نيفازولون (المستعمل لعلاج الإكتئاب).
- كوبيسيستات.
- جيميبروزيل (المستعمل لخفض الكوليسترول).
- سبكيوبين (المستعمل لدى متعاقبين بعد زراعة الأعضاء).
- داناژول (هورمون اصطناعي المستعمل لعلاج إنباتن بطانة الرحم، حالة تنمو فيها أجزاء من نسيج مخاطية الرحم خارج الرحم).
- لا يجوز تناول أكثر من 40 ملغ سيمفاكور. إذا كنت تتناول لوميتايد (لا يوجد استعمال علاج حالة خطرة ونادرة من الكوليسترول الوراثي). إرسال طبيبك إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان دواؤك يظهر أفعاله.

#### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

##### قبل العلاج بـ سيمفاكور، إحد الطبيب:

- عن كافة المشاكل الطبية الخاصة بك بما في ذلك الحساسية.
- إذا كنت تشرب كمييات كبيرة من الكحول.
- إذا عانيت في الماضي من مرض كبدي، فمن الجائز أن العلاج بـ سيمفاكور غير مناسب لك.
- إذا كنت مقبلاً على إحتياج عملية جراحية، فمن الجائز أن العلاج إلى التوقف عن تناول سيمفاكور لفترة قصيرة.
- إذا كنت تعاني من فشل تنفسي خطير.
- إذا كنت من أصل آسيوي، من الجائز أن يتطلب من أجلك مقداراً نوعياً آخر.
- إذا كنت تتناول أو تناولت خلال الأيام الـ 7 الأخيرة دواء يسمى حمض الفوسيفيد (دواء علاج التلوثات الجرثومي) إلاطعاء الفموي أو بالحقن، إن مشاركة حمض الفوسيفيد مع سيمفاكور قد يؤدي إلى مشاكل عضلية خطيرة (الشلل العضلات المخططة).

إتصل بالطبيب المعالج بشكل فوري إذا شعرت بألم في العضلات، حساسية أو ضعف عضلات غير مشخصة، ذلك لأنه في حالات نادرة، قد تكون المشاكل العضلية خطيرة، بما في ذلك التلوثات العضلات الذي يؤدي إلى ضرر كلوي، وفي حالات نادرة جداً إلى الوفاة.

إن خطورة تفكك العضلات تكون أكبر لدى المرضى الذين يتناولون مقادير واثية أكبر من سيمفاكور، خاصة مقداراً نوعياً قدره 80 ملغ. بالإضافة لذلك، فإن خطورة تفكك العضلات تكون أكبر لدى مرضى معينين. تحدث مع طبيبك إذا إنطبق على واحد مما يلي:

- كنت تتسكك كميات كبيرة من الكحول.
- وجدت لديك مشاكل في الكلى.
- وجدت لديك مشاكل في الغدة الدرقية.
- تبلغ من العمر 65 سنة أو أكثر.
- كنت امرأة.

حدثت لك في الماضي أي الصامسي عضلية خلال العلاج بأدوية لخفض الكوليسترول الصمصة ستاتينات أو فيبرات.

وجد أحد أو لثرب عائلتك مرض عضلي ورثائي.

كذلك، إذا لم تقرب أو الصيدلي إذا وجد لديك ضعف في الدم، من الجائز أن يتطلب الأمر فحوص وأدوية إضافية من أجل تشخيص وعلاج هذا الأمر.

#### الفحوص والمتابعة

قبل بداية استعمال الدواء وخلال فترة العلاج بالدواء يوجهك الطبيب لإجراء فحوص وذلك إذا وُجدت لديك أية أعراض لمشاكل في الكبد. وذلك لفحص وظائف كبدك. بعد بدء العلاج بـ سيمفاكور، من الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحص دم لفحص وظائف الكبد.

إذا كنت تعاني من السكري أو كنت معرضاً لخطورة تطور مرض السكري، يجب عليك طبيبك متابعة حثيئة. إن مرضاً خطورة تطور مرض السكري، إذا وجدت لديك نسب مرتفعة من السكريات والشحوم في الدم، ووزن زائد وضغط دم مرتفع.

#### التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إنها كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحد الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

إن تناول سيمفاكور مع أي من الأدوية أو المواد التالية قد يزيد من خطورة حدوث مشاكل عضلية (بعضها ضمن في الفقرة 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا:"). إذا توجب عليك تناول حمض الفوسيفيد عن طريق الفم لعلاج التلوث الجرثومي، ستحتاج إلى التوقف بشكل مؤقت عن العلاج بـ سيمفاكور. يوجهك الطبيب متى يمكنك البدء من جديد في تناول سيمفاكور بشكل آمن. إن تناول سيمفاكور سوية مع حمض الفوسيفيد قد يؤدي، في أحيان نادرة، إلى ضعف عضلي، حساسية في العضلات أو إلى ألم في العضلات (إنحلال العضلات المخططة). لمعلومات إضافية حول إنحلال العضلات المخططة انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية".

سبكيوبين (الذي يعطي في أحيان مقاربة للمتعاقبين بزراعة أعضاء). داناژول (هورمون اصطناعي الذي يستخدم لعلاج إنبات بطانة الرحم، حالة تنمو فيها أجزاء من نسيج مخاطية الرحم خارج الرحم).

أدوية تحتوي على مواد فعالة مثل إيتراكونازول، كيتوكونازول، فلوكونازول، بوساكونازول، أو فلوكونازول (المستعملة لعلاج التلوثات الفطرية). فيبرات مع مواد فعالة مثل جيميبروزيل أو بيزافيربات (المستعملة لخفض الكوليسترول).

إيريتروميسين، كلاريثروميسين أو تيليثروميسين (المستعملة لعلاج التلوثات الجرثومية).

ميثبات بروتياز HIV مثل إيندينافير، نيفينديافير، ريتونايفير وساكوينافير (المستعملة لعلاج HIV).

أدوية مضادة للفيروسات لعلاج التهاب الكبد C مثل بوسيفيريفر، تيلابريفير، إلباسفيرف أو جرازوبريفير (المستعمل لعلاج تلوث فيروس التهاب الكبد (C)). نيفازولون (المستعمل لعلاج الإكتئاب).

أدوية تحتوي على كوبيسيستات.

أمبوديون (المستعمل لعلاج عدم انتظام نظم القلب).

فيراباميل، نيفينديافير أو أمبوديين (المستعملة لعلاج فرط ضغط الدم في المصدر المنسوب لمرض قلبي أو في حالات قلبية أخرى).

لوميتايد (دواء المستعمل لعلاج حالات خطيرة ونادرة من الكوليسترول الوراثي).

دايومييسين (المستعمل لعلاج تلوثات معقدة في الجلد وفي أنسجة الجلد والعلاج بجرثومة الدم). من الجائز أن تكون الأعراض الجانبية التي تؤثر على العضلات أشد مع تناول هذا الدواء خلال العلاج بـ سيمفاكور. من شأن الطبيب أن يقر بأن عليك التوقف بشكل مؤقت عن تناول سيمفاكور.

كوليشرين (المستعمل للتحرقس).

بالإضافة للأدوية الفعالة أعلاه، إحد الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية. خاصة إحد الطبيب إذا كنت تتناول دواء واحداً من الأدوية التالية:

- أدوية تحتوي على مادة فعالة مضادة لتخثر الدم مثل وارفارين، فينبروكومون أو أسينوكومبول (مضادات للتخثر).
- نياسين (المستعمل أيضاً لخفض الكوليسترول).
- فينوفيربات (المستعمل أيضاً لخفض الكوليسترول).
- ريفاميسين (المستعمل لعلاج السل).

أخبر كل طبيب يصف لك دواء جديداً بأنك تتناول سيمفاكور.

#### استعمال الدواء والطعام

يحتوي عصير الجريب فروت على واحد أو أكثر من المركبات التي تؤثر على طريقة تفكك الجسم لأدوية معينة، بما في ذلك سيمفاكور. يجب الإمتناع عن إستعمال عصير الجريب فروت.

#### الحمل والإرضاع

لا تستعظمي سيمفاكور إذا كنت حاملاً، تحاولين الحمل أو تعتقدين بأنك حامل. إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بـ سيمفاكور، فتوقفي عن تناوله واتصلي بطبيبك فوراً.

لا يجوز تناول سيمفاكور إذا كنت مرضعة، لأنه لا يعرف فيما إذا كان الدواء ينتقل إلى حليب الأم.

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

#### السياقة وإستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثر سيمفاكور على قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكينات. مع ذلك، يجب الأخذ بالحسبان بأن بعض الأشخاص قد يشعرون بدوار بعد تناول سيمفاكور.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي سيمفاكولور على سكر يسمى لكتوز. إن قيل لك من قبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل السكريات معينة ف عليك إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

### 3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستضخ دائماً وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إن لم تكن وأنت بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستضخ. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

المقدار الدوائي الإبتدائي الموصى به هو **10 أو 20 ملغ** مرة في اليوم، في المساء، مع أو بدون طعام. يجب بلع الدواء مع القليل من الماء.

سبب أن تزداد خطورة حدوث مشاكل في العضلات، فإن مقدراً دوائياً ذو **ملغ 80** هو فقط لمتعالمين يتناولون مقدراً دوائياً ذو **80 ملغ** بشكل مزم (مثلاً 12 شهراً وما فوق) ولم يطوروا العضلات والذين هم ليسوا بحاجة لتناول دوية معينة أخرى

سوية مع سيمفاكولور، التي قد تزيد من الإحتمال لديهم لتطور ضرر في العضل. الجائز أن يصف لك طبيب مقادير دوائية أخفض، خاصة إذا كنت تتناول دوية معينة، من قبل الظاهر (أي، إذا كنت تعاني من حالات معينة في الكلى).

إن كنت تتناول أيضاً دوية رابطة للأحماض الصفراوية (دوية لخفض الكوليسترول) مثل كولستيرامين، ف عليك تناول سيمفاكولور على الأقل ساعتين قبل أو أربع ساعات بعد تناول دوية رابطة للأحماض الصفراوية.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

### الفحوص والمتابعة:

- خلال فترة العلاج ب سيمفاكولور، يجب إجراء فحوص لوظائف الكبد.
- خلال فترة علاج بهذا الدواء، يجري لك طبيب متابعة خفيفة إذا وجد لديك سكري أو إذا كانت مرضاً خطورة إن يتطور لدى مرض السكري، من الجائز أن تكون مرضاً خطورة إن يتطور لدى مرض السكري وذلك إذا وجدت أنك لست نسب مرتفعة من السكريات والشحوم في دمك، لديك وزن زائد وضغط دم مرتفع.

توجه إلى طبيب بشكل دائم لفحص نسبة الكوليسترول لديك ولتأكد فيما إذا وجدت لديك أعراض جانبية. يتوجب عليك طبيب إجراء فحوص دم لفحص كبدك قبل أن تبدأ بتناول سيمفاكولور والمستشفى في ما إذا وجدت أية أعراض للمشكل في الكبد خلال فترة تناول سيمفاكولور.

### السحق/الشرط/المضغ:

سيمفاكولور 40 - لا يجوز شرط القرص. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

سيمفاكولور 20، سيمفاكولور 80 - عند الحاجة يتم سحق القرص للإستعمال الفوري. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

إذا تناولت أكثر مما أنت بحاجة من سيمفاكولور

إذا تناولت مقدراً دوائياً مغزطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول سيمفاكولور

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المطلوب، فلا يجوز تناول مقدراً دوائياً مضغاً/شرطاً تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد التالي. إستشر الطبيب. عليك المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة طبيبك، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول سيمفاكولور

واصل تناول سيمفاكولور إذا إلا أوصاك طبيبك بالتوقف. إذا توقفت عن تناول سيمفاكولور، فإن الكوليسترول لديك قد يرتفع ثانية.

لا يجوز تناول دوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع الإشارات الطبية إذا لزم الأمر. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4 الأعراض الجانبية

كما بكل حالة، فإن إستعمال سيمفاكولور قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهم من قاءة الأعراض الجانبية من الجائز أن تعاني أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة نادرة (rare) - أعراض التي تظهر لدى 10 حتى 100 مستعملين من بين 10,000:

**يجب التوقف عن إستعمال الجائز والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية:**

• ألم في العضلات، حساسية العضلات، تقلصات أو ضعف في العضلات، تمزق في العضل (نادر جداً)، ذلك لأنه في أحيان نادرة، من شأن هذه المشاكل أن تكون خطيرة، بما في ذلك تمزق العضلات الذي يؤدي إلى تمزق الكلى لا بل في حالات نادرة إلى الوفاة.

• ردود فعل لفرط الحساسية (الربو) تشمل: إنتفاخ الوجه، اللسان والحنجرة - الألم الذي قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس (وذمة وعائية) - ألم عضلية شديداً، غثاً في الكتفين أو الفخذين (ألم عضلية روماتيزمية).

• طلع يتراقف بضعف الأطراف وعضلات الرقبة.

• طلع الذي قد يظهر في الجلد وترقحات في الفم (lichenoid drug eruptions) (نادر جداً)

• الأم أو التهاب في المفاصل.

• التهاب في الأوعية الدموية (vasculitis)

• كدمات غير اعتيادية، طفح، قروح وإنتفاخ جلدي (dermatomyositis)، شرى، حساسية جلدية الضوء الشمس، سخونة، تورم.

• ضيق في التنفس (dyspnea) وشعور عام غير جيد.

• حالة تشبه الذئبة (بما في ذلك طفح، مشاكل في المفاصل وتأثير على خلايا الدم)، التهاب الكبد أو التهاب في يترافق بالأعراض التالية: أصفرار الجلد والعينين، كحة، بول بلون كالك أو براز بلون فاتح، الشعور بإرهاق أو ضعف، فقدان الشهية للعالم، قصور صميت وغير صميت في الكبد (نادر جداً).

• التهاب البنكرياس (pancreatitis)، التي يترافق عادة بآلام خطيرة في البطن.

أعراض جانبية خطيرة نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

• رد فعل تحسسي خطير الذي يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو إلى الوفاة (anaphylaxis).

• التشنج لدى الذكور (تضخم الصدر لدى الرجال).

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

• اضطرابات في الجهاز الهضمي (آلم في البطن، إسهال، إنتفاخ، عسر هضم، إسهال، غثيان، تقيؤ).

• تضيق الرقبة، حثل في الرقبة.

• صداع، دوخ الشعور بوخز.

• خدر أو ضعف في الذراعين وفي الرجلين (تملأ، إنتعال عصبي محيطي).

• ضعف في الذاكرة (نادر جداً)، فقدان الذاكرة، إرتباك.

• مشاكل في النوم (نادر جداً).

• طفح، كحة، سناطش الضرع (صلم).

• تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

• ضعف.

أعراض جانبية شيعوها غير معروف (أعراض شيعوها لم يحدد بعد):

• ضعف عضلي دائم.

• مشاكل في الأوتار، التي قد تصبح أحياناً معقدة لدرجة تمزق الوتر.

• مشاكل في إنتصاب العضو الذكري.

• إكتئاب.

أعراض جانبية محتملة خلال إستعمال الستياتينات:

• اضطرابات في النوم بما في ذلك كوابيس ليالية.

• صعوبات في الأداء الوظيفي الجنسي.

• مشاكل في التنفس التي تشمل سعال دائم، وأ/أو ضيق في التنفس أو سخونة. سكري. حدوث هذا الأمر محتمل أكثر إذا وجدت لك نسب مرتفعة من الدم. الشحوم في الدم، وزن زائد وارتفاع في ضغط الدم. ستياتيك طبيبك خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

### قيم نتائج محرية:

لوحتنا ارتفاعات في فحوص دم معينة لفحص وظائف الكبد وإزيم العضل (كرياتينين كيناز).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التعليق عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov) الذي يوجهك إلى النموذج المباهر للتبليغ عن أعراض جانبية.

بالإضافة لذلك، بإمكان تبليغ شركتنا بـ "يونيفارم مض".

5 كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمس! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان جاف بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

• لا تسبب التفتيح بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال سيمفاكولور بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. شروط التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من دوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

### 6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للعامة الفعالة أيضاً على:

Lactose, Pregelatinized Starch, Microcrystalline Cellulose, Modified Sodium Carboxymethylcellulose, Ascorbic Acid, Citric Acid, Magnesium Stearate, Butylated Hydroxyanisole, Opadry Coatings.

• يحتوي كل قرص مطلي من سيمفاكولور 20 على: 138 ملغ لكتوز.

• يحتوي كل قرص مطلي من سيمفاكولور 40 على: 276 ملغ لكتوز.

• يحتوي كل قرص مطلي من سيمفاكولور 80 على: 552 ملغ لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة:

سيمفاكولور معيا بلويحات (بليست) ضمن علبة كرتون. بكل علبة هناك 5، 7، 10، 20، 30، 40، 100 قرصاً، من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

سيمفاكولور 20: أقراص مطلية، مستديرة، ممدبة من كلا الجانبين، ذات لون برتقالي مع خط للسطر من جانب واحد.

سيمفاكولور 40: أقراص مطلية، بيضوية، ذات لون برتقالي مع خط للسطر من جانب واحد.

سيمفاكولور 80: أقراص مطلية، بيضوية، ذات لون برتقالي مع خط للسطر من جانب واحد.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم م.ض، ص.ب. 21429 - تل - أبيب، 6121301

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض، باراك الصناعة "مافو كورمل" رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سيمفاكولور 20: 121 2630128 01

سيمفاكولور 40: 121 95 30222 01

سيمفاكولور 80: 121 96 30223 01

من أجل سهولة تهنوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعداده في أيار 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.