



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

فارييلريكس

مسحوق ومذيب لتحضير محلول للحقن

كل مقدار دوائي (0.5 مل) يحتوي على:

Live attenuated varicella virus $\geq 10^{3.3}$ PFU (فيروس حي مضاعف لجدرى الماء)

للقائمة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر انظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لماح نشط ضد جدرى الماء في الفئات السكانية التالية، عندما لا توجد سابقة للإصابة بجدرى الماء:

- أشخاص أصحاء، ابتداء من عمر 12 شهراً.

- مرضى معرضون لخطورة عالية للإصابة بجدرى الماء الشديد، مثل مرضى إبيضاض الدم الحاد أو بحالة

مزمنة، مرضى يتلقون علاجاً مثبطاً لجهاز المناعة أو مرضى يفكرون إجراء عملية زرع عضو.

- أشخاص أصحاء يسكنون بمتاس وثيق مع مرضى جدرى الماء ومرضى بخطورة عالية.

الفصيلة العلاجية: لقاحات فيروسية، لقاحات جدرى الماء النطاقي

كيف يعمل اللماح؟

عندما يتلقى الشخص لماح فارييلريكس، فإن جهاز المناعة (جهاز الدفاع الطبيعي للجسم) ينتج أضداداً لحماته من الإصابة بعديو فيروس جدرى الماء (Varicella).

يحتوي فارييلريكس على فيروس مضاعف من غير المرجح جداً أن يسبب جدرى الماء لدى الأشخاص الأصحاء. كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى، قد لا يوفر فارييلريكس الحماية الكاملة لكل من تلقى اللماح.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال فارييلريكس إذا:

• كنت أنت أو طفلك حساسين (لديكما ألليرجيا) للمادة الفعالة، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها اللماح (مفصلة في الفقرة 6). يمكن أن تشمل علامات رد الفعل التحسسي ما يلي: طفح جلدي حاك، ضيق في التنفس وإنفاس في الوجه أو اللسان.

• وجد لديك أو لدى طفلك أي مرض (مثل إصطرابات في الدم، سرطان، تلوث بفيروس فشل المناعة البشري HIV أو الإيدز) أو أنكما تتداولاً دواء أيًا كان (بما في ذلك مقدار دوائي مرتفع من كورتيكosteroidات) التي تضعف جهاز المناعة. إذا كنت أنت أو طفلك ستتلقيان اللماح فإن القرار يتعلق بمستوى الدفاع لجهاز المناعة لديكما. انظر الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء".

• وجدت لديك أو لدى طفلك حساسية معروفة لنيوميسين (نوع من المضادات الحيوية). التهاب معروف للجلد التماسي (contact dermatitis) (طفح جلدي عند تماس الجلد بشكل مباشر مع مولادات الحساسية مثل نيوميسين) لا ينبغي أن يكون سبباً لعدم تلقي لماح، لكن تحدث مع طبيبك أولاً.

- كان لديك أو لدى طفلك رد فعل تحسسي سابق لأي لقاح سابق ضد جردي الماء.
- كنت حاملاً. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الحمل لمدة شهر بعد تلقي اللقاح.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل أن تتلقى أنت أو طفلك لقاح فاريليريكس، إحك للطبيب إذا:

- وجد لديك أو لدى طفلك تلوث شديد يترافق بسخونة مرتفعة. من الجائز أن تكون هنالك حاجة لتأجيل تلقي اللقاح إلى ما بعد الشفاء. لا ينبغي لتلوث طفيف مثل الزكام أن يؤجل تلقي اللقاح، لكن تحدث مع طبيبك أولًا.
- كان جهاز المناعة لديك أو لدى طفالك ضعيفاً بسبب مرض (مثل تلوث بفيروس فشل المناعة البشري - HIV) وأو علاجات. يجب مرافقتك أنت أو طفالك عن كثب لأنه من الجائز ألا تكون الإستجابة للقاح كافية لضمان الحماية من المرض (أنظر الفقرة 2 " لا يجوز إستعمال فاريليريكس إذا").
- لديك مشاكل نزف أو أنك تصاب بكمات بسهولة.

قد يحدث الإغماء (خاصة لدى المراهقين) بعد، وحتى قبل، كل حقنة مع إبرة. لذلك، أبلغ الطبيب أو الممرضة إذا تعرضت أنت أو طفالك للإغماء عند تلقي حقنة سابقة.

كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى، قد لا يوفر فاريليريكس لك أو لطفالك الحماية الكاملة ضد الإصابة بعدوى جردي الماء. مع ذلك، الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وأصيبوا بعدوى جردي الماء، على الأغلب يكون لديهم مرض خفيف جداً مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحاً.

في حالات نادرة، يمكن أن ينتقل الفيروس المضعف من شخص تلقى اللقاح للآخرين. يحدث ذلك على الأغلب عندما يكون لدى الشخص الذي تلقى اللقاح بقع أو حويصلات. الأشخاص الأصحاء الذين أصيبوا بالعدوى بهذه الطريقة غالباً ما تطور لديهم طفح طفيف، غير ضار.

بعد تلقي اللقاح ولمدة 6 أسابيع بعد ذلك، يجب إذا أمكن، أن تحاول أنت أو طفالك تجنب التماس القريب مع مما يلي:

- الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
- النساء الحوامل اللواتي لم يصببن بجردي الماء أو لم يتلقين لقاحاً ضد جردي الماء.
- رضع حديثي الولادة لأمهات لم يصببن بجردي الماء أو لم يتلقين لقاحاً ضد جردي الماء.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت أنت أو طفالك تتناولان، أو إذا تناولتما مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

أخير الطبيب إذا كان من المفترض أن تخضع أنت أو طفالك لفحص جلدي لوجود محتمل للسل. إذا تم إجراء هذا الفحص خلال 6 أسابيع بعد تلقي فاريليريكس، فمن الجائز ألا تكون النتيجة موثوقة.

يجب تأجيل التطعيم لمدة 3 أشهر على الأقل إذا قمت أنت أو طفالك بتلقي تسريب دم أو أضداد بشرية (الغلوبيولين المناعي).

يجب تجنب إستعمال الأسيپيرين أو الساليسيلات الأخرى (مادة موجودة في بعض الأدوية المستعملة لخفض السخونة وتسكين الآلام) لمدة 6 أسابيع بعد تلقي لقاح فاريليريكس لأن هذا قد يسبب مرضًا خطيراً يسمى متلازمة راي والتي يمكن أن تؤثر على جميع أعضاء الجسم.

يمكن إعطاء فاريليريكس في نفس الوقت مع لقاحات أخرى. يجب إستعمال موقع حقن آخر لكل لقاح.

الحمل والإرضاع

لا يجوز إعطاء فاريليريكس للنساء الحوامل.

إذا كنت حاملاً أو مريضاً، تعتقدين أنه من الجائز أن تكوني حاملاً أو إذا كنت تخططين للحمل، فاستشري الطبيب أو الصيدلي قبل تلقي لقاح بهذا الدواء.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم لا تحملي في غضون شهر واحد بعد تلقي اللقاح. خلال هذا الوقت يجب عليك إستعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل.

أخبري الطبيب إذا كنت مريضة أو تتوبين الإرضاخ. سيقرر الطبيب ما إذا كان يجب أن تلتقي فاريليركس.

السيادة وإستعمال الماكنات

لفاريليركس لا يوجد تأثير أو تأثيره ضئيل على قدرتك على السيادة وإستعمال الماكنات. مع ذلك، فإن بعض الأعراض الجانبية المذكورة في الفقرة 4 "الأعراض الجانبية" من شأنها أن تؤثر بشكل مؤقت على القدرة على السيادة أو إستعمال الماكنات.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يعطى فاريليركس بالحقن تحت الجلد في الجزء العلوي من الذراع أو في الجزء الخارجي من الفخذ.

المقدار الدوائي الاعتيادي عادة هو:

لدى الأشخاص الأصحاء

الأطفال من عمر 12 شهراً حتى 12 سنة:

مقدارين دوائين من فاريليركس. يفضل إعطاء المقدار الدوائي الثاني على الأقل 6 أسابيع، ولكن بأي حال من الأحوال ليس أقل من 4 أسابيع، بعد المقدار الدوائي الأول.

المرأهقون من عمر 13 سنة فما فوق والكبار:

مقدارين دوائين من فاريليركس. يجب الحفاظ على فاصل زمني لا يقل عن 6 أسابيع، ولكن بأي حال من الأحوال ليس أقل من 4 أسابيع، بين المقدارين الدوائين.

لدى المرضى المعرضين لخطرة عالية

نظام المقدار الدوائي الموصوف للأفراد الأصحاء ينطبق أيضاً على المرضى المعرضين لخطرة عالية، ولكن قد تكون هناك حاجة لمقادير دوائية إضافية.

التبادل

يمكن إعطاء مقدار دوائي واحد من فاريليركس للأشخاص الذين سبق لهم تلقي مقدار دوائي من لقاح آخر يحتوي على جرسي الماء.

يمكن إعطاء مقدار دوائي واحد من لقاح آخر يحتوي على جرسي الماء للأشخاص الذين تلقوا بالفعل مقداراً دوائياً واحداً من فاريليركس.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تلقيت بالخطأ أنت أو طفلك مقداراً دوائياً أكبر مما ينبغي

من غير المرجح جداً أن تلتقي مقداراً دوائياً مفرطاً لأن اللقاح يتم توفيره ضمن قنبلة صغيرة ذات مقدار دوائي واحد ويعطى من قبل طبيب أو ممرضة. تم التبليغ عن حالات قليلة لحدوث إعطاء عن طريق الخطأ فقط في بعضها بلغ عن حدوث النعاس ونوبات (اختلالات) شاذة.

إذا فوّت أنت أو طفلك مقداراً دوائياً

توجه إلى الطبيب ليقرر فيما إذا كانت هناك حاجة لمقدار دوائي ومتى يتم إعطاؤه.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فاريليركس قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

قد تحدث الأعراض الجانبية التالية مع هذا اللقاح:

أعراض جانبية شائعة جداً

قد تظهر هذه لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص:

- ألم وإحمرار في منطقة الحقن

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:

- طفح جلدي (بقع و/أو حويصلات)
- إنفاس في موقع الحقن *
- سخونة تساوي أو تزيد عن 38 درجة مئوية (عن طريق المستقيم) *

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص:

- تلوث الطريق التنفسية العلوية

• ألم الحنجرة وعدم راحة عند البلع (التهاب البلعوم)

• إنفاس الغدد الليمفاوية

• سخط

• صداع

• الشعور بالنعاس

• سعال

• حكة بالأنف، سيلان أو إنسداد الأنف، عطاس (التهاب الأنف)

• غثيان

• تقيؤ

• طفح يشبه مرض جدري الماء

• حكة

• ألم المفاصل

• ألم عضلي

• سخونة أعلى من 39.5 درجة مئوية (عن طريق المستقيم) *

• قلة حيوية (إرهاق)

• شعور عام غير جيد

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص:

- التهاب العين (التهاب الملتحمة)
- ألم في البطن
- إسهال
- طفح حاك مع درنات (hives)

* قد يحدث إنفاخ في موضع الحقن وسخونة بوتيرة مرتفعة جداً لدى المراهقين والكبار. قد يحدث أيضاً إنفاخاً بوتيرة مرتفعة جداً لدى الأطفال دون عمر 13 سنة، بعد تناول المقدار الدوائي الثاني.

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية في عدة حالات أثناء الإستعمال الروتيني لـ فاريليركس:

- القوباء المنطقية (الهربس النطقي).
- نزف صغير على شكل بقع وإصابة بجرح بصورة أسهل من المعتاد نتيجة إنخفاض في نوع خلايا الدم تسمى الصفائح الدموية.
- ردود فعل تحسسية. طفح قد يكون حاكاً أو مع حويصلات، إنفاخ في العينين والوجه، صعوبة في التنفس أو البلع، هبوط مفاجئ في ضغط الدم وقدان الوعي. قد تحدث مثل ردود الفعل هذه قبل مغادرة عيادة الطبيب. ومع ذلك، إذا قاسيت أنت أو طفلك أي من هذه الأعراض عليك التوجة إلى الطبيب حالاً.
- تلوث أو التهاب في الدماغ، في الجبل الشوكي والأعصاب المحيطية الذي يؤدي إلى صعوبة مؤقتة عند المشي (عدم الثبات) و/أو فقدان مؤقت في السيطرة بحركات الجسم، سكتة (تضرر الدماغ بسبب إضطراب في تزويد الدم له).
- نوبات أو اختلالات.
- التهاب، تضيق أو إنسداد الأوعية الدموية. قد يشمل ذلك نزف أو كدمات غير عادية تحت الجلد (فرفرية هينوخ شونلاين) أو سخونة تستمر لأكثر من خمسة أيام، المرتبطة بطفح جلدي على الجزء (trunk) الذي في بعض الأحيان يرافقه تقشر للجلد في اليدين والأصابع، إحمرار العينين، الشفتين، الحنجرة واللسان (مرض كاواساكي).
- حمامي متعددة الأشكال (الأعراض عبارة عن نقاط حمراء حاكية في أحياناً قريبة، يشبه طفح الحصبة الذي يبدأ في الأطراف وأحياناً في الوجه وبقى الجسم).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبلغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبلغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «[تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي](#)» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتقادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقier بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب التخزين في البراد (ما بين 2-8 درجة مئوية).
- بعد التحضير، يجب حقن اللقاح في أسرع وقت ممكن.

مع ذلك، فقد ثبت أنه يمكن تخزين اللقاح المحضر لمدة تصل حتى 90 دقيقة في درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية) وحتى 8 ساعات في البراد (ما بين 2-8 درجة مئوية). إذا لم يتم إستعمال اللقاح المحضر في إطار هذه الأوقات، فيجب رميه.

(6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

المسحوق: Anhydrous lactose, mannitol, amino acids for injection, sorbitol
أثار من: Neomycin sulphate

المذيب: Water for injection

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

المسحوق: مسحوق بلون الكريم، مائل للأصفر أو مائل للوردي، ضمن قنينة صغيرة زجاجية.

المذيب: سائل رائق عديم اللون، خالٍ من جزيئات مرئية للعين، ضمن محقنة جاهزة للإستعمال أو في أمبولة.

بعد التحضير بواسطة المذيب: محلول رائق، بلون الخوخ حتى اللون الوردي.

أحجام العلبة:

1 و-10 مقادير دوائية. من الجائز أن تحتوي العلبة أيضاً على إبر.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلبة.

- صاحب الإمتياز: چلاكسوسميثكلاين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكتا.
- المنتج: چلاكسوسميثكلاين بيلوجيكالس S.A، ريكسيسارت، بلجيكا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 115-15-29677
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في تشرين الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.

© 2021 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Varilrix PT V1.0B