

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

**فليت إينيمًا 133**

حقنة شرجية أحادية الاستعمال، مزيّنة بجهازه للاستعمال، كل 100 ملل تحتوي على: فوسفات الصوديوم أحادي القاعدة أحادي الإماهة 16 غرام (Monobasic sodium phosphate monohydrate) فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة مثنائي الإماهة 16 غرام (Dibasic sodium phosphate heptahydrate) المواد غير الفعالة ومسيبات أحاسية في الدواء - انظر بند 2 (معلومات إضافية) و البند 2 "معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء".

كان ليك نيزف من فتحة الشرج غير شخص  
كان ليك خلل ملحوظ في وظيفة الكلى  
كان ليك قصور القلب (لا يستطيع قلبك ضخ الدم بشكل كافٍ أعضاء الجسم المختلفة)  
كنت قد عانيت مرارًا من جفاف نفث أو غثت أو الشعور بالضعف  
كان ليك إيلاب في البطن  
كانك المتعالج تحت حقن 12 ساعة  
كنت تلتقي مستحضرات أخرى تحتوي على فوسفات الصوديوم بما في ذلك محلول علاقه عن طريق الفم أو الأراص

**فليت إينيمًا 133، أخير الطبيب**

تحتوي آثار خاصة مثبطة للمناعة الدواء كمنت صعبًا أو مسأً قد تحتاج إلى مساعدة من علاج أو الدواء الطاقم الطبي بجهة استعمال  
**فليت إينيمًا 133**  
كان ليك شكاوى في متوالب  
كانت ليك مشاكل في نقل الدم أو الكلى  
كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم (فقر سوائل في تجويف البطن)  
كانت تعاني من فرحت في فتحة الشرج أو شقوق شرجية (زخات في جلد فتحة الشرج)  
خضعت لإجراحة في الأمعاء الغليظة (Colostomy)  
كنت تعاني من اضطرابات في الكبد  
تغيرت في مستويات الأملاح في الدم  
من مستوى منخفض من الكالسيوم من منخفض من اليوسيوم من مستوى مرتفع من الفوسفات أو اليوسيوم من مستوى مرتفع من اليوسيوم حتى إذا كانت الحالات المتضمنة أعلاه تطبق عليك في الماضي  
تحتاج إلى متابعة عنده أثناء العلاج بالدواء  
إن الاستعمال المطول يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد على الدواء  
التفاعلات بين الأملاح  
إذا كنت تأخذ: إن أخذت في الأوتية الأخرى أو إن كان من الممكن أن تأخذ دواءً آخر بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية أخرى الطبيب الصيدلي بذلك. على وجه الخصوص إذا كنت تأخذ:  
أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم مثل مضطبات الإزيمية المحلول للأجوسيتين (ACE) (مثل أتانوليل، رامبيريل، نيتروبيرونيل) ومضطبات مستقبلات الأوجوسيتين (مثل متولان، حاصرات الأستازان، إيريوساتان، إيريوساتان، أوميكسان، تيلمسارتان، كلانسارتان) إن أخذت أدوية لعلاج النجحة الصدرية (حاصرات قنوات الكالسيوم).  
أدوية لإفراغ المثانة (مدرات البول).

**طريقة الاستعمال:**  
يجب فحص القنبلة قبل استعمالها بعشرة إلى الارب. يجب الانتقاه إلى الجانب الأيسر حيث تكون الركتين بالقرب من الصدر أو متبنتين قليلاً بحيث تكون الرجل اليمنى مشدودة لأعلى.  
يجب نزع غطاء القوة، إدخال طرف الحقنة الشرجية بلطف في فتحة الشرج وعصر القنبلة بلطف. إذا كنت تشعر بالمقاومة أثناء إدخال طرف الحقنة الشرجية أو أثناء إدخال المتوالب - يجب إيقاف العملية، لمنع إصابة فتحة الشرج - حتى يذوق الحاحة التبول وتتخفق عادة خلال دقائق حتى 5 دقائق. استمر الطبيب إذا لم يكن لديك نشاط معوي خلال 5 دقائق من استعمال الحقنة الشرجية.  
يجب البقاء بالقرب من المرحاض بعد استعمال الدواء القنبلة في أحادي الاستعمال، يجب التخلص من القنبلة بعد الاستعمال.  
يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا لاحظت وجود نزيف في فتحة الشرج بعد استعمال الدواء.

مضادات التهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين والإيبورفين، الجمل، الأرخام والخوصية  
إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تتعديين أنك قد تكوني حاملاً أو خطفطين للحمل، استسيري  
الآلات، يجب أن تبقى بالقرب من المرحاض،  
القيدة واستعمال الآلات  
في البرغم عن أن الدواء ليس له تأثير مباشر على قدرتك على القيادة أو استعمال الآلات، يجب أن تبقى بالقرب من المرحاض، بعد استعمالها هذا الدواء.

**معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء**  
يحتوي هذا الدواء على 144 ملغ من Sodium benzoate في القنبلة، أي ما يعادل 108 ملغ من Sodium benzoate في ال-100 مل.  
يمكن أن يسيب تهييج وضعي في الجلد.  
يحتوي هذا الدواء أيضاً على Sodium methyl parahydroxybenzoate Propyl parahydroxybenzoate والتي قد تسبب ردود فعل أرجية (ربما كدمات متفرقة).

**3. كيف تستعمل الدواء؟**  
يجب عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.  
الجرعة الاعيادية بشكل عام هي قنبلة واحدة من 133 مل من ال- 24 ساعة بالتتابعين والأطفال من جيل 12 سنة.

**4. الأعراض الخطيرة**  
يجب تجنب تناول الأدوية في الظلام، تحقق من المصنع والجرعة الواردة على كل زجاجة تحتوي فيها دواء. انتظرات طبية إذا كنت بحاجة لها.  
إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

**4. الأعراض الخطيرة**  
كما هو الحال مع أي دواء فإن استعمال فليت إينيمًا 133 يمكن أن يؤدي لأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد تلغعي من أي منها.  
هذا الاستعمال في فليت إينيمًا 133 قد يسبب بشكل نادر من الأعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد (10:1000).  
ف فرط الحساسية، ردود فعل أرجية (مع أو بدون طفح جلدي)  
قفق  
القياسات وتتشدت عضلية عقب تغرات في كميت

**طريقة الاستعمال:**  
يجب فحص القنبلة قبل استعمالها بعشرة إلى الارب. يجب الانتقاه إلى الجانب الأيسر حيث تكون الركتين بالقرب من الصدر أو متبنتين قليلاً بحيث تكون الرجل اليمنى مشدودة لأعلى.  
يجب نزع غطاء القوة، إدخال طرف الحقنة الشرجية بلطف في فتحة الشرج وعصر القنبلة بلطف. إذا كنت تشعر بالمقاومة أثناء إدخال طرف الحقنة الشرجية أو أثناء إدخال المتوالب - يجب إيقاف العملية، لمنع إصابة فتحة الشرج - حتى يذوق الحاحة التبول وتتخفق عادة خلال دقائق حتى 5 دقائق. استمر الطبيب إذا لم يكن لديك نشاط معوي خلال 5 دقائق من استعمال الحقنة الشرجية.  
يجب البقاء بالقرب من المرحاض بعد استعمال الدواء القنبلة في أحادي الاستعمال، يجب التخلص من القنبلة بعد الاستعمال.  
يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا لاحظت وجود نزيف في فتحة الشرج بعد استعمال الدواء.

مضادات التهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين والإيبورفين، الجمل، الأرخام والخوصية  
إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تتعديين أنك قد تكوني حاملاً أو خطفطين للحمل، استسيري  
الآلات، يجب أن تبقى بالقرب من المرحاض،  
القيدة واستعمال الآلات  
في البرغم عن أن الدواء ليس له تأثير مباشر على قدرتك على القيادة أو استعمال الآلات، يجب أن تبقى بالقرب من المرحاض، بعد استعمالها هذا الدواء.

**معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء**  
يحتوي هذا الدواء على 144 ملغ من Sodium benzoate في القنبلة، أي ما يعادل 108 ملغ من Sodium benzoate في ال-100 مل.  
يمكن أن يسيب تهييج وضعي في الجلد.  
يحتوي هذا الدواء أيضاً على Sodium methyl parahydroxybenzoate Propyl parahydroxybenzoate والتي قد تسبب ردود فعل أرجية (ربما كدمات متفرقة).

**3. كيف تستعمل الدواء؟**  
يجب عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.  
الجرعة الاعيادية بشكل عام هي قنبلة واحدة من 133 مل من ال- 24 ساعة بالتتابعين والأطفال من جيل 12 سنة.

**4. الأعراض الخطيرة**  
يجب تجنب تناول الأدوية في الظلام، تحقق من المصنع والجرعة الواردة على كل زجاجة تحتوي فيها دواء. انتظرات طبية إذا كنت بحاجة لها.  
إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

**4. الأعراض الخطيرة**  
كما هو الحال مع أي دواء فإن استعمال فليت إينيمًا 133 يمكن أن يؤدي لأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد تلغعي من أي منها.  
هذا الاستعمال في فليت إينيمًا 133 قد يسبب بشكل نادر من الأعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد (10:1000).  
ف فرط الحساسية، ردود فعل أرجية (مع أو بدون طفح جلدي)  
قفق  
القياسات وتتشدت عضلية عقب تغرات في كميت

**5. كيفية تخزين الدواء:**  
يجب تخزينه في مكان جاف بعيداً عن الضوء، في مكان بعيد عن متناول أي أطفال أو الرضع ومعدل رويته، ويجب منع التسمم. لا تسبب التهييج دون تعليمات صريحة من الطبيب.  
لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يظهر على العبوة بشرط تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر.  
شروط التخزين: خزن بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو التربة أو المهملات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعمل. ستساهم هذه الوسائل في حماية البيئة.

**6. معلومات إضافية:**  
إضافة إلى المركبات القنبلة يحتوي الدواء أيضاً على: Water purified, sodium benzoate, propyl methyl parahydroxybenzoate, sodium hydroxide  
كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة  
محتلف شكل (قد يحتوي على راسب أبيض)، تحتوي القنبلة على 133 مل من السائل.  
تم التفتيح في تشرين الأول 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.  
رقم قنبلة الدواء في سجل الأدوية الحكومي هي رقم الصيغة: 034-95-22406-1

**المنتج وصاحب التسجيل:**  
**كدسل م. ص.**  
شارع كديفا 3060000، إسرائيل

<https://sideeffects.health.gov.il>

**5. كيفية تخزين الدواء:**

لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو التربة أو المهملات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعمل. ستساهم هذه الوسائل في حماية البيئة.

**6. معلومات إضافية:**

إضافة إلى المركبات القنبلة يحتوي الدواء أيضاً على: Water purified, sodium benzoate, propyl methyl parahydroxybenzoate, sodium hydroxide

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة

محتلف شكل (قد يحتوي على راسب أبيض)، تحتوي القنبلة على 133 مل من السائل.

تم التفتيح في تشرين الأول 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم قنبلة الدواء في سجل الأدوية الحكومي هي رقم الصيغة: 034-95-22406-1

**المنتج وصاحب التسجيل:**

**كدسل م. ص.**

شارع كديفا 3060000، إسرائيل