

התרופה משווקת על ידי מרשם רופא

פליט אנמה 133

חוקן לשימוש חד-פעמי, משומן ומזון לשימוש

100 מ"ל מ"ל כמילים:

מנוביסיק סודיום פוספט מנוהידירט 16 גרם

(Monobasic sodium phosphate monohydrate)

דיבייסיק סודיום פוספט הפטהידירט 6 גרם

(Dibasic Sodium phosphate heptahydrate)

זומרים בלתי פעילים פולוגייים בתרופה – ראה

סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על

חלק התרופה מכריכים על התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש

בתרופה. עלון זה מיל מידע תמציתי על

התרופה או אל הרוקח.

עלך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3

"כיצד תשתמש בתרופה?". היוועץ ברוקח אם

אתה זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לניקוי המעי הגס לפני ניתוח,

לידה או בדיקות רפואיות.

קבוצה תרופתית: חוקניים.

פליט אנמה 133 פועל על ידי העלאת תכולת

המים בצואה בכך מסייע לניקוי המעי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהרכיבים הנספסים אשר מצילה התרופה (ראה סעיף 6).
- יש לך **מעי סדומה** (megacolon)
- יש לך היצרות או פתח חלקי של פי הטבעת
- יש לך חסימה במעי הגס התחתון (מחלת הישרשורג)
- יש שחש של יש חסימה במעי
- יש לך **חסימה בלחץ או חוסר תפקוד תקין בתנועת המעיים** (לפעמים קבוצ סימנים מעיים שיתוקית)
- נאמר לך על ידי הרופא שיתכן שיש לך:
 - **דלקת בתוספת:** (אפנדיציטיס)
 - **התקבצות/זקק או חסימה במעי**
 - **מחלת מעי דלקתית** פעילה (כגון מחלת קרוהן או קוליטיס טבעית)
- יש לך **דימום פי הטבעת** שאינו מאובחן
- יש לך **ליקוי משמעותי בתפקוד הכליות**
- יש לך **אין ספיקות לב** (הלב שלך לא יכול להזרים דם בריא דמום מספקת למוח העיניים בגוף)

- **לאחרונה סבלת מהתיבשות, מהקאה או בחילה או שחית צמא**
- יש לך **כאב בטן**
- **המטפל מתחת לגיל 12 שנים**
- **אתה מקבל תכשירים אחרים המכילים סודיום פוספט כולל תמיסה למתן דרך הפה או טבליות**

אזהרות וחידודות הנוגעות לתרופה בתרופה לפני הטיפול בפליט אנמה 133, ספר לרופא אם:

אתה חלש או קשיש. ייתכן שתצטרך עזרה של מטפל או שיש צוות רפואי על מנת להשתמש בפליט אנמה 133

יש לך לחץ דם או בכליות

אתה סובל ממימית (עודף נוזלים בחלל הבטן)

אתה סובל מכיבים בפי הטבעת או מפיסיות (קריעים בעור של פי הטבעת)

עברת ניתוח במעי הגס (Colostomy)

אתה סובל מפרעות באלקטרוליטים (שינויים ברמות המלחים בגוף כגון רמה נמוכה של סידן, רמה נמוכה של אשלגן, רמה גבוהה של פוספט או רמה גבוהה של נתרן)

היו ניכונים קרובים אם הם המצבים המפורטים לעיל

היו ניכונים לגבין בעבר. ייתכן שתצטרך להיות במעקב צמוד במהלך הטיפול בתרופה.

ישנא משומן עלול לגרום לתזון במשלים.

השימוש בתרופתית

אם אתה לוקח, אתה לוקח לאחרונה או אתה עשוי ללקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה כגון מעכבי האדינים המהפך אנגיטנסין (ACE) (דוגמה אלפוליל, רמפיל, ליטניפריל) וחוסמי הרצטרוב לאנגיטנסין (דוגמה לוסרטן, קאנדסרטן, אפסוסרטן, אירבסרטן, אולמרטסן, טלמיטרטן, ואלוסרטן) או תרופות לטיפול בתעוקת חזה (חוסמי תעלות סידן).
- תרופות לריקוי שלפוחית השתן (מתשנים).
- תרופות מסוימות לטיפול בהפרעות נפשיות (ליטיום).
- כל תרופה אחרת העשויה לגרום לתייבשות או לשנות את תמות המלחים (אשלגן, נתרן, פוספט ו

סידן) בגופך, הנקרא מאזן אלקטרוליטים. תרופות מסוימות הגונבות לניקוי המעי (מכליות סודיום פוספט). ראה גם בסעיף 7 "אין להשתמש בתרופה אם".

תרופות הליחות לשנות את קצב הלב שלך (להאריך את מקטע QT) כגון אמודארון, ארטן טריאוקסיד, אסטמיזול, ציטרימיצין, איריתרומיצין, קלאריתרמיצין, כלורפרמזין, ציטופריד, ציטאלופרם, דומפרמזון, טרפאדון, פרקואיאמיד.

גנדי דלקת שאינה סטרואידים (NSAIDs) כגון אספירין או איבופרופן.

היריון, הנקה ופריות

אם את בהריון או מימיה, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת להיכנס להריון, היוועץ ברופא או ברקני לפני השימוש בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכוונות

למרות שלתרופה אין השפעה ישירה על יכולתך לנהוג או להשתמש במכוונות, עליך להישאר בקרבת שירותים, לאחר השימוש בתרופה זו.

מידע חשוב על חלק המהמכיבים

תרופה זו מכילה 144 מ"ג של Sodium benzoate בבקבוק, שווה ערך ל-108 מ"ג 100- מ"ל. Sodium benzoate יכול לגרום לגירוי מקומי בעור.

תרופה זו מכילה גם Sodium methyl parahydroxybenzoate ו-Propyl parahydroxybenzoate אשר עלול לגרום לתגובות אלרגיות (ייתכן מאוחרות).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לדייק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא בקבוק אחד של 133 מ"ל מ"ל 24- שעות מבוגרים וילודים מגיל 12 שנים.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש רקטלי (לפי הטבעת) בלבד.

אין להשתמש ביותר מחוקן אחד במהלך 24 שעות ללא התייעות עם הרופא. היות ששימוש ביותר מחוקן אחד במהלך 24 שעות עלול להזיק.

אופן השימוש:

יש לנער את הבקבוק לפני השימוש לצורך פיזור המשקע.

יש לשכב על הצד השמאלי בכריכים צמודות לחזה או כפופות מעט כאשר הרגל הימנית משוכה כלפי מעלה.

יש להיסר את כיסוי הפיה, להכניס את פיית החוקן בעדינות לפי הטבעת ולסווח את הבקבוק בעדינות.

אם אתה חש בהתנגדות במהלך החדרת פיית החוקן או במהלך הכנסת המסה – יש להפסיק את הפעולה. בכדי למנוע פגיעה בפי הטבעת.

הצורך ביציאה וישג בדרך כלל תוך דקה עד 5 דקות. היוועץ ברופא אם לא הייתה לך פעילות מייגים בתוך 5 דקות מהשימוש בחוקן.

יש להישאר בקרבת שירותים לאחר השימוש בתרופה.

הבקבוק הוא לשימוש חד פעמי, יש להשליך את הבקבוק לאחר השימוש.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא אם לאחר השימוש בתרופה אתה מבחין בדימום בפי הטבעת.

יש להקטין על שתייה מרובה של נוזלים צלולים

לדוגמה: מים, מרקים צלולים, מיץ למצוץ, תה שחור, קפה שחור או מיץ פירות מזדמל ללא ציפה (אך לא בצבע אדום או סגול), למניעת התייבשות.

ככלל, עליך לשתות כמות של 250 מ"ל (כוס קטנה) כל שעה עד שהשפעת התרופה מתפוגג.

לאחר מכן, עליך לשתות נוזלים צלולים, עדיף מים, על מנת שתרווח את צימאונך, עד לאחר סיום ההליך הרפואי או על פי היות הרופא.

אם נטלת טבעות מינון גבוה יותר

אם השתמשת במנת יתר, או אם טבעות בלעת את התרופה או שבלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לרוקח.

הבא ארזת התרופה איתך.

אם השתמשת במנת יתר, אתה עלול לסבול מהתייבשות, צמא או בחילות שרירים.

אין לטול תרופות נוספות! בדיקת הניתוח והמנה ככל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

נמו בכל תרופה השימוש בפליט אנמה 133 עלול לגרום לתופעות לוואי חלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

השימוש בפליט אנמה 133 עלול לגרום באופן נדיר מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמשמש אחד מתוך 10,000).

רגישות יתר: תגובות אלרגיות (עם או ללא פריחה) התייבשות

התכווצות ועיוותות שרירים בעקבות שינויים במחזוריות

כאב בטון מהמלחים (אלקטרוליטים) בדם

נכבשות או נפיחות בבטן

כאב בממרת העיכול

• בחילה או הקאה

• גרד, צריבה, כאב או נמוח בפי הטבעת

• שלפוחית

• שלשול

• צמרמורת

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מתמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צינה בלעון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)

המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לנטון את התרופה?

לעמוד הרעלון התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או חיותק ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מרופא מרפא.

אין להשתמש בתרופה אחר תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

25°C. **מתי אסחון:** אסחון מתחת ל-

אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח או להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

Water purified, sodium benzoate, sodium methyl parahydroxybenzoate, sodium hydroxide

כימד רגיות התרופה ומה תזון האריזה

תמיסה שקיפה (ייתכן שתכלי משקע לבן).

הבקבוק מכיל 133 מ"ל נוזל.

נערך באוקטובר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלתי: 034-22406-11

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

יצרן ובעל רישום: דקסקס בע"מ

רח' דקסל 1, אור עקיבס 3060000, ישראל

כאב בממרת העיכול