

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פליט אנמה 250

חוקן לשימוש חד-פעמי, משומן | מוכן להתייג

ל 100 מ"ל מילים:

מונובסיק סודיום פוספט מונוהידראט 16 גרם (Monobasic sodium phosphate monohydrate) דיביסיק סודיום פוספט הפטהידראט 8 גרם (Dibasic Sodium phosphate heptahydrate) חומרים בלתי פעילים ואלרגיים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה".

חלק ממרכיביה של העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. לך עליך לעבור אותה אחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי יזומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לניקוי המעי הגס לפני ניתוח, לידה או בדיקות רפואיות. קבוצה תרופתית-חוקנית. **פליט אנמה 250** פועל על ידי העלאת תכולת המעי בצואה ובכך מסייע לניקוי המעי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לאחד מהמרכיבים המופיעים אשר מכילה התרופה (סעיף 6).
- יש לך מעג מורחב (megacolon)
- יש לך היצרות או פתח חלקי של פי הטבעת
- יש לך חסימה בעיני המעי (תחנות מחלת הירשפונג)
- יש חשד שיש לך חסימה בעיני
- יש לך חסימה בעיני או חומר תפקוד תקין בתנועת המעים (לפעמים נקרא חסימת מעיים שיתוק)
- נאמר לך על ידי הרופא שיש לך:
- **דלקת בנפוסתן** (אנדהמיטיס)
- **התקבולת/קנה או אפידמימה**
- **מחלת מעי דלקתית פעילה** (כגון מחלת קרוהן או קוליטיס כיבית)
- יש לך דימום מפי הטבעת שאינו מאובחן
- יש לך ליקוי משמעותי בתפקוד הכליות
- יש לך אי ספיקת לב (הלב שלך לא יכול להזרים דם בצורה מספקת לאיברים השונים בגוף)

- **לאחרונה סבלת מהתייג, מהקאה או בחילה או חשית צמא**
- **יש לך כאב בטן**
- **המטפל מתחת לגיל 12 שנים**
- **אתה מקבל תשכירים אחרים המכילים סודיום פוספט כחומר המסיס למתן דרך הפה או סגולות**

אזהרות מיוחדות המוענות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בפליט אנמה 250, ספר לרופא אם:

- אתה חלש או קשיש.
- ייתכן שתצטרך עזרה של מטפל או איש צוות רפואי על מנת להשתמש בפליט אנמה 250
- יש לך ריחח עד לא מאוזן
- יש לך בעיות בלב או בבלבול
- אתה שולח במוך (עודף נוזלים בחבל הטון)
- אתה עובר מצבים בפי הטבעת על מפיסחות (קרתע בטן של פי הטבעת)
- קבעת ניתוח בעיני המעי (Colostomy)
- אתה סובל מהפרעות באלקטרוליטים (שיניים ברמות מלחים בגוף כגון רמה נמוכה של סידן, רמה נמוכה של אשלגן, רמה גבוהה של פוספט או רמה גבוהה של נתרן)
- היועץ ברופא גם אם המצבים המפורטים לעיל היו נכונים בעבר. ייתכן שתצטרך להיות מיועצים צמוד במהלך הטיפול בתרופה.
- שימוש ממושך עלול לגרום לתלות במשלשלים.
- **תגובות בן התרופות**
- **אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה או אם אתה שולח לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:
 - תרופות לטיפול בלחץ דם כגון נובורטן מעכבי האמים המהפך אנגיוטנסין (ACE) (לדוגמה לאפילי, רמפיל, ליסיטריל) ותוסמי הרצפטור אנגיוטנסין (לדוגמה לוסרטן, קאדזרטן, אפוסרטן, אירבסרטן, אולמסרטן, טלמיסרטן, ואלרטן) או תרופות לטיפול בתחנות הדקה (חומסי תעלות סידן).
 - תרופות לריקון לפיחית השתן (משתנים)
 - תרופות מסימות לטיפול בהפרעות נפשיות (ליזיום).
- לכת את רמת המלחים (אשלגן, נתרן, פוספט וסידן) בגופך, הנקרא מאזן אלקטרוליטים.
- תרופות מסימות הניתנות לניקוי המעי (מכלול

סודיום פוספט). ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".
 • **תרופות העלולות לשמט את קצב הלב שלך (לדארכר, סאטקטל QT) כגון אמידארון, ארסן טרואקוטיד, אסטמיזין, אדיתוראפיין, אריתמיציין, קלאריתרמיציין, כלורפרומזין, ציאפרידי, ציטאלופרם, דומפרידון, פרופאנדון, פרקואינאמיד.**
 • **מגדי ליקות שאינם סטרואידים (NSAIDs) כגון אספירין או איבופרופן.**
היריון, הנקה ופוריות
 אם את בהריון או מיניקה, חשבת שאת ששייה ליות בהריון או מוכנת להינסג ליות, היועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.

היגיה ושימוש במכונות
 ברבות השימוש באמנה 250, ספר לרופא אם:

- אתה חלש או קשיש.
- ייתכן שתצטרך עזרה של מטפל או איש צוות רפואי על מנת להשתמש בפליט אנמה 250
- יש לך ריחח עד לא מאוזן
- יש לך בעיות בלב או בבלבול
- אתה שולח במוך (עודף נוזלים בחבל הטון)
- אתה עובר מצבים בפי הטבעת על מפיסחות (קרתע בטן של פי הטבעת)
- קבעת ניתוח בעיני המעי (Colostomy)
- אתה סובל מהפרעות באלקטרוליטים (שיניים ברמות מלחים בגוף כגון רמה נמוכה של סידן, רמה נמוכה של אשלגן, רמה גבוהה של פוספט או רמה גבוהה של נתרן)
- היועץ ברופא גם אם המצבים המפורטים לעיל היו נכונים בעבר. ייתכן שתצטרך להיות מיועצים צמוד במהלך הטיפול בתרופה.
- שימוש ממושך עלול לגרום לתלות במשלשלים.

ברבות השימוש באמנה 250, ספר לרופא אם:

- אתה חלש או קשיש.
- ייתכן שתצטרך עזרה של מטפל או איש צוות רפואי על מנת להשתמש בפליט אנמה 250
- יש לך ריחח עד לא מאוזן
- יש לך בעיות בלב או בבלבול
- אתה שולח במוך (עודף נוזלים בחבל הטון)
- אתה עובר מצבים בפי הטבעת על מפיסחות (קרתע בטן של פי הטבעת)
- קבעת ניתוח בעיני המעי (Colostomy)
- אתה סובל מהפרעות באלקטרוליטים (שיניים ברמות מלחים בגוף כגון רמה נמוכה של סידן, רמה נמוכה של אשלגן, רמה גבוהה של פוספט או רמה גבוהה של נתרן)
- היועץ ברופא גם אם המצבים המפורטים לעיל היו נכונים בעבר. ייתכן שתצטרך להיות מיועצים צמוד במהלך הטיפול בתרופה.
- שימוש ממושך עלול לגרום לתלות במשלשלים.

3. כיצד שתמש בתרופה?
 • יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם הינך בטוח במגע למינון או הטיפול בתרופה. המינון וסופו טיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא קבוק אחד של 250 מ"ל שעות 24-26 שעות למבוגרים ולילדים מגיל 12 שנים.

4. ליעבור על המנה המומלצת.
 לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש רוקטי (לפי הטבעת) בלבד.
 אין להשתמש ביותר מחוקן אחד במהלך 24 שעות מחוקן אחד. התייעצות עם הרופא. היות ששימוש ביותר מחוקן אחד במהלך 24 שעות עלול להזיק.

- אופן השימוש:**
- יש לנער את הקבוק לפני השימוש לצורך פיזור המשיק.
 - לזחה על הצד השמאלי ברכיים צמודות משוכה כלפי מעלה.
 - יש להסיר את כיסוי המעי, להכניס את פיית החוקן בעדינות לפי הטבעת ולסוחט את הקבוק בעדינות.
 - אם אתה חש בהתנגדות במהלך החדרת פיית

החוקן או במהלך הכנסת התמיסה – יש להפסיק את הפעולה, בכדי למנוע פגיעה בפי הטבעת. הצורך ביציאה יושג בדרך כלל תוך דקה עד 5 דקות. היועץ ברופא אם לא הייתה לך פעילות מעיים בתוך 5 דקות מהשימוש בחוקן. יש להישאר בקרבת שירותים לאחר השימוש בתרופה.

הקבוק הוא לשימוש חד פעמי, יש להשליך את הקבוק לאחר השימוש.
יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא אם לאחר השימוש בתרופה אתה מבחין בדימום בפי הטבעת.

יש להקפיד על שתייה מרובה של נוזלים צלולים לדוגמה: מים, מרקס צלולים, תה צמחים, תה שחור, קפה שחור או מיץ פירות מזליל ללא ציפה (אך לא בצבע אדום או סגול), למניעת התייבשות.

ככלל, עליו לשתות כמות של 250 מ"ל (כוס קטנה) כל שעה עד שהשפעת התרופה תתפוגג. לאחר מכן, עליו לשתות נוזלים צלולים, עדיף מים, על מנת שתרווח את צימומוך. עד לאחר סיום ההליך הרפואי או על פי הנחיות הרופא.

אם נוטלת בטעות מינון גבוה יותר
 אם השתמשת במנות יתר, או אם בטעות בלעת את התרופה או שבלעו ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לרוקח.
 הבא אריות התרופה איתך.
 אם השתמשת במנות יתר, אתה עלול לסבול מהתייבשות, צמא או נקושית שרידים.

אין ליטול תרופה בחושך או בתנאי חום
המנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משפיקים אם אתה לוקח להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי
 כמו בכל תרופה השימוש בפליט אנמה 250 עלול לגרום לתופעות לוואי, חלקן מהמשמשים. אל תיבהל למקרה רישומת תופעות לוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
 השימוש בפליט אנמה 250 עלול לגרום באופן נדיר מאוד (תופעות משפיעות בנפחות ממשמשת אחד מתוך 10,000):
 • **גירשות יתר:** תגובות אלריות (עם או בללא פריחה)
 • **התייבשות**
 • **התכווצות ועוויתות שרירים** (קבוצות שיניים מכונות מלחים (אלקטרוליטים) בדם)
 • **כאב באי נפחות בטון**
 • **כאב במערכת העיכול**
 • **בחילה או הקאה**

- גרד, צריבה, כאב או אי נוחות בפי הטבעת
- שלפוחית
- לשלול
- מיזמורות

אם הפגיעה תופעת לוואי, אם את מתפונות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי לתרופה הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "לדווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר שירות הבריאות (www.health.gov.il) המכסה מספר המוקדן לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <http://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?
 מנע הערעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום יבש מחוץ לתא חום וטווח ראייתם של ילדים ו/או חוקן ועל ידי כך תמנע הערעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ימים האחרון של אותו חודש.
מתי אחסון: תחת מתחת ל-25°C.
 אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח או השליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף
נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:
 Water purified, sodium benzoate, sodium methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, sodium hydroxide
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
 תמיסה שקופה (ייתכן שתכלי משיק (לבן), הקבוק מכיל 250 מ"ל נוזל.
 נערך באוקטובר 2021 בהתאם להנחיות ששר הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
 149-41-339-12-00
 לשם הפטנט וההקלה הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת ללבי שני המינים.
יצרן ובעל רישום: דקסל בע"מ
 רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל