

נוסח התחייבות לעלון לצרכן
עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

Clortetraciclina 20% UCL Veterinary
כלור-טטרהציקלין 20% יו.סי.אל וטרינרי

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה:
Clortetraciclina 20% UCL Veterinary

2. חומר פעיל
כל גרם אחד של אבקה להמסה במי שתייה מכילה 200mg **Chlortetracycline (as Hydrochloride)**
חומרים בלתי פעילים : ראה פירוט בסעיף 13 מידע נוסף.

3. למה מיועדת התרופה
אבקת כלור-טטרהציקלין מותווה לטיפול בזיהומים הרגישים לכלור-טטרהציקלין לתרנגולות פטם.
קבוצה תרפויטית: אנטיוביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים

4. התוויות נגד
השימוש בתכשיר זה אסורה בחיות בעלי עבר של תגובה אלרגית ל-טטרהציקלין. וליתר מרכיבי התרופה
אין להשתמש בחיות עם אי ספיקת כליות.
אין להשתמש אם הוכחה עמידות לטטרציקלין בחווה.

5. תופעות לוואי:
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור " דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי"
שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(<https://sideeffects.health.gov.il>) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

6. חיות מטרה
תרנגולות פטם

7. אופן המתן ומינון
לתרנגולות פטם – מיהול האבקה במי שתייה, 0.125-0.250 גרם מוצר לכל ק"ג, למשך 3-5 ימים.

8. אופן השימוש בתכשיר
למתן בפה במי שתייה, מערבבים היטב במי שתייה

9. זמן המתנה
בשר -- לפני שחיטה - 3 ימים

10. אזהרות

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיית המטרה
ספיגת התרופה על ידי בעלי חיים עלולה להשתנות בגלל מחלה. במקרה של ספיגת מזון לא מספקת, יש לטפל בבעלי חיים באופן פרנטרלי במקום זאת באמצעות מוצר מתאים להזרקה שנקבע על ידי הווטרינר. יש להימנע משימוש חוזר וממושך על ידי שיפור נוהלי ניהול על ידי ניקוי וחיטוי

אמצעי זהירות מיוחדים לשימוש בבעלי חיים
יש לשקול מדיניות רשמית, לאומית ואזורית של אנטי-מיקרוביאליות בעת השימוש במוצר. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לשיפור תנאי ושיטות הגידול, כדי למנוע כל מצבי מתח. באם ידועה לך על רגישות יתר לחומר יש להימנע מטפול בחומר זה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
בעת הטיפול במוצר יש להשתמש בצידוד מגן מיוחד המורכב מביגוד מגן, כפפות ומסכה, אין לשאוף, להימנע ממגע עם העור והעיניים והריריות.
אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול, לשטוף ידיים לאחר השימוש.
אל תבלע; במקרה של בליעה בשוגג, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את העלון או את התווית לרופא.
במקרה של זיהום מקרי בעור או בעיניים, יש לשטוף היטב עם הרבה מים.
אנשים עם רגישות יתר ידועה לאמוקסילין צריכים להימנע ממגע עם התרופה

הריון והנקה של בעל החיים המטופל
הכלורטטריקלין חודר בקלות את השליה ונמצא בדם, ומגיע לתוך הקרומים והרקמות של העובר, רצוי להגביל את השימוש ההכרחי במהלך ההריון. לשימוש רק בהתאם להערכת התועלת-סיכון על ידי הווטרינר האחראי

תגובות עם תרופות אחרות וסוגים אחרים של אינטראקציות
ספיגת האנטיביוטיקה מופחתת, כאשר המוצר ניתן דרך הפה ביחד עם מוצרים העשירים בסידן או במגנזיום.

מינון יתר
אין לעבור על המנה המומלצת

11. הוראות אחסון:

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

- יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C במקום מוגן מאור
- חיי מדף אחרי פתיחה ראשונה של השק – 30 יום
- חיי המדף לאחר המסת האבקה – 12 שעות

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר ווטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר ווטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם חומרים בלתי פעילים:

Dextrose monohydrate

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה – אבקה צהבהבה

אבקת כלור-טטרהציקלין 20%, משווק באריזות של 5 ק"ג (5,000 גרם).

- בעל הרישום: חברת אמ.פי.וט. בע"מ, רחוב המגשימים 20, ת.ד. 7004 קרית מטלון, פתח תקווה 49170
- יצרן: יו.סי.אל, ברסיה, איטליה
- חייב מרשם רופא, לשימוש וטרינרי בלבד,
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 083-61-92359
- נערך בינואר, 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות