

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה פרזיטל פלוס וטרינרי טבליות

2. **חומר פעיל** - כל טבלייה מכילה:
פריזיקוונטל (Praziquantel) 50 מ"ג, פירנטל (Pyrantel) 50 מ"ג (שווה-ערך ל-144 מ"ג פירנטל אמבונט) (Pyrantel Embonate), פבנטל (Febantel) 150 מ"ג.
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה לטיפול בתולעים שטוחות ובתולעים עגולות אצל כלבים, מהזנים הבאים:

Nematodes:

Ascarids: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (adult and late immature forms).

Hookworms: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adults).

Whipworms: *Trichuris vulpis* (adults).

Cestodes:

Tapeworms: *Echinococcus* species, (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia* species, (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*) *Dipylidium caninum* (adult and immature forms).

קבוצה תרפויטית: תרופות נגד תולעים.

4. **התוויות נגד**
אל תשתמש בתכשיר יחד עם תכשירים המכילים פיפרזין (piperazine) מאחר שלפעילות נגד תולעים של פירנטל ושל פיפרזין יכולות להיות השפעות שנוגדות זו את זו.
אין להשתמש בתכשיר לטיפול בחיות שיש להן רגישות ידועה למרכיבים הפעילים או לכל אחד מן המרכיבים הבלתי פעילים.

5. **תופעות לוואי**
במקרים נדירים מאוד, נצפו הפרעות במערכת העיכול (שלשול, הקאות).
אם אתה מבחין בתופעות לוואי חמורות כלשהן שאינן מוזכרות בעלון הזה, בבקשה דווח לרופא הווטרינרי שלך.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

[/https://sideeffects.health.gov.il/](https://sideeffects.health.gov.il/)

6. חיות מטרה כלבים

7. **צורת המתן ומינון עבור חייית המטרה:**
מנה בודדת: למתן דרך הפה.

שיעורי המינון המומלצים הם: 15 מ"ג/ק"ג פבנטל, 5 מ"ג/ק"ג פירנטל (שווה-ערך ל-14.4 מ"ג/ק"ג פירנטל אמבונט) ו-5 מ"ג/ק"ג פרזיקוונטל.
טבלייה אחת של פרזיטל פלוס ל-10 ק"ג משקל גוף. אפשר לתת את הטבליות לכלב באופן ישיר או לשלב אותן באוכל. הכלב לא צריך להיות בצום לפני הטיפול ולא אחריו.
אפשר לחלק את הטבלייה לשתיים או ארבע מנות שוות.
טבלת מינון:

משקל גוף (ק"ג)	טבליות
2.5 - ½	¼
2.6-5.0	½
5.1-10.0	1
10.1-15.0	1½
15.1-20.0	2
20.1-25.0	2½
25.1-30.0	3
30.1-35.0	3½
35.1-40.0	4
>40.1	טבלייה אחת ל-10 ק"ג

יש להתייעץ עם וטרינר לגבי הצורך במתן חוזר ותדירות מתן התרופה.

8. אופן השימוש בתכשיר

כדי להבטיח מתן מנה מתאימה, יש לקבוע את משקל הגוף במדויק ככל האפשר.
אפשר לחצות את הטבליות לחצאים או רבעים שווים.

9. זמן המתנה

לא ישים.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחייית המטרה
אל תשתמש בתכשיר יחד עם תכשירים המכילים פיפרזין (piperazine) מאחר שלפעילות נגד תולעים של פירנטל ושל פיפרזין יכולות להיות השפעות שנוגדות זו את זו. שימוש בו-זמני בתכשירים כולינגריים אחרים יכול להוביל לרעילות.
במידה ואינך בטוח, והכלב שלך משתמש בתכשירים וטרינריים אחרים, בדוק עם הרופא הוטרינר או הרוקח.

פרעושים משמשים מארחי ביניים לזן נפוץ אחד של תולעי סרט – דיפילידיום קנינום (*Dipylidium caninum*). הסיכוי להדבקה חוזרת בתולעי סרט הוא ודאי אם לא פועלים נגד מארחי הביניים שלהן, כגון פרעושים, עכברים וכיו"ב.
הדבקה בתולעי סרט אינה צפויה בגורים בני פחות משישה שבועות.
השפעות טרטוגניות המיוחסות למינונים גבוהים של פבנטל דווחו בכבשים וחולדות. לא בוצעו מחקרים בכלבים בתחילת ההריון. השימוש בתכשיר במהלך ההריון צריך להיות בהתאם להערכת סיכון תועלת על ידי הוטרינר האחראי. מומלץ שלא להשתמש במוצר בכלבים במהלך 4 השבועות הראשונים להריון. אין לחרוג מהמינון הנקוב בעת טיפול בכלבות הרות.
הטפילים יכולים לפתח עמידות לקבוצה מסוימת של תרופות נגד תולעים בעקבות שימוש חוזר ותכופ בתרופה נגד תולעים מקבוצת התרופות הזאת.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
במקרה של בליעה בשוגג, פנה לקבלת עזרה רפואית והראה לרופא את העלון שבאריזה.
למען השמירה על היגיינה הולמת, אנשים שנותרים את הטבליות לכלב באופן ישיר, או שמוסיפים אותן לאוכל של הכלב, צריכים לרחוץ את ידיהם לאחר מכן.
טיפול בבעלי-חיים בלבד.
אכינוקוקוזיס (echinococcosis) מסוכנת לבני אדם. מאחר שאכינוקוקוזיס היא מחלה מוכרת לארגון העולמי לבריאות בעלי-חיים (OIE), יש לבקש מן הרשויות המתאימות הנחיות ברורות לגבי הטיפול והמעקב, ולגבי אמצעי הזהירות שצריכים לנקוט בני-אדם.

• היריון

התקבלו דיווחים על מומים מולדים שיוחסו למינונים גבוהים של פבנטל אצל כבשים ועכברים. לא נערכו מחקרים על כלבות בתחילת ההיריון. השימוש בתכשיר במהלך ההיריון צריך להיות בהתאם להערכת תועלת מול סיכון שתיעשה על-ידי הווטרינר האחראי. מומלץ לא להשתמש בתכשיר לטיפול בכלבות במהלך ארבעת השבועות הראשונים של ההיריון. אין לחרוג מן המינון המומלץ בעת טיפול בכלבות הרות.

• תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות

אל תשתמש בתכשיר יחד עם תכשירים המכילים פיפרזין (piperazine) מאחר שלפעילות נגד תולעים של פירנטל ושל פיפרזין יכולות להיות השפעות שנוגדות זו את זו. שימוש בו-זמני עם תרכובות כולינרגיות אחרות (כגון פוקסים (foxim)) יכול לגרום להרעלה. אם אינך בטוח, והכלב שלך מטופל בתכשירים תרופתיים וטרינריים אחרים, התייעץ עם רופא וטרינר או עם רוקח.

• מינון יתר

השילוב בין פרזיקוונטל, פירנטל אמבונט ופבנטל נסבל היטב בכלבים. במחקרי בטיחות נמצא שמנה אחת שגודלה פי חמש מן המינון המומלץ או יותר מזה העלתה את השכיחות של הקאות מפעם לפעם.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- אין לאחסן מעל ל- 25°C.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

השלך מיד טבליות חצויות שלא השתמשת בהן. כל תכשיר תרופתי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או פסולת שמקורה בתכשירים תרופתיים וטרינריים כאלה יש להשליך בהתאם לנהלים המקומיים. אין להשליך תרופות למערכת הביוב הביתית או לאשפה הביתית. שאל את הרופא הווטרינר שלך כיצד להשליך תרופות שאין בהן עוד צורך. זה יסייע לשמור על הסביבה.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם: Microcrystalline Cellulose, Lactose Monohydrate, Synthetic Pork Flavour, Sodium Laurilsulfate, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Colloidal Anhydrous Silica.

כל טבליה מכילה 81.75 מ"ג לקטוז מונוהידראט ו- 2.25 מ"ג נתרן.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
טבליות צהובות עגולות בטעם בשר חזיר, עם קו חצייה בצידן האחד.
משווק באריזות של 24, 104 או 200 טבליות.
ייתכן שלא כל גדלי האריזות ישווקו.

בעל הרישום: אי.אל. מדי-מרקט בע"מ, רחוב הקטיפה 3, פארק תעשיות עמק חפר, מיקוד 3877701

שם היצרן:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co.Galway, Ireland

נערך באוקטובר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 157-34-34384-00