עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סימבסטאטין טבע 10 מ"ג
סימבסטאטין טבע 20 מ"ג
סימבסטאטין טבע 40 מ"ג
סימבסטאטין טבע 80 מ"ג
טבליות

הרכב:
כל טבליה של סימבסטאטין טבע 10 מ"ג מכילה:
סימבסטאטין 10 מ"ג Simvastatin 10 mg
כל טבליה של סימבסטאטין טבע 20 מ"ג מכילה:
סימבסטאטין 20 מ"ג Simvastatin 20 mg
כל טבליה של סימבסטאטין טבע 40 מ"ג מכילה:
סימבסטאטין 40 מ"ג Simvastatin 40 mg
כל טבליה של סימבסטאטין טבע 80 מ"ג מכילה:
סימבסטאטין 80 מ"ג Simvastatin 80 mg
למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 6 - "מידע נוסף" וסעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 20 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

סימבסטאטין טבע מפחיתה בחולים עם מחלת לב כלילית והיפרכולסטרולמיה:
- את הסיכון לתמותה כוללת על ידי הורדת התמותה ממחלות לב.
- את הסיכון להתקף לב שאינו קטלני.
- את הסיכון לביצוע פעולות פולשניות להשבת זרימת הדם ללב (כגון הרחבות בלון או ניתוחי מעקפים).
- את הסיכון לשבץ מוחי ולהתקף איסכמי חולף (Transient Ischemic Attack – TIA).

סימבסטאטין טבע מותוות להורדת רמות LDL ומרכיבים שומניים אחרים בדם והעלאת רמות HDL בדם בחולים עם היפרליפידמיה (רמה גבוהה של שומנים בדם).
קבוצה תרפויטית: סטאטינים, מעכבי האנזים HMG-CoA רדוקטאז.
כיצד סימבסטאטין טבע פועלת:
סימבסטאטין טבע מכילה חומר פעיל בשם סימבסטאטין. סימבסטאטין טבע משמשת להורדה בדם של רמת הכולסטרול הכוללת (total cholesterol), רמות הכולסטרול "הרע" (כולסטרול ה-LDL), ושל רמות התרכובות השומניות הנקראות טריגליצרידים. בנוסף, סימבסטאטין טבע מעלה את רמות הכולסטרול "הטוב" (כולסטרול ה-HDL).
כולסטרול הוא אחד מהמרכיבים השומניים הנמצאים בדם. הכולסטרול הכללי מורכב בעיקר מכולסטרול ה-LDL וה-HDL. כולסטרול ה-LDL נקרא לעתים קרובות הכולסטרול "הרע", מאחר שהוא עלול להצטבר על גבי דפנות העורקים וליצור פלאק. עם הזמן הצטברות הפלאק עלולה לגרום להיצרות העורקים. ההיצרות הזאת עלולה להאט או לחסום את זרימת הדם לאיברים החיוניים כגון הלב או המוח. חסימת זרימת הדם עלולה להוביל להתקף לב או לשבץ. כולסטרול ה-HDL נקרא לעיתים קרובות הכולסטרול "הטוב", מאחר שהוא מסייע במניעת הצטברות הפלאק בעורקים, ומונע מחלת לב. טריגליצרידים הם סוג אחר של שומן הנמצא בדם העלולים להעלות את הסיכון למחלת לב. עליך להקפיד על דיאטת דלת כולסטרול בזמן שאתה נוטל תרופה זו.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף" וסעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").
- אתה סובל כעת מבעיות כבד.
- את בהיריון או מניקה.
- אתה נוטל תרופות המכילות אחד או יותר מאחד החומרים הפעילים הבאים:
  - איטראקונאזול, קטוקונאזול, פוסקונאזול או וריקונאזול (המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים).
  - אריתרומיצין, קלאריתרומיצין או טליתרומיצין (המשמשות לטיפול בזיהומים).
  - מעכבי פרוטאז HIV כגון אינדינאביר, נלפינאביר, ריטונאביר וסאקווינאביר (מעכבי פרוטאז HIV משמשים לטיפול בזיהומי HIV).
  - בוספריביר או טלאפריביר (המשמשות לטיפול בזיהום הפטיטיס C).
  - נפאזודון (המשמשת לטיפול בדיכאון).
  - קוביסיסטאט.
  - גמפיברוזיל (המשמשת להורדת כולסטרול).
  - ציקלוספורין (המשמשת במטופלים לאחר השתלה).
  - דאנאזול (הורמון מלאכותי המשמש לטיפול באנדומיטריוזיס, מצב בו חלקים של רקמת רירית הרחם צומחים מחוץ לרחם).
- אין ליטול יותר מ-40 מ"ג של סימבסטאטין טבע, אם אתה נוטל לומיטאפיד (תרופה המשמשת לטיפול במצב רפואי חמור ונדיר של כולסטרול תורשתי).

שאל את הרופא אם אינך בטוח אם התרופה שלך רשומה מעלה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
לפני הטיפול בסימבסטאטין טבע, ספר לרופא:
- על כל הבעיות הרפואיות שלך כולל אלרגיות.
- אם אתה שותה כמויות גדולות של אלכוהול.
- אם סבלת בעבר ממחלת כבד. ייתכן שהטיפול בסימבסטאטין טבע אינו מתאים לך.
- אם אתה עומד לעבור ניתוח. ייתכן שיהיה צורך להפסיק נטילת סימבסטאטין טבע לתקופה קצרה.
- אם אתה סובל מכשל נשימתי חמור.
- אם אתה ממוצא אסייתי. ייתכן שיידרש עבורך מינון אחר.
- אם אתה נוטל או אם נטלת ב-7 הימים האחרונים תרופה הנקראת חומצה פוסידית (תרופה לטיפול בזיהום חיידקי) במתן דרך הפה או בזריקה. השילוב של חומצה פוסידית עם סימבסטאטין טבע עלול להוביל לבעיות שרירים חמורות (רבדומיוליזיס).

צור קשר עם הרופא המטפל באופן מיידי אם אתה חש כאב שרירים, רגישות או חולשת שרירים בלתי מוסברים. זאת כיוון שבמקרים נדירים, בעיות שרירים עלולות להיות חמורות, כולל פירוק שרירים המביא לנזק לכליה, ובמקרים נדירים מאוד למוות.
הסיכון לפירוק שרירים גבוה יותר בחולים הנוטלים מנות גבוהות של סימבסטאטין טבע, במיוחד מינון של 80 מ"ג. בנוסף, הסיכון לפירוק שרירים גבוה יותר בחולים מסוימים. דבר עם הרופא שלך אם אחד מהבאים חל עליך:
- אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול.
- יש לך בעיות בכליה.
- יש לך בעיות בבלוטת התריס.
- גילך הוא 65 שנים או יותר.
- את אישה.
- היו לך בעבר בעיות שרירים במהלך הטיפול בתרופות להורדת כולסטרול הנקראות "סטאטינים" או פיברטים.
- יש לך או לקרוב משפחתך מחלת שרירים תורשתית.

כמן כן, ספר לרופא או לרוקח אם יש לך חולשת שרירים קבועה. ייתכן שיידרשו בדיקות ותרופות נוספות על מנת לאבחן ולטפל בעניין זה.

בדיקות ומעקב:
לפני תחילת השימוש בתרופה ובמשך תקופת הטיפול בתרופה אם יש לך תסמינים כלשהם של בעיות כבד, הרופא יפנה אותך לבדיקת דם. זאת על מנת לבדוק את תפקודי הכבד שלך.
לאחר תחילת הטיפול בסימבסטאטין טבע, ייתכן שתופנה על ידי הרופא לבדיקת דם לבדיקת תפקודי כבד.
אם יש לך סוכרת או אתה בסיכון לפתח סוכרת, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אחריך. אתה נמצא בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, משקל עודף ולחץ דם גבוה.
אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
נטילת סימבסטאטין טבע עם אחת התרופות הרשומות מטה עלולה להעלות את הסיכון לבעיות שרירים (חלקן מוזכרות בסעיף 2 - "אין להשתמש בתרופה אם").
- **אם עליך ליטול חומצה פוסידית במתן דרך הפה לטיפול בזיהום חיידקי, תצטרך להפסיק זמנית את טיפול בסימבסטאטין טבע. הרופא ינחה אותך מתי ניתן להתחיל מחדש ליטול את סימבסטאטין טבע באופן בטוח. נטילת סימבסטאטין טבע יחד עם חומצה פוסידית עלולה, לעתים נדירות, לגרום לחולשת שרירים, לרגישות שרירים או לכאב שרירים (רבדומיוליזיס). למידע נוסף עבור רבדומיוליזיס ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי".**
- ציקלוספורין (הניתנת לעתים קרובות למטופלים לאחר השתלות).
- דאנאזול (הורמון מלאכותי המשמש לטיפול באנדומיטריוזיס, מצב בו חלקים של רקמת רירית הרחם צומחים מחוץ לרחם).
- תרופות עם חומרים פעילים כגון איטראקונאזול, קטוקונאזול, פלוקונאזול, פוסאקונאזול או וריקונאזול (המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים).
- פיבראטים עם חומרים פעילים כגון גמפיברוזיל או בזאפיבראט (המשמשים להורדת כולסטרול).
- אריתרומיצין, קלאריתרומיצין, טליתרומיצין (המשמשות לטיפול בזיהומים חיידקיים).
- מעכבי HIV פרוטאז כגון אינדינאביר, נלפינאביר, ריטונאביר או סאקווינאביר (המשמשים לטיפול ב-HIV).
- תרופות אנטי-ויראליות לטיפול בהפטיטיס C כגון בוספריביר, טלאפריביר, אלבאזביר או גרזופריביר (המשמשות לטיפול בזיהום בווירוס ההפטיטיס C).
- נפאזודון (המשמשת לטיפול בדיכאון).
- תרופות עם החומר הפעיל קוביציסטט.
- אמיודארון (המשמשת לטיפול בקצב לב לא סדיר).
- ווראפאמיל, דילטיאזם או אמלודיפין (המשמשות לטיפול ביתר לחץ דם, בכאב בחזה המיוחס למחלת לב או במצבים לבביים אחרים).
- לומיטאפיד (תרופה המשמשת לטיפול במצב רפואי חמור ונדיר של כולסטרול תורשתי).
- דפטומיצין (תרופה המשמשת לטיפול בזיהומים מורכבים בעור וברקמות העור ובבקטרמיה). ייתכן שתופעות הלוואי המשפיעות על השרירים יהיו חזקות יותר עם נטילת תרופה זו במהלך הטיפול בסימבסטאטין טבע. הרופא עשוי להחליט שעליך להפסיק ליטול סימבסטאטין טבע זמנית.
- קולכיצין (המשמשת לטיפול בשיגדון).
- טיקגרלור (תרופה נוגדת קרישה).

בנוסף לתרופות המפורטות לעיל, ספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם. במיוחד ספר לרופא אם אתה לוקח תרופה אחת מהתרופות הבאות:
- תרופות עם חומר פעיל הנוגד קרישת דם, כגון וורפארין, פנפרוקומון או אצנוקומרול (נוגדי קרישה)
- פנופיבראט (המשמשת גם להורדת כולסטרול)
- ניאצין (המשמשת גם להורדת כולסטרול)
- ריפמפיצין (המשמשת לטיפול בשחפת)

ספר לכל רופא הרושם לך תרופה חדשה שאתה נוטל סימבסטאטין טבע.
שימוש בתרופה ומזון:
מיץ אשכוליות מכיל אחד או יותר מרכיבים שמשפיעים על האופן בו הגוף מפרק תרופות מסוימות, כולל סימבסטאטין טבע. **יש להימנע מצריכת מיץ אשכוליות.**
היריון והנקה:
אין להשתמש בסימבסטאטין טבע אם את בהיריון, מנסה להיכנס להיריון או חושבת שאת בהיריון. אם הרית במהלך הטיפול בסימבסטאטין טבע, הפסיקי ליטול אותה וצרי קשר עם הרופא שלך מייד.
אין ליטול סימבסטאטין טבע אם את מיניקה, כיוון שלא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם. יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה כלשהי.
נהיגה ושימוש במכונות:
סימבסטאטין טבע אינה צפויה להשפיע על יכולתך לנהוג או להפעיל מכונות. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שאנשים מסוימים עלולים לחוש סחרחורת לאחר נטילת סימבסטאטין טבע.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
סימבסטאטין טבע מכילה סוכר הנקרא **לקטוז**. אם נאמר לך על ידי הרופא כי יש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא בטרם השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
המינון ההתחלתי המומלץ הוא 10 מ"ג או 20 מ"ג פעם ביום, בערב, עם או ללא מזון.
צורת הנטילה:
יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
ניתן לחצות את הטבליה בקו החצייה.
אין מידע לגבי כתישה ולעיסה.
בגלל הסיכון המוגבר לבעיות שרירים, המינון של 80 מ"ג הוא רק עבור מטופלים אשר נוטלים מינון של 80 מ"ג באופן כרוני (כגון 12 חודשים ומעלה) ללא נזק לשריר ואשר לא צריכים לקחת תרופות מסוימות אחרות יחד עם סימבסטאטין טבע, אשר עלולות להגביר את הסיכוי שלך לפתח נזק בשריר.
ייתכן שהרופא שלך ירשום לך מינונים נמוכים יותר, במיוחד אם אתה נוטל תרופות מסוימות מאלו המופיעות למעלה או אם יש לך בעיות מסוימות בכליה.
אם אתה נוטל גם תרופות הקושרות חומצות מרה (תרופות להורדת כולסטרול) כגון כולסטיראמין, עליך ליטול סימבסטאטין טבע לפחות שעתיים לפני או ארבע שעות אחרי נטילת תרופות אלו.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, עליך לפנות מייד לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
עליך להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא שלך.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
המשך ליטול סימבסטאטין טבע אלא אם הרופא שלך אמר לך להפסיק. אם תפסיק ליטול סימבסטאטין טבע, הכולסטרול שלך עלול לעלות שוב.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה <u>בכל פעם</u> שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסימבסטאטין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
תופעות לוואי חמורות נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000:
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא או לחדר מיון מייד אם הופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות:
- כאב שרירים, רגישות שרירים, חולשת שרירים, התכווצויות שרירים או קרע בשריר (נדיר מאוד). במקרים נדירים בעיות שרירים אלו עלולות להיות חמורות, כולל פירוק שרירים שמביא לנזק לכליה, ובמקרים נדירים מאוד אף למוות.
- תגובות רגישות יתר (אלרגיה) הכוללות: התנפחות הפנים, הלשון, או הגרון העלולה לגרום לקושי בנשימה (אנגיואדמה).
- כאב שרירים חמור, בדרך כלל בכתפיים או בירכיים (כאבי שרירים רב-שגרוניים).
- פריחה עם חולשה בגפיים ובשרירי הצוואר.
- פריחה שעלולה להופיע בעור ופצעים בפה (lichenoid drug eruptions) (נדיר מאוד).
- כאב או דלקת במפרקים.
- דלקת של כלי הדם (ואסקוליטיס).
- חבורות בלתי רגילות, תפרחת והתנפחות העור (דרמטומיוסיטיס), חרלת, רגישות העור לשמש, חום, הסמקה.
- קוצר נשימה (דיספנאה) ותחושה כללית לא טובה.
- מצב הדומה ללופוס (הכולל פריחה, בעיות במפרקים והשפעה על תאי הדם).
- דלקת בכבד המלווה בסימפטומים הבאים: הצהבת העור והעיניים, גירוד, שתן בצבע כהה או צואה בצבע בהיר, הרגשת עייפות או חולשה, איבוד תיאבון; אי ספיקת כבד קטלנית ולא קטלנית (נדיר מאוד).
- דלקת בלבלב המלווה בדרך כלל בכאב בטן חמור.

תופעות לוואי חמורות נדירות מאוד (very rare) - תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000:
- תגובה אלרגית חמורה הגורמת לקשיי נשימה או לסחרחורות (אנפילקסיס).
- גינקומסטיה (הגדלת חזה אצל גברים).

תופעות לוואי נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000:
- ספירה נמוכה של תאי הדם האדומים (אנמיה).
- חוסר תחושה או חולשה של הידיים ושל הרגליים.
- כאב ראש, תחושת עקצוץ, סחרחורת.
- ראייה מטושטשת, ראייה לקויה.
- הפרעות במערכת העיכול (כאב בטן, עצירות, נפיחות, קשיי עיכול, שלשול, בחילה, הקאה).
- פריחה, גירוד, נשירת שיער.
- חולשה.
- בעיות שינה (נדיר מאוד).
- זיכרון חלש (נדיר מאוד), אובדן זיכרון, בלבול.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):
- בעיות בזיקפה.
- דיכאון.
- בעיות בגידים, שלעתים מסתבכות עד קריעת גיד.
- חולשת שרירים קבועה.

תופעות לוואי אפשריות בעת השימוש בסטאטינים:
- הפרעות שינה כולל סיוטי לילה.
- קשיים בתפקוד המיני.
- בעיות נשימה כולל שיעול קבוע ו/או קוצר נשימה או חום.
- סוכרת. הדבר סביר יותר אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, עודף משקל ולחץ דם גבוה. הרופא שלך יעקוב אחריך בתקופת הטיפול בתרופה זו.

ערכי תוצאות מעבדה:
נצפו עליות בבדיקות דם מסוימות לבדיקת תפקודי כבד ואנזים השריר (קריאטין קינאז).
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח על תופעות לוואי:
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון:
יש לאחסן תרופה זו במקום יבש וחשוך, מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Lactose monohydrate, pregelatinized starch, microcrystalline cellulose, ascorbic acid, citric acid monohydrate, magnesium stearate, butylhydroxyanisole, hypromellose, titanium dioxide, macrogol, triacetin, red iron oxide, 10 mg, 20 mg, 80 mg: yellow iron oxide, 80 mg: black iron oxide.
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
סימבסטאטין טבע 10 מ"ג:
טבליה מצופה בצורת אליפסה, בצבע ורוד בהיר, בצד האחד של הטבליה יש קו חצייה וצידה האחר חלק.
כמות באריזה: 30 טבליות.
סימבסטאטין טבע 20 מ"ג:
טבליה מצופה בצורת אליפסה, בגוון חום בהיר (tan), בצד האחד של טבליה יש קו חצייה וצידה האחר חלק.
כמות באריזה: 30 טבליות.
סימבסטאטין טבע 40 מ"ג:
טבליה מצופה בצורת אליפסה, בצבע ורוד, בצד האחד של טבליה יש קו חצייה וצידה האחר חלק.
כמות באריזה: 10, 30, 60, 100 טבליות.
סימבסטאטין טבע 80 מ"ג:
טבליה מצופה בצורת אליפסה, בצבע אדום-חום, בצד האחד של טבליה יש קו חצייה וצידה האחר חלק.
כמות באריזה: 12, 30 טבליות.
ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.
שם בעל הרישום והיצרן וכתובתו:
טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.
העלון נערך בדצמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
סימבסטאטין טבע 10 מ"ג: 120.94.30070
סימבסטאטין טבע 20 מ"ג: 120.75.30071
סימבסטאטין טבע 40 מ"ג: 129.18.30737
סימבסטאטין טבע 80 מ"ג: 128.05.30671
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

SIMVASTATIN TABS PIL MW0122

teva