

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סגלורומט 2.5/1000 מ"ג

סגלורומט 7.5/1000 מ"ג

טבליה מצופה

סגלורומט 2.5/1000 מ"ג: כל טבליה מצופה מכילה:
2.5 mg ertugliflozin (as ertugliflozin L pyroglutamic acid) and 1000 mg of metformin hydrochloride.

ארטוגליפלוזין 2.5 מ"ג (כ- ארטוגליפלוזין חומצה L-פירוגלוטמית) ו- 1000 מ"ג מטפורמין הידרוכלוריד.

סגלורומט 7.5/1000 מ"ג: כל טבליה מצופה מכילה:
7.5 mg ertugliflozin (as ertugliflozin L pyroglutamic acid) and 1000 mg of metformin hydrochloride.

ארטוגליפלוזין 7.5 מ"ג (כ- ארטוגליפלוזין חומצה L-פירוגלוטמית) ו- 1000 מ"ג מטפורמין הידרוכלוריד.

לרשימה של המרכיבים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
ראה גם סעיף 2.10 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

סגלורומט מיועדת, בנוסף לדיאטה ופעילות גופנית, לשיפור השליטה ברמות הסוכר בדם בקרב מבוגרים בני 18 ומעלה עם סוכרת מסוג 2: המטופלים עם מטפורמין לבד או בשילוב עם תרופות נוספות ורמות הסוכר שלהם אינן מאוזנות, או למטופלים המקבלים שילוב של מטפורמין וארטוגליפלוזין כטבליות נפרדות.

קבוצה תרפויטית:

- סגלורומט מכילה שני חומרים פעילים, ארטוגליפלוזין ומטפורמין.
- ארטוגליפלוזין שייך לקבוצת תרופות בשם מעכבי סודיום גלוקוז קו-טרנספורטר-2 (SGLT2).
- מטפורמין שייך לקבוצת תרופות בשם ביגואנידים.

כיצד סגלורומט פועלת

- ארטוגליפלוזין פועל על ידי חסימת חלבון SGLT2 בכליות. דבר הגורם להגברת הפרשת הגלוקוז בשתן.
- מטפורמין פועל על ידי עיכוב ייצור סוכר (גלוקוז) בכבד.

מה זאת סוכרת מסוג 2?

סוכרת מסוג 2 הינו מצב שבו הגוף שלך אינו מייצר מספיק אינסולין או שהאינסולין שהגוף שלך מייצר אינו פועל היטב כפי שהוא צריך. הגוף שלך יכול גם לייצר יותר מידי סוכר. כשזה קורה, סוכר (גלוקוז) מצטבר בדם. דבר זה יכול להוביל לבעיות רפואיות חמורות כגון מחלת לב, מחלת כליות, עיוורון וזרימת דם לקויה.

2. לפני השימוש בתרופה

2.1 אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים ארטוגליפלוזין או מטפורמין, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מופיעים בסעיף 6 "מידע נוסף").
 - יש לך תפקוד כלייתי ירוד באופן חמור או שאתה זקוק לדיאליזה.
 - יש לך סוכרת בלתי נשלטת, לדוגמה-בשילוב היפרגליקמיה חמורה (רמות גבוהות של גלוקוז בדם), בחילה, הקאה, שלשול, איבוד מהיר של משקל, חמצת לקטית (ראה "סיכון לחמצת לקטית" בהמשך) או חמצת קטוטית (ketoacidosis). חמצת קטוטית היא מצב בו חומרים בשם "גופי קטון" מצטברים בדם ואשר עלול להוביל לטרומת תרדמת סוכרתית. התסמינים כוללים כאב בטן, נשימות מהירות ועמוקות, ישנוניות, או התפתחות של ריח פירותי יוצא דופן להבל הפה שלך.
 - יש לך זיהום חמור או שאתה מיובש.
 - עברת לאחרונה התקף לב או שיש לך בעיות חמורות בזרימת הדם כגון "שוק" או קשיי נשימה.
 - יש לך בעיות בכבד.
 - אתה נוהג לשתות כמות גדולה של אלכוהול (מדי פעם או על בסיס קבוע).
- אין ליטול סגלורומט אם אחד או יותר מהדברים שצוינו לעיל נוגע לך. אם אינך בטוח, דבר עם הרופא שלך לפני נטילת סגלורומט.

2.2 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני ובזמן הטיפול בסגלורומט, ספר לרופא אם אתה:

- סובל מבעיות בכליות.
- סובל או סבלת בעבר מזיהומים פטרייתיים בנרתיק או בפין.
- סובל ממחלת לב חמורה או אם חווית שבץ.
- סובל מסוכרת מסוג 1. סגלורומט אינה מיועדת לטיפול באנשים עם סוכרת מסוג 1.
- נוטל תרופות אחרות לטיפול בסוכרת; יש סבירות גבוהה יותר שתהיה לך רמת סוכר נמוכה בדם עם תרופות מסוימות.
- עלול להיות בסיכון להתייבשות (למשל, אם אתה נוטל תרופות שמגבירות ייצור שתן [משתנים], מורידות לחץ דם או אם אתה מעל גיל 65 שנים). שאל את הרופא על דרכים למניעת התייבשות.
- סובל מאיבוד מהיר של משקל, בחילה או הקאה, כאב בטן, צימאון יתר, נשימות מהירות ועמוקות, בלבול, ישנוניות או עייפות חריגה, ריח מתוק להבל הפה שלך, טעם מתוק או מתכתי בפה שלך או ריח שונה לשתן או לזיעה שלך, פנה מיד לרופא או לבית החולים הקרוב ביותר. תסמינים אלו יכולים להיות סימן לחמצת קטוטית סוכרתית (diabetic ketoacidosis) – בעיה שאתה עלול לסבול ממנה עם סוכרת בשל עלייה ברמות של "גופי קטון" בשתן או בדם שלך, הנראית בבדיקות. הסיכון לפתח חמצת קטוטית סוכרתית עלול לעלות בצום ממושך, צריכת אלכוהול מופרזת, התייבשות, הפחתה פתאומית במינון האינסולין, או צורך מוגבר באינסולין בעקבות ניתוח גדול או מחלה קשה.

חשוב לבדוק את כפות הרגליים באופן קבוע ולהשמע לכל עצה אחרת הניתנת על ידי אנשי מקצוע רפואיים בנוגע לטיפול נאות בכף הרגל.

עליך לשוחח עם הרופא מיד אם הנך מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות: אודם, כאב, רגישות או נפיחות באזור שבין ומסביב לפי הטבעת ואיברי המין שלך, בליווי חום מעל 38°C או הרגשה כללית רעה וחולשה. תופעות לוואי אלו יכולות להעיד על התפתחות של Fournier's gangrene. מדובר בזיהום חידקי נדיר אך מסכן חיים. קיימים מספר דיווחים אודות היארעות תופעת לוואי זו בנשים ובגברים אשר נטלו תרופות לטיפול בסוכרת ממשפחת התרופות אליה שייך סגלורומט. תופעת לוואי זו עלולה להוביל לאשפוז, צורך בניתוח ואף למוות. תסמיני Fournier's gangrene עלולים להידרדר במהירות, ולכן חשוב לפנות לעזרה רפואית במהירות במידה והנך חש באחד מתסמינים אלו.

כאשר תרופה זו נלקחת בשילוב עם אינסולין או תרופות שמגבירות הפרשת אינסולין מהלבלב, רמת הסוכר בדם יכולה לרדת (היפוגליקמיה). ייתכן שהרופא שלך יקטין את המינון של האינסולין שלך או של תרופה אחרת.

אם יש לך שאלות נוספות כלשהן על השימוש בתרופה זו, שאל את הרופא או הרוקח שלך.

סיכון לחמצת לקטית (ראה פירוט בפרק 4 "תופעות לוואי")

סגלורומט עלולה לגרום לתופעת לוואי נדירה מאוד אך חמורה מאוד בשם חמצת לקטית, במיוחד אם הכליות שלך אינן מתפקדות כראוי. הסיכון לפתח חמצת לקטית עולה גם עם סוכרת בלתי נשלטת, זיהומים חמורים, צום או צריכת אלכוהול ממושכים, התייבשות (ראה מידע נוסף בהמשך), בעיות בכבד וכל מצב רפואי בו חלק מהגוף מקבל אספקת חמצן פחותה (כגון מחלת לב חמורה אקוטית). אם אחד או יותר מהדברים שצוינו לעיל נוגע לך, דבר עם הרופא שלך לקבלת הנחיות נוספות.

הפסק ליטול סגלורומט לפרק זמן קצר אם אתה סובל ממצב שעלול להיות קשור להתייבשות (איבוד משמעותי של נוזלי גוף) כגון הקאה חמורה, שלשול, חום, חשיפה לחום או אם אתה שותה פחות נוזלים מהרגיל. דבר עם הרופא שלך לקבלת הנחיות נוספות.

הפסק ליטול סגלורומט ופנה מיד לרופא או לבית החולים הקרוב ביותר אם מופיע אחד מהתסמינים הבאים של חמצת לקטית, היות שמצב זה עלול להוביל לתרדמת. תסמינים של חמצת לקטית כוללים:

- הקאה
 - כאב בטן
 - התכווצויות שרירים
 - תחושה כללית של חולי עם עייפות חמורה
 - קושי בנשימה
 - ירידה בטמפרטורת הגוף ובדופק
- חמצת לקטית הינה מצב חירום רפואי המחייב טיפול בבית חולים.

אם אתה צריך לעבור ניתוח גדול, עליך להפסיק ליטול סגלורומט במהלך ובמשך זמן מה לאחר הניתוח. הרופא שלך יחליט מתי עליך להפסיק ומתי להתחיל מחדש את הטיפול שלך בסגלורומט.

2.3 בדיקות ומעקב

במהלך הטיפול בסגלורומט, הרופא שלך יבדוק את תפקודי הכליות שלך לפחות פעם בשנה או בתדירות גבוהה יותר אם אתה קשיש ו/או אם אתה סובל מהחמרה בתפקוד הכליות.

גלוקוז בשתן

בשל אופן פעולתה של סגלורומט, בדיקת השתן שלך תהיה חיובית לסוכר (גלוקוז) בזמן שהנך נוטל את התרופה.

2.4 ילדים ומתבגרים

אין לתת תרופה זו לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. לא קיים מידע זמין לגבי בטיחות ויעילות התרופה בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

2.5 אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ייתכן שתזדקק לבדיקות גלוקוז בדם ותפקודי כליות בתדירות גבוהה יותר, או שהרופא שלך יצטרך להתאים את המינון של סגלורומט. ספר לרופא שלך במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות שמגבירות ייצור שתן (משתנים).

- תרופות אחרות אשר מורידות את רמות הסוכר בדם שלך, כגון אינסולין או תרופות שמעלות הפרשת אינסולין מהבלב.
 - תרופות מסוימות לטיפול בכאב ודלקת (NSAID ומעכבי COX-2, כגון איבופרופן וסלקוקסיב).
 - תרופות מסוימות לטיפול בלחץ דם גבוה (מעכבי ACE וחוסמי קולטן לאנגיוטנסין II).
- אם אחד או יותר מהדברים שצוינו לעיל נוגע לך (או אם אינך בטוח), ספר לרופא שלך.

אם אתה צריך לקבל זריקה של חומר ניגוד המכיל יוד למחזור הדם שלך, לדוגמה, בהקשר של צילום רנטגן או סריקה, עליך להפסיק ליטול סגלורומט לפני או בזמן ההזרקה. הרופא שלך יחליט מתי עליך להפסיק ומתי להתחיל מחדש את הטיפול בסגלורומט.

2.6 שימוש בתרופה ומזון

עדיף ליטול את הטבליה יחד עם ארוחה.

2.7 שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להימנע מצריכת אלכוהול בכמויות גבוהות בזמן הטיפול בתרופה. צריכת אלכוהול מגבירה את הסיכון לחמצת לקטית (ראה סעיף 2.2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

2.8 היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות, היוועצי ברופא או ברוקח שלך לפני השימוש בתרופה זו.

לא ידוע אם סגלורומט עלולה להזיק לעובר שלך. אם את בהיריון, דברי עם הרופא שלך לגבי הדרך הטובה ביותר לשלוט ברמות הסוכר שלך בדם בזמן ההיריון. אל תשתמשי בסגלורומט אם את בהיריון.

לא ידוע אם סגלורומט עוברת לחלב אם. דברי עם הרופא שלך על הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך אם את נוטלת תרופה זו. אל תשתמשי בסגלורומט אם את מניקה.

2.9 נהיגה ושימוש במכונות

לתרופה זו אין השפעה או שהיא בעלת השפעה זניחה על היכולת לנהוג ולהפעיל מכונות. נטילת תרופה זו בשילוב אינסולין או תרופות המעלות הפרשת אינסולין מהבלב יכולה לגרום לנפילה של רמות הסוכר בדם לרמה נמוכה מדי (היפוגליקמיה), דבר שעלול לגרום לתסמינים כגון רעידות, הזעה ושינוי בראייה, ועלול להשפיע על היכולת שלך לנהוג ולהפעיל מכונות. אין לנהוג או להשתמש בכלים או מכונות כלשהם, אם אתה חש מסוחרר בזמן נטילת סגלורומט.

2.10 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לכל טבליה, כלומר למעשה 'נטולת נתרן'.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

כמה ליטול

- המינון המומלץ של סגלורומט הוא טבליה אחת פעמיים ביום.
- המינון של סגלורומט שטיטול יהיה תלוי במצבך ובכמויות הארטוגליפלוזין והמטפורמין הדרושות לשלוט ברמות הסוכר שלך בדם.
- הרופא שלך ירשום את המינון הנכון עבורך. אין לשנות את המינון, אלא אם כן הרופא שלך הורה לך על כך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

- צורת הנטילה: בליעה.
- בלע את הטבליה.
- טול טבליה אחת פעמיים ביום. השתדל ליטול אותן באותה השעה כל יום; זה יעזור לך לזכור לקחת אותן.
- עדיף ליטול את הטבליה יחד עם ארוחה. דבר זה יוריד את הסיכוי לסבול מכאב בטן.
- עליך להמשיך בדיאטה שנרשמה לך ובתכנית הפעילות הגופנית שלך בזמן נטילת סגלורומט.

כתישה/חצייה/לעיסה:

- על מנת להקל על הבליעה, ניתן, במידת הצורך, לחצות או לכתוש את הטבליה לשימוש מידי. יש לבלוע את שני החצאים מיד לאחר החציה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם אתה נוטל יותר מידי סגלורומט, שוחח עם רופא או רוקח מיד. אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול מנה, קח אותה ברגע שנזכרת. עם זאת, אם הזמן ליטול את המנה הבאה קרוב, דלג על המנה שנשכחה וחזור ללוח זמני הנטילה הרגיל שלך.

אין ליטול מנה כפולה (שתי מנות באותו הזמן) על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק ליטול תרופה זו ללא התייעצות עם הרופא שלך. רמות הסוכר שלך בדם עלולות לעלות אם תפסיק ליטול את התרופה.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסגלורומט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא או לבית החולים הקרוב, אם אתה סובל מאחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

חמצת לקטית (תופעת לוואי נדירה מאוד, שעלולה להופיע בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000) סגלורומט עלולה לגרום לתופעת לוואי נדירה מאוד, אך חמורה מאוד בשם חמצת לקטית (ראה גם סעיף 2.2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"). אם זה מתרחש, יש להפסיק ליטול סגלורומט ולפנות מיד לרופא או לבית החולים הקרוב ביותר, היות שחמצת לקטית עלולה להוביל לתרדמת.

חמצת קטוטית סוכרתית (תופעת לוואי נדירה, שעלולה להופיע ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000)
אלה הסימנים של חמצת קטוטית סוכרתית (ראה גם סעיף 2.2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"):

- רמות מוגברות של "גופי קטון" בשתן או בדם שלך
 - איבוד מהיר במשקל
 - חולי או הרגשת חולי
 - כאב בטן
 - צימאון יתר
 - נשימות מהירות ועמוקות
 - בלבול
 - ישמוניות או עייפות חריגה
 - ריח מתוק להבל הפה שלך, טעם מתוק או מתכתי בפה שלך או ריח שונה לשתן או לזיעה שלך
- דבר זה עלול להתרחש ללא קשר לרמת גלוקוז בדם. הרופא שלך עשוי להחליט להפסיק באופן זמני או קבוע את הטיפול שלך בסגלורומט.

חיתולית נמקית (necrotising fasciitis) של חיץ נקבים (פרינאום) או גנגרנה של פורנייה (Fournier's gangrene) (שכיחות לא ידועה, לא ניתן להעריך מהנתונים הקיימים)
זיהום חמור של רקמות רכות באיברי המין או באזור שבין ומסביב לפי הטבעת ואיברי המין שלך (לתסמינים, ראה סעיף 2.2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

אם אתה מבחין בתופעת לוואי כלשהי המצוינת לעיל, פנה מיד לרופא או לבית החולים הקרוב.

פנה לרופא בהקדם האפשרי אם אתה שם לב לתסמינים הבאים:

דלקת בדרכי השתן (תופעת לוואי שכיחה מאוד, שעלולה להופיע ביותר ממשתמש 1 מתוך 10)
הסימנים לדלקת בדרכי השתן הם:

- תחושת צריבה בעת מתן שתן
- שתן שנראה עכור
- כאב באגן או באמצע הגב (כאשר הכליות נגועות)

למרות שזה נדיר, אם יש לך חום או רואים דם בשתן, ספר לרופא מיד.

התייבשות (איבוד כמות גדולה מידי של מים מהגוף שלך; תופעת לוואי שכיחה, שעלולה להופיע ב 10-1 משתמשים מתוך 100)
תסמינים של התייבשות כוללים:

- יובש בפה
- הרגשת סחרחורת, סחרור או חולשה, במיוחד כאשר אתה נעמד
- התעלפות

יש לך סיכוי גבוה יותר להתייבשות אם אתה:

- סובל מבעיות בכליות
- לוקח תרופות שמגבירות את ייצור השתן שלך (משתנים) או מורידות לחץ דם
- בן 65 שנים או מבוגר יותר

סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה; תופעת לוואי שכיחה)

הרופא שלך יאמר לך כיצד יש לטפל ברמות סוכר נמוכות בדם ומה יש לעשות במידה ואתה סובל מאחד מהתסמינים או הסימנים שלהלן. הרופא עשוי להוריד את מינון האינסולין שלך או תרופות אחרות לסוכרת.

סימנים או תסמינים של רמות סוכר נמוכות בדם עלולים לכלול:

- כאב ראש
- נמנום
- רגזנות

- רעב
 - סחרחורת
 - בלבול
 - הזעה
 - הרגשת עצבנות
 - חולשה
 - דפיקות לב מהירות
- אם אתה מבחין בתופעת לוואי כלשהי המצוינת לעיל, פנה לרופא שלך בהקדם האפשרי.

תופעות לוואי נוספות כוללות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד

- זיהום פטרייתי בנרתיק (פטרית)
- בחילה
- הקאה
- שלשול
- כאב בטן
- חוסר תיאבון

תופעות לוואי שכיחות

- זיהום פטרייתי של הפין
- שינויים במתן שתן, כולל צורך דחוף במתן שתן בתדירות גבוהה יותר, בכמויות גדולות יותר, או בלילה
- צימאון
- גירוד בנרתיק
- שינוי בטעם
- בדיקות דם עלולות להראות שינויים בכמות השתן (אוריה) בדם שלך
- בדיקות דם עלולות להראות שינויים בכמות הכוללת של כולסטרול ובכמות הכולסטרול הרע (נקרא LDL – סוג של שומן בדם שלך)
- בדיקות דם עשויות להראות שינויים בכמות תאי הדם האדומים בדם שלך (נקראים המוגלובין)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להופיע ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000)

- בדיקות דם עלולות להראות שינויים הקשורים לתפקודי כליה (כגון 'קריאטינין')

תופעות לוואי נדירות מאוד

- ירידה ברמות של ויטמין B₁₂. דבר זה עלול לגרום לאנמיה (רמות נמוכות של תאי דם אדומים).
- חריגות בבדיקת תפקודי כבד
- דלקת כבד (בעיה בכבד)
- סרפדת
- אדמומיות בעור
- גירוד

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי", שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: [./https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום בטוח מחוץ להישג ידם ושדה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
 - אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
 - **תנאי אחסון:**
יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל 30°C . יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מפני לחות.
 - אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.
- אין להשתמש בתרופה זו אם האריזה פגומה או יש עליה סימני פתיחה.

6. מידע נוסף

• נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

ליבת הטבליה:

microcrystalline cellulose, povidone, crospovidone, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate.

ציפוי הטבליה:

hypromellose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, iron oxide red, carnauba wax.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

- סגלורומט 2.5/1000 מ"ג הן טבליות מצופות ורודות, 19.1x10.6 מ"מ, בעלות צורה אובלית, מוטבעות ב "2.5/1000" בצד אחד וחלקות בצד השני.
- סגלורומט 7.5/1000 מ"ג הן טבליות מצופות אדומות, 19.05 x 10.57 מ"מ, בעלות צורה אובלית, מוטבעות ב "7.5/1000" בצד אחד וחלקות בצד השני.

גודל האריזות:

סגלורומט זמינה בבליסטרים מסוג Alu/PVC/PA/Alu. גדלי האריזה הם 14, 28, 56, 60, 168, 180 ו-196 טבליות מצופות בבליסטרים לא מחוררים.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

• בעל הרישום וכתובתו:

חברת מרק שארפ ודוהם (ישראל - 1996) בע"מ, ת.ד. 7121 פתח תקווה 49170.

• יצרן:

מרק שארפ ודוהם קורפ., ניו ג'רזי, ארה"ב.

נערך בפברואר 2022 בהתאם להנחיות של משרד הבריאות.

• מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

סגלורומט 2.5/1000 מ"ג: 161-70-35634

סגלורומט 7.5/1000 מ"ג: 161-71-35635

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.