

يجب التوجيه إلى الطبيب فرزاً إذا كنت تعتقد أن هناك حاجة إلى تناول ستيرويدات براوفان، حتى إذا كانت لديك أعراض في المنزل.

• زر الطبيب بشكل ثابت لفحص حالتك.

• إذا كان غير ممكناً بما في ذلك أدوية من دون وصفة طبية.

• توجيه إلى الطبيب إذا عاشرت من توشش الرؤية أو اضطرابات أخرى في الرؤية.

الأطفال والمرأة الحاملون

هذا الدواء غير معتمل لدى الأطفال دون سن 5 سنوات.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية وكمكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

- ديسولفيرايزام (Disulfiram) (Metronidazole)

- ميترونيدازول (Metronidazole)

قد يزيد بعض الأدوية تأثير منشقة كيو-قار، لهذا إذا كنت تتناول هذه الأدوية قد يربط الطبيب في متباينة حالتك بمرخص أكبر [ما في ذلك بعض أدوية الإنزيم (HIV) التي تتضمن: ريتونافير (ritonavir) أو كوبيسينات (cobicistat)]

الحمل، الإرضاع والخصوبة

على استشارة الطبيب قبل تناول الدواء إذا كنت حاماً، تحظين للحمل، أو مرضة.

الوصافة واستعمال الماكينات

ليس هناك تأثير معروف لكيو-قار على القرحة على الساقية أو تشغيل الماكينات.

كيو-قار 100 منشقة معايرة

التركيب

كيو-قار 50

تحتوي كل جرعة معايرة على:

بيكلوميثازون بيدروبيونات 50 مكغ

Beclometasone dipropionate 50 mcg

كيو-قار 100

تحتوي كل جرعة معايرة على:

بيكلوميثازون بيدروبيونات 100 مكغ

Beclometasone dipropionate 100 mcg

المواد غير الفعالة ومبنيات الصيادلة: انظر البند 2 "معلومات مهمة عن

قسم من مركبات الدواء" ، والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل بدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، فنرجوه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وسيف هذا الدواء لعلاج مرض، لا تعطه للأخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك شابه بين تلك الصحبة وحالتهم.

هذا الدواء غير معتمل لدى الأطفال دون سن 5 سنوات.

1. لم أعد هذا الدواء؟

منشقة كيو-قار معدنة لمنع البوء وعلاجه لدى البالغين والأطفال فوق سن 5 سنوات.

المجموعة العلاجية:

كونيكوتريونيدات باليستشان.

منشقة كيو-قار تعمل في النبيتين وتسهل التنفس عبر تقليل الالتهاب، التورم، والتضيق في حجاج التنفس. يُستعمل هذا النوع من الدواء للوقاية، لهذا يجب تناول الدواء بشكل ثابت يومياً، حتى إذا لم تظهر لديك أعراض.

لا توفر هذه المنشقة تخفيفاً فوريّاً في الحال، عليك استعمال منشقة للتخفيف الفوري بالإضافة إلى الاستعمال الثابت لمنشقة كيو-قار.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (ارجحية) للمادة الفعالة (بيكلوميثازون) أو لأي من المركبات الأضافية التي يحتوي عليها الدواء.
- كانت لديك حساسية (ارجحية) لمنشقات شبيهة أخرى.
- كنت تعاني من ساقية متقدمة في المثانة لفجأة. هذه المنشقة لن تساعد. لهذا الهدف، يجب استعمال منشقة كالكوروكول لأسباب كثيرة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

على أن تتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

كيو-قار متوفّر بعيارين، ويحدد الطبيب العيار الأكثر ملاءمة لحالتك.

هذا شعور خفيف وطعم مختلف لهذه المنشقة عن رذاذ ناعم بشكل الذي استعملتها في الماضي. يتحمي هذه المنشقة على رذاذ ناعم بشكل خاص، وهكذا تصل جرعة أكبر إلى النبيتين. لهذا قد يصف الطبيب لك جرعة مختلفة أكثر من المنشقة التي استعملتها في الماضي.

حتى إذا وصف لك الطبيب جرعة متقدمة أكبر، ما زال من الممتنع أن يُطلب منك تناول نفس عدد الاستنشقات كما هو الحال مع المنشقة السابقة.

وذلك لأنّه قد يجري الحديث عن منشقة ذات معابر أقل (أي كل استنشاق من المنشقة يحتوي على مقدار أقل من المنشقة السابقة).

Becлометазон dipropionate

يُعطى لك من شفاف جرعة متقدمة أكبر مما يحصلها عدو في الممتنع أن يُطلب فقط.

لا يجوز تناول استنشادات أكثر مما يوصي لك الطبيب. هناك بعض الحالات التي قد يصف لك الطبيب فيها عدداً أكبر من الاستنشادات.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

منشقة كيو-قار 50

البالغون (ما في ذلك المسنون) والأطفال فوق سن 12 عاماً:

روي طفيف

الجرعة الإبتدائية: استنشاق مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 100 مكغ في اليوم). يمكن الزيادة حتى 4 استنشادات، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 200 مكغ في اليوم).

ريو معتدل

الجرعة الإبتدائية: 4 استنشادات، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 400 مكغ في اليوم). يمكن الزيادة حتى 8 استنشادات، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 800 مكغ في اليوم).

ريو شديد

الجرعة الإبتدائية: 4 استنشادات، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 400 مكغ في اليوم). يمكن الزيادة حتى 16 استنشادات (أي ما مجموعه 800 مكغ في اليوم).

منشقة كيو-قار 100

البالغون (ما في ذلك المسنون) والأطفال فوق سن 12 عاماً:

روي طفيف


الجرعة الإبتدائية: استنشاق واحد، مرة في اليوم (أي ما مجموعه 100 مكغ في اليوم). يمكن الزيادة حتى استنشاق واحد، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 200 مكغ في اليوم).

ريو معتدل


الجرعة الإبتدائية: استنشاق واحد، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 200 مكغ في اليوم). يمكن الزيادة حتى استنشاقين، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 400 مكغ في اليوم).

ريو شديد

الجرعة الإبتدائية: استنشاق، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 400 مكغ في اليوم). يمكن الزيادة حتى 4 استنشادات، مررتين في اليوم (أي ما مجموعه 800 مكغ في اليوم).



1



2



3

الجرعة اليومية الإجمالية القصوى هي ما مجموعه 8 استنشادات (أي 800 مكغ في اليوم).

الأطفال يدعى من سن 5 سنوات وما فوق

ريو طفيف ومتواصل أو درجة حرارة متعدلة: 50 مكغ، مررتين في اليوم.

في حالات خاصة: 100 مكغ، مررتين في اليوم.

الجرعة اليومية القصوى للطفل هي 100 مكغ، مررتين في اليوم. نظرًا لأنه قد تنشأ حاجة إلى استعمال مهابي، يمكن استعمال بعض أنواع المهدبات مع هذا الدواء.

لا يجوزتجاوز الجرعة الموصى بها

ما الذي يجب القيام به إذا كنت تعتقد أن العلاج لا يوثق:

إذا كنت تعتقد أن العلاج لا يوثق، أنت لا تتعاطى العلاج الذي لم تحسن من المنشقة التخفيق الفوري، لا تتساعد المنشقة المتقدمة كما ساعدت من المنشقة التخفيق الفوري، في الماضي أو إذا كان لديك انفاس آخر في ذروة الزفير (peak flow)، فيجب التوجه إلى الطبيب لأن رضا تناقض على ذروة الزفير.

إذا تناولت جرعة مفرطة من الدواء عن طريق الخطأ أو إذا استنشقت طفل كافية من الدواء عن طريق الخطأ، قرفيه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، مصطحباً عبوة الدواء معك.

إذا سببت تناول الدواء في الوقت المحدد، تناول الجرعة التي تم وصفها لك فور تذكرك، إلا إذا كان وقت التناول الإضافي قريباً. لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة تتوافق مع جرعة المنشقة الفورية. بعد ذلك، استمر في استعمال هذا الدواء في أوقات متقطعة كما حدّد الطبيب المعالج. يجب الدامومة على العلاج حتى إذا شعرت بتحسن.

إذا وقفت عن تناول الدواء يجب استعمال هذه المنشقة بشكل ثابت، حتى إذا شعرت جيداً.

يمنع تناول الأدوية في كل الأوقات لتحقيق حقيقة من المصلح على عيادة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع التذكرة الطبية إذا كنت لديك أسلمة إضافية.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

تعليمات الاستعمال

قبل الاستعمال إذا كان لديك المنشقة جيدة أو إذا لم تكون قيد الاستعمال لمدة أسبوعين أو أكثر، يجب خصصها قبل استعمالها عبر إزالة غطاء الفوهة والضغط نحو الأسفل على الحاوية في المنشقة.

حرر ضفظتين في الهواء، بعيداً عنك.


كيفية استعمال المنشقة

إذا كانت المنشقة جيدة أو إذا لم تكون قيد الاستعمال لمدة أسبوعين أو أكثر، يجب خصصها قبل استعمالها عبر إزالة غطاء الفوهة والضغط نحو الأسفل على الحاوية في المنشقة.

حرر ضفظتين في الهواء، بعيداً عنك.

1. ازفر الهواء نحو الخارج قدر المستطاع، ثم أدخل فوراً الفوهة في فمك

مغلقاً ثدييك حولها.



4

ابداً باستنشاق الهواء نحو الداخل ببطء وبعمق عبر فمك، ثم اضغط نحو الأسفل على الحاوية في المنشقة وفق ما يظهر في الرسم. تحرر هذه الخطوة جرعة دواء واحدة. من المهم أن تواصل الاستنشاق حتى بعد تحرير الجرعة.



5

احبس نفسك لمدة 10 ثوانٍ، ثم ازفر نحو الخارج ببطء. إذا أوصى لك الطبيب بتناول أكثر من جرعة واحدة، فكر المراحل 2 حتى 4. بعد الاستعمال، ضع الغطاء على الفوهة.



4

- يصعب على بعض المعالجين الضغط على المنشقة واستنشاق الدواء في الوقت ذاته.

التغلب على هذه المشكلة، يمكن استعمال مهاين (spacer device)، إذا استعملت مهاين، عليك اتباع التعليمات المرفقة به. يمكن للأطيف، المرضة أو المصيلية أن يقدما لك سرحا حول المهاين. بدلاً من ذلك، ينكر الطبيب في أن يصرف لك جهاز Ovar Autohaler يحرر جرعة دواء بشكل تلقائي عندما تستنشق.

- يُكَفِّي مِنْعَلْمَةً مُرْفَعَةً فِيَمَا إِذَا كَانَ جَهازُ كُو-فَارَ خَاصَّكَ فَارِغاً عِنْدَمَا يَصْبِحُ الْجَهازُ فَارِغاً - لَنْ تَنْتَعَرْ أَوْ تَسْمَعَ تَحرِيرَ الدَّوَاءِ.

تعليمات تنظيف الجهاز

الحافظ على النظافة، يجب تنظيف فوهة المنشقة مرة في الأسبوع بقطعة قماش أو منديل ورقى نظيف وجاف. اشطف فك بالماء بعد استعمال المنشقة.

- لا يجوز شطف أو إدخال أي جزء من المنشقة في الماء.

إذا كانت لديك أسلطة بشأن استعمال الدواء، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

تحفيظ الأدوية، قد يُسبِّب استعمال كوفار أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تزعم هذه قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل الآلات الأخرى من أي منها.

إذا شعرت فور استعمال الدواء بصفير أثناء التنفس أو ضغط في الصدر، توقيع عن استعمال الدواء استعمل منشقة للتحفيظ الفوري لتساعدك على التنفس، ثم توجه إلى الطبيب فوراً.

- توقف عن استعمال الدواء فوراً إلى الطبيب أو المستشفى إذا:

• تطور لديك رد فعل تحسسي (تورم الشفتين، الوجه أو الععن) (الذي يسبب صعوبات في التنفس)، فحص أو شرى في الجلد.

يعتبر هذا رد فعل خطير جداً ونادر جداً. يُنصح أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ أو المركوز في المستشفى.

قد يؤدي استعمال الدواء في انتاج الكروتيوكستيرونينات الطبيعية في الجسم. يُنصح أن يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم أحياناً متابعة حاليك.

استمر في استعمال الدواء وتوجه إلى الطبيب فوراً إذا شعرت بسوء، لا سيما في الحالات التالية:

- ألام في البطن

ضعف

- تقيّق

هذا مهم تحديداً إذا كنت معرضاً لحالات ضغط أخرى مثل مرض إضافي، عملية جراحية أو إذا كنت تعاني من عدوى.

قد تظهر الأعراض الجانبية التالية أيضاً لدى مرضى يتناولون الدواء. إذا اخترت أحد هذه الأعراض الجانبية، استمر في استعمال الدواء ولكن توجه إلى الطبيب إذا استمرت لفترة من الزمن أو إذا كانت تثير قلقاً لديك:

أعراض جانبية شائعة (common)

من بين 100 مستعملين

- بحة

صعوبة في البلاع مصحوبة بالآلام في الأنف وتوتر الغدد، الم في الخدود (التهاب الغروم - pharyngitis)

آلام أو فطريات في الفم (بعض بيضاء في الفم والخدود). إن حدوث هذه الأعراض أقل احتمالاً إذا كنت تشرطط فكك ياماً بعد استعمال المنشقة.

قد يُسْفِرُ لكَ الطَّبِيبُ دَوَاءً فِيَهُ حَدُوثُ فَطْرِيَاتِ.

- تغيرات في المذاق

أعراض جانبية ليست شائعة (uncommon)

من مستعملين من بين 1,000

- غثيان

صداع

رقة

دوخة أو شعور بالإغماء

صعوبة في التنفس، زيادة الصفير أثناء التنفس، ضيق في التنفس، سعال (bronchospasm).

تشوش الرؤية

- أعراض جانبية نادرة جداً (very rare)

من مستعملين واحد من بين 10,000

مشكلة العظام

تعكر حسدة العين (كتاراتكت) - يؤدي إلى تشوش الرؤية

فقدان الرؤية بسبب ارتفاع الضغط بشكل شاذ داخل العين.

أعراض جانبية ونيرة انتشارها غير معروفة (أعراض لم يحدَّد شيوعاً بعد)

مشكلات في الفم، اكتئاب أو شعور بالقلق، عدم الارتياب، عصبية، توتر

مفرط أو عصبية. هذه الأعراض منتشرة أكثر لدى الأطفال.

قد يعاني الأطفال والمراهقون الذين يستعملون الدواء لفتراتٍ زمنية طويلة من

تأخر في النمو. وقد يراقب الطبيب طول ابنك.

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت

من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالآعراض الجانبية عبر الضغط على رابط

"إبلاغ عن الأعراض الجانبية بحسب العلاج الدوائي".

الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة il (www.health.gov.il)

يوجِّهُكُ إلى استمارَة على الانترنت لتقديم إبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر

الدخول إلى الرابط: il <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخَرِّنُ الدَّوَاءُ؟

تجثب الشفتي! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وكذلك تختبئ الشفتي. لا يُشَبِّهُ التقويُّون تعليمات صرية من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر

على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25°C.

يجب منع التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الحر.

يمنع التجميد.
الحاديجة موجودة في طروف ضغط ولا يجوز تقبيها أو حرقها حتى إذا كانت تبدو فارغة.

يمنع الناخص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات المنزلية. إذا قرر الطبيب إيقاف العلاج يجب إعادة الحاجة إلى الطبيب أو الصيدلي للتخلص الآمن من المنتج. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على: Norflurane (Propellant 134A), ethanol

كيف يبدو الدواء وما هي عبوة

منطقة كيو-فار هي عبارة عن حاجية البوتاسيوم مغلفة مع مصفاة وصمم قياس

وينطبق على حملون عدم اللون.

تزداد المنشقة 200 جرام.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه

تفع اسرائيل م.رض،

شارع دفرا فيينا 124، تل أبيب 6944020.

اسم المنتج وعنوانه

Kindeva Drug Delivery Limited, Derby Road, Loughborough, Leicestershire U.K.

تم تحرير النشرة في تشرين الثاني 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

كيو-فار 50 منشقة معابرية: 139.28.30660

كيو-فار 100 منشقة معابرية: 139.29.30661

تبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لبناء كل الجنسيين.