

Важная контактная информация

Имя врача-специалиста

Номер телефона

Номер телефона в нерабочие часы

Мое имя

Мой номер телефона

Имя контактного лица для экстренных случаев

Телефон контактного лица для экстренных случаев

Карточка и ее содержание были одобрены Министерством здравоохранения в октябре 2021 года
NX-IL-DST-CRD-210001

Карточка пациента

Джемперли (Jemperli – достарлимаб)

Важная информация о безопасности, призванная снизить риск побочных эффектов, связанных с иммунной системой

Джемперли может вызвать побочные эффекты, которые могут быть тяжелыми или опасными для жизни и даже привести к смерти. Побочные эффекты могут развиваться в любое время в ходе лечения или после того, как оно будет завершено. Побочные эффекты могут затрагивать более одного органа одновременно.

Незамедлительно свяжитесь со своим лечащим специалистом, если у Вас появится один из симптомов, указанных в данной карточке, либо не указанные здесь симптомы, или если уже имеющиеся симптомы усугубятся. **Своевременно оказанная врачебная помощь может предотвратить осложнения.** Ваш врач может предоставить Вам другие лекарства для лечения симптомов, отложить прием следующей дозы препарата **Джемперли** или прекратить лечение им.

Дополнительную информацию Вы можете найти в инструкции по применению лекарственного препарата, которая доступна по ссылке <https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug> Или свяжитесь со своим врачом

Важно

- Нельзя диагностировать или лечить побочные эффекты самостоятельно.
- **Всегда носите данную карточку при себе**, в том числе, во время поездки, при обращении в приемное отделение больницы или в неотложную помощь, или при посещении другого врача.
- Храните данную карточку на протяжении не менее 4 месяцев после приема последней дозы препарата **Джемперли**.
- Уведомите медперсонал, который занимается Вашим лечением, что Вы проходите лечение препаратом **Джемперли**, и покажите им эту карточку.

Свяжитесь с лечащим персоналом онкологии, если у Вас имеют место какие-либо симптомы или признаки из списка ниже, либо другие симптомы/ признаки, или если уже имеющиеся симптомы усугубляются

Легкие

- Одышка
- Боль в груди
- Кашель, которого раньше не было, или который стал хуже

Кишечник

- Диарея или более интенсивная перистальтика кишечника
- ерный, темный, липкий стул; стул с кровью или слизью
- Острая боль или дискомфорт в животе
- Недомогание или дурнота (тошнота или рвота)

Печень

- Недомогание или дурнота (тошнота или рвота)
- Потеря аппетита
- Боль с правой стороны живота
- Пожелтение кожи или белков глаз
- Моча темного цвета
- Склонность к кровотечениям или к образованию подкожных кровоподтеков

Гормональные железы

- Учащенное сердцебиение
- Потеря или набор веса
- Усиленное потоотделение
- Выпадение волос
- Озноб
- Запор
- Боли в животе
- Понижение тона голоса
- Мышечные боли
- Головокружения или обмороки
- Непреходящая или непривычная головная боль

Почки

- Изменение объема или цвета мочи
- Отек лодыжек
- Потеря аппетита
- Кровь в моче

Кожа

- Сыпь, зуд, шелушение или раны на коже
- Язвы во рту, в носу, в горле или на гениталиях

Глаза

- Изменения в зрении

Другие органы

- Острая или непреодолимая боль в мышцах или суставах
- Сильная мышечная слабость
- Отекшие или холодные руки или ноги

Это не все побочные эффекты препарата **Джемперли**. Если Вы испытываете какой-либо побочный эффект, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это относится и к побочным эффектам, не указанным в инструкции, которая прилагается к упаковке.

О побочных эффектах можно сообщить в Министерство здравоохранения при помощи ссылки на «Сообщения о побочных эффектах лекарственных препаратов» на домашней странице Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), которая переведет Вас на онлайн-форму для сообщения о побочных эффектах, или зайдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>.

О побочных эффектах следует также сообщать компании GSK на адрес il.safety@gsk.com. Сообщив о побочных эффектах, Вы сможете собрать больше информации о безопасности данного препарата.

Важная информация для лечащего медперсонала

Данный пациент проходит лечение препаратом **Jemperli**, который может вызвать побочные эффекты, вызванные реакцией иммунной системой. Такие побочные эффекты могут возникнуть как во время лечения, так и в любой момент после него. Побочные эффекты, связанные с иммунной системой, могут развиваться в любом органе и любой ткани, и они могут затрагивать более одной системы организма одновременно. Следует проверять у пациента наличие симптомов и признаков побочных эффектов, связанных с иммунной системой, включая явления, указанные в данной карточке, но не только. Своевременная диагностика и правильное лечение жизненно важны для снижения возможных последствий побочных эффектов со стороны иммунной системы.

В случае подозрения на побочные эффекты с вовлечением иммунной системы следует убедиться, что была проведена соответствующая оценка для подтверждения фактора, вызвавшего побочный эффект, или исключения других причин. В зависимости от степени тяжести побочного эффекта, следует отложить лечение **Jemperli** или полностью прекратить его и выписать пациенту кортикостероиды или другое подходящее лечение.

Особые указания в отношении лечения побочных эффектов с вовлечением иммунной системы приведены во врачебной инструкции по применению препарата **Jemperli**.

Консультация с онкологом или другим врачом-специалистом также может содействовать успешному лечению побочных эффектов, связанных с иммунной системой.

Дополнительную информацию Вы можете найти в инструкции по применению лекарственного препарата, доступной по ссылке <https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug> Или свяжитесь со своим врачом