

מידע חשוב ליצירת קשר

שם הרופא המומחה

מספר טלפון

מספר טלפון לאחר שעות העבודה

שמי

מספר הטלפון שלי

שם איש הקשר למצב חירום

איש הקשר למצב חירום (מספר טלפון)

כרטיס למטופל

ג'מפרלי (דוסטארלימאב dostarlimab)

מידע בטיחותי חשוב להפחתת הסיכון לתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון

ג'מפרלי עשויה לגרום לתופעות לוואי אשר עלולות לעיתים להיות חמורות או מסכנות חיים ואף לגרום למוות. תופעות לוואי עלולות להתרחש בכל זמן שהוא במהלך הטיפול או לאחר סיום הטיפול. אתה עלול לחוות תופעות לוואי ביותר מאיבר אחד בגופך באותו הזמן.

צור קשר עם הרופא המומחה שלך מייד אם יש לך אחד מהתסמינים הרשומים, או תסמינים כלשהם שאינם רשומים בכרטיס זה, או אם התסמינים מחמירים. **טיפול רפואי מהיר יכול למנוע מהבעיה להפוך לחמורה יותר.** הרופא שלך עשוי לתת תרופות אחרות לטיפול בתסמינים, להשהות את מתן המנה הבאה של **ג'מפרלי** או להפסיק את הטיפול.

למידע נוסף, עיין בעלון לצרכן הנמצא בקישור

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug>

או צור קשר עם הרופא שלך

חשוב

- אין לנסות לאבחן או לטפל בתופעות הלוואי בעצמך
- **שמור כרטיס זה איתך בכל עת**, כולל בזמן נסיעה, פניה לחדר מיון או מוקד חרום, או ביקור אצל רופא אחר
- שמור כרטיס זה לפחות 4 חודשים לאחר המנה האחרונה של **ג'מפרלי**
- יש ליידיע את אנשי הצוות הרפואי שאתה רואה כי אתה מטופל ב**ג'מפרלי** ולהראות להם כרטיס זה

יש להתקשר לצוות הטיפול האונקולוגי אם יש לך סימנים או תסמינים כלשהם מהרשימה הבאה, או תסמינים/סימנים אחרים, או במידה והתסמינים/סימנים מחמירים.

ריאות

- קוצר נשימה
- כאב בחזה
- שיעול חדש או שמחמיר

מעיים

- שלשול או תנועות מעיים תכופות יותר
- צואה שחורה, כהה, דביקה; צואה המכילה דם או ריר
- כאב בטן חמור או רגישות
- הרגשת או תחושת חולי (בחילה או הקאה)

כבד

- הרגשת או תחושת חולי (בחילה או הקאה)
- איבוד תיאבון
- כאב בצד ימין של הבטן
- הצהבת העור או לובן העיניים
- שתי בצבע כהה
- היווצרות דימום או חבלה בקלות רבה יותר מהרגיל

בלוטות הורמונליות

- דפיקות לב מהירות
- איבוד או עלייה במשקל
- הזעה מוגברת
- איבוד שיער
- הרגשת קור
- עצירות
- כאב בטן
- שינוי הקול לעמוק יותר
- כאבי שרירים
- סחרחורת או עילפון
- כאב ראש תמידי או לא רגיל

כליות

- שינויים בכמות או צבע השתן
- קרסוליים נפוחים
- איבוד תיאבון
- דם בשתן

עור

- פריחה, גירוד, קילוף או פצע עור
- כיבים בפה, אף, גרון או אברי המין

עיניים

- שינויים בראייה

איברים אחרים

- כאבים חמורים או תמידיים בשרירים או במפרקים
- חולשת שרירים חמורה
- ידיים או רגליים נפוחות או קרות

אלו אינן תופעות הלוואי היחידות של **ג'מפרלי**. אם אתה חווה תופעות לוואי כלשהן, שוחח עם הרופא שלך, רוקח או אחות. זה כולל תופעות לוואי אשר אינן מצוינות בעלון האריזה.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

יש לדווח על תופעות לוואי גם ל- GSK בכתובת המייל il.safety@gsk.com באמצעות דיווח על תופעות לוואי, תוכל לסייע באספקת מידע נוסף על בטיחות תרופה זו.

מידע חשוב לצוות הרפואי המטפל

מטופל זה מקבל **ג'מפרלי** אשר עלולה לגרום לתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון אשר עלולות להופיע בכל זמן במהלך הטיפול או אחריו. תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון יכולות להופיע בכל איבר או רקמה ויכולות להשפיע על יותר ממערכת אחת בגוף בו זמנית. יש לבדוק אצל המטופלים סימנים ותסמינים של תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון כולל תופעות המצוינות, בכרטיס זה, אך לא רק. אבחון מוקדם וטיפול נכון הינם חיוניים כדי להקטין השלכות כלשהן של תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון.

במקרה של חשד לתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון, יש לוודא שנעשתה הערכה מתאימה לאישור הגורם לתופעה או לשלילת סיבות אחרות. בהתאם לרמת החומרה של תופעת הלוואי, יש להשהות מתן **ג'מפרלי** או להפסיק לצמיתות, ולתת קורטיקוסטרואידים או טיפול מתאים אחר.

הנחיות מיוחדות לטיפול בתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון נמצאות בעלון לרופא של **ג'מפרלי**. התייעצות עם אונקולוג או מומחה רפואי אחר ייתכן ותיסייע בטיפול בתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון.

למידע נוסף, עיין בעלון לצרכן הנמצא בקישור

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

או צור קשר עם הרופא שלך