

معلومات هامة للتواصل

اسم الطبيب المُختص

رقم الهاتف

رقم الهاتف بعد ساعات العمل

اسمي

رقم هاتفني

اسم جهة الإتصال في حالة الطوارئ

جهة الإتصال في حالة الطوارئ (رقم الهاتف)

NX-IL-DST-CRD-210001

تمت المصادقة على البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة في تشرين الأول

بطاقة للمتعالج

جيميبرلي (دوستارليماب dostarlimab)

معلومات هامة حول السلامة لتقليل خطورة حدوث أعراض جانبية مرتبطة بجهاز المناعة

قد يسبب جيميبرلي أعراضاً جانبية التي من شأنها أن تكون في بعض الأحيان خطيرة أو تشكل خطراً على الحياة بل تؤدي إلى الوفاة. قد تحدث الأعراض الجانبية في أي وقت كان أثناء العلاج أو بعد إنتهاء العلاج. قد تقاسي من أعراض جانبية في أكثر من عضو واحد في جسمك في نفس الوقت.

إتصل بطبيبك المُختص على الفور إذا وُجد لديك أحد الأعراض المذكورة، أو أي أعراض غير مدرجة في هذه البطاقة، أو في حال تفاقم الأعراض. يمكن لعلاج طبي عاجل أن يمنع من أن تصبح المشكلة أكثر خطورة. قد يصف لك طبيبك أدوية أخرى لعلاج الأعراض، تعليق إعطاء المقدار الدوائي التالي من جيميبرلي أو إيقاف العلاج.

لمعلومات إضافية، إقرأ بتمعن نشرة المستهلك الموجودة في الرابط

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug>

أو اتصل بطبيبك.

هام

- لا تحاول تشخيص أو علاج الأعراض الجانبية بنفسك
- إحتفظ بهذه البطاقة بحوزتك في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء السفر، التوجه إلى غرفة الطوارئ أو مركز الطوارئ، أو زيارة طبيب آخر
- إحتفظ بهذه البطاقة لمدة 4 أشهر على الأقل بعد آخر مقدار دوائي من جيميبرلي
- يجب إخبار أفراد الطاقم الطبي أنك ترى بأنك مُعالج بـ جيميبرلي وأرهم هذه البطاقة

يجب الإتصال بطاقم علاج الأورام إذا كان لديك أي علامات أو أعراض من القائمة التالية، أو أعراض/علامات أخرى، أو في حال تفاقمت الأعراض/العلامات.

معلومات هامة للطاقم الطبي المعالج

يتلقى هذا المتعالج جيمبيرلي الذي قد يتسبب في حدوث أعراض جانبية مرتبطة بجهاز المناعة والتي قد تظهر في أي وقت أثناء العلاج أو بعده. يمكن أن تحدث الأعراض الجانبية المرتبطة بجهاز المناعة في أي عضو أو نسيج ويمكن أن تؤثر على أكثر من جهاز واحد في الجسم في نفس الوقت. يجب الإستيضاح لدى المتعالجين عن علامات وأعراض لأعراض جانبية مرتبطة بجهاز المناعة بما في ذلك الأعراض المذكورة، في هذه البطاقة، ولكن ليس فقط. إن التشخيص المُبكر والعلاج المناسب ضروريان لتقليل أي عواقب للأعراض الجانبية المرتبطة بجهاز المناعة.

في حالة الشك لوجود أعراض جانبية مرتبطة بجهاز المناعة، يجب التأكد من إجراء التقييم المناسب لتأكيد سبب العرض أو استبعاد أسباب أخرى. وفقاً لشدة العرض الجانبي، يجب تعليق إعطاء جيمبيرلي أو إيقافه بشكل دائم، وإعطاء كورتيكوستيروئيدات أو علاج مناسب آخر. تتوفر إرشادات خاصة لعلاج الأعراض الجانبية المرتبطة بجهاز المناعة في نشرة جيمبيرلي للطبيب.

من الجائز أن تساعد إستشارة طبيب الأورام أو مُختص طبي آخر في علاج الأعراض الجانبية المرتبطة بجهاز المناعة.

الكلّي

- تغييرات في كمية أو لون البول
- إنتفاخ في الكاحلين
- فقدان الشهية للطعام
- دم في البول

الجلد

- طفح، حكة، تقشّر أو تقرحات جلدية
- تقرحات في الفم، الأنف، الحنجرة أو الأعضاء التناسلية
- لعينين
- تغييرات في الرؤية

الأعضاء الأخرى

- الآم شديدة أو مستمرة في العضلات أو المفاصل
- ضعف شديد في العضلات
- إنتفاخ أو برودة في اليدين أو القدمين

هذه ليست الأعراض الجانبية الوحيدة لجيمبيرلي. إذا كنت تقاسي من أي أعراض جانبية، فتحدث إلى طبيبك، الصيدلي أو الممرضة. يشمل ذلك الأعراض الجانبية غير المذكورة في نشرة العلبة. بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

يجب التبليغ عن الأعراض الجانبية أيضاً لـ

GSK عبر البريد الإلكتروني بعنوان

il.safety@gsk.com

من خلال التبليغ عن الأعراض الجانبية، يمكنك

المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول

سلامة هذا الدواء.

الرتئين

- ضيق في التنفس
- ألم في الصدر
- سعال جديد أو يتفاقم

الأمعاء

- إسهال أو حركات منكرة أكثر في الأمعاء
- براز أسود، داكن، لزج؛ لزج؛ براز يحتوي على دم أو مخاط
- ألم بطني شديد أو حساسية (التألم باللمس)
- شعور أو إحساس بتوسع (غثيان أو تقيؤ)

الكبد

- شعور أو إحساس بتوسعك (غثيان أو تقيؤ)
- فقدان الشهية للطعام
- ألم في الجانب الأيمن من البطن
- إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين
- بول بلون داكن
- حدوث نرف أو كدمة بسهولة أكبر من المعتاد

الغدد الهرمونية

- ضربات قلب سريعة
- فقدان أو زيادة في الوزن
- زيادة التعرق
- تساقط شعر
- الشعور بالبرد
- إمساك
- ألم في البطن
- تغيير الصوت ليصبح أكثر عمقا
- الآم العضلات
- دوام أو إغماء
- صداع مستمر أو غير عادي

لمعلومات إضافية، اقرأ بتمعن نشرة المستهلك الموجودة في الرابط

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

أو اتصل بطبيبك.