

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة  
مستحضرات - 1986  
سوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

## أريپلی 5، 10، 15، 30، أقراص

التركيب:

أريپلی 5: يحتوي كل قرص على:

أبيبيرازول 5 ملغ

أريپلی 10: يحتوي كل قرص على:

أبيبيرازول 10 ملغ

أريپلی 15: يحتوي كل قرص على:

أبيبيرازول 15 ملغ

أريپلی 30: يحتوي كل قرص على:

أبيبيرازول 30 ملغ

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر - انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بانتهائها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أستة

إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرض، لا ينطوي للآخرين. فهو قد يضر بهم حتى

ولو بدا لك أن المظهر الطبي مشابه لحالتك.

إن المتعالجين المستعينين الذين يعانون من الذهان المتعلق بالخرف والذين يخضعون للعلاج بأدوية مضادة للذهان معروضون خطورة أكبر لحوادث وفاة. أريپلی غير مخصوص لعلاج الخرف المتعلق بالذهان.

ترفع ضادات الإكتئاب من الخطورة لحوادث إنتحار لدى الأطفال،

المرأهقين والشباب حتى عمر 25 سنة.

مع بداية العلاج بالدواء، يتوجب على المتعالجين من كافة الأعمار وأقربائهم،

متابعة التغيرات السلوكية خاصة، إنفاق الإكتئاب، أفكار إنتحارية، عوانيّة

وما شابه أنظر الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء".

### 1) لأي غرض مخصوص الدواء؟

أريپلی 10، 15، 30 مخصوص:

لعلاج إنفصام الشخصية.

لعلاج حالات الهرس بدروجة شدة متوسطة حتى شديدة، في إطار مرض

ثانوي القطب نوع 1 ولمنع نوبات هوسية جديدة لدى متعالجين مرضهم

الأساسي نوبات هوسية وإنجذبوا نوبات هوسية سائية استجابت في

الاضطرار لعلاج بالدواء.

إضافة لذلك، فإن أريپلی 5، 10، 15، 30 مخصصة:

لعلاج متعدد بالإكتئاب السريري major depressive disorder (MDD) لدى متعالجين كانت لديهم استجابة جزئية للعلاج بمضادات

الاكتئاب.

لعلاج عدم الددو المتعلق بإضطراب التوحد (autistic disorder) لدى

الأطفال (باعمر 6-17 سنة).

الفضيلة العالجية: من مضادات الذهان اللانمطية.

### 2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كثت حساساً (أليسجي) لل المادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات

الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج - أريپلی، إحدى للطبيب إذا:

• كثت في فترة الحمل أو تخطيطين للحمل، مرضة أو تخطيطين للإراضع.

• كثت تعاني من نسبة مرتفعة من السكر في الدم (التي تتميز بأعراض

مثل عطش متزايد، كثرة التبول، زيادة في الشهية للطعام وضعف)

واسقة ظاهلة للسكري.

• كثت تعاني من نوبات صرعية (اختلالات).

• كثت تعاني من حرارات عضلية خارجة عن السيطرة وغير منتظمة.

إذا كنت في الثالث الثالث من حملك وتناولت الدواء، عليك أن تعلمي بأن الأعراض التالية قد تظهر لدى الرضيع مبكرة عند ولادته: رغفان، تصلب/ إرتخاء عضلات، ميل للنوم، عصبية، صعوبات في التنفس وصعوبات في إطعام الرضيع.

إذا كان ضيقك يعني من إحدى هذه الأعراض - توجه إلى الطبيب حالاً. استعمال أريپلی خلال فترة الرضاعة يجب إستشارة طبيبكخصوص المقادير مقابل الأعراض الجانبية لدى المولود عند تناول أريپليرازول خلال فترة الرضاعة. استشيري الطبيب حول الطريقة الأفضل لإطعام ضيقك عند تناولك - أريپلی.

**السيارة وإستعمال الماكينات**  
إن استعمال هذا الدواء قد يضعف البقطة ولذلك لا يجوز السياقة أو تشغل ماكينات خطيرة أو إجراء أعمال تقنيّة إبداء المقاطلة إلى أن تعرف مدى تأثير الدواء عليك.

بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقارب من الشاشة.

**تحذيرات إستعمال الدواء؟**  
يجب فرط الدافع أو التجفاف. تجنب النشاط البدني المجهد أكثر مما ينبغي. في المقص الحار، أمكنك في مكان بارد إذا أمكن. تجنب التعرض للنمس، لا ترت ملابس أكثر مما ينبغي وملابس سميكة. عليك الإكثار من شرب الماء، معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوه أرقام أريپلی على لكتور.  
إذا قيل من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريرات معينة، تواصل مع طبيبك قبل تناول هذا المستحضر الطبي (انظر أيضًا الفقرة 6 "معلومات إضافية").

### (3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائمًا.  
عليك الإستياضار من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة والطريقة العلاجية بالمستحضر.

**الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:**

**الكميات:**  
إنفصام الشخصية ومرض ثنائي القطب: الجرعة الدوائية الإعتيادية للكمار هي 15 ملغ مرة في اليوم. ولكن، يمكن للطبيب أن يصف لك جرعة دوائية أقل أو أكبر، حتى حد أقصى قدره 30 ملغ مرة في اليوم.

جرعات مركبة الإكتئاب السريري: الجرعة الدوائية الإعتيادية هي 2.5 حتى 5 ملغ في اليوم.

من شأن الطبيب أن يرفع الجرعة الدوائية تدريجياً، إذا دعت الحاجة. علاج عدم الهدوء المتعلق بإضطرابات التوحد لدى الأطفال: الجرعة الدوائية الإعتيادية هي 2.5 حتى 5 ملغ في اليوم. يرفع الطبيب الجرعة الدوائية بالترديج إلى 15 حتى 30 ملغ للاليوم، حسب الاستجابة الشخصية للدواء.

إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أقوى من اللازم أو أضعف من الدائم، استشر الطبيب أو الصيدلي.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يجب بلع الدواء مع الماء. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص. أريپلی 5 - عند الحاجة بامكان شطر القرص للإستعمال الفوري.

أريپلی 10، أريپلی 15، أريپلی 30 - لا يجوز شطر القرص.

حاول تناول الدواء في أوقات محددة كل يوم.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر مما ينبغي من أريپلی

أعراض جانبية بلغ عنها عند تناول جرعة دوائية مفرطة من أريپلی تشمل: تقيّبات، ميل للنوم ورجفان.

أعراض جانبية إضافية بلغ منها تشمل: ترکيز مرتفع للحمض في الدم (acidosis)؛ عدوانية؛ إرتفاع في تركيز الإنزيم ايسيراتات أمينو ترانسفيراز (AST) في الدم الذي يدل على تضرر غشاء القلب أو الكبد؛ رغفان أدنبي؛ نبض بطيء (bradycardia)؛ سبات. إرتياط: إختلالات: إرتفاع في تركيز الإنزيم كرباتين فوسفوكيانا (CPK) الذي يدل على تضرر العضل بما في ذلك عضلة القلب؛ تدلي الوعي؛ إرتفاع أو إنخفاض في ضغط الدم.

إنخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم (hypokalemia)، إطالة مقطعة QT، إطالة مقدار QRS، إنهاres الرثتين جراء إستنشاق لا ارادى لطعام إلى القصبة الهوائية، إنقطاع النفس، إختلالات متكررة بدون العودة لحالة

• كنت تعاني من أمراض قلبية وعائية (قلب وأوعية دموية)، سابقة عائلية لأمراض قلبية وعائية.

• أصبحت بسكتة دماغية أو سكتة دماغية "صفيرية".

• عانيت في الماضي من الإدمان على القمار.

• طرأ مخزراً زيادة بالوزن، صعوبات في النبع أو أعراض حساسية، حرّكات لا إرادية، ميل للنوم الذي يعيق من النشاطات اليومية.

• كنت مريضاً مسناً عاجي من خرف (فقدانذاكرة وقدرات ذهنية أخرى)، عليك أو على المعالج الخاص بك إبلاغ طبيبك إذا حدث لديك سكتة دماغية أو سكتة دماغية "صفيرية".

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من إكتاب.

• كنت تعاني من إضطراب ثانوي القطب.

• لديك نسبة شحوم مرتفعة في الدم.

• كنت تعاني من إنخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم.

• لديك ساقية لسوقوطات أو تعاني من أمراض أو تناول أدوية يمكن أن تؤدي إلى الشلل.

• عانيت من نفس في كريات الدم البيضاء أو قلة العدالت نتيجة تناول أدوية، من حيث أن يرجع طبيبك في أن يجري لك فحوص دم شاملة.

• كنت تمارس نشاط بدني مجهد، تتعرّض لحرارة مرتفعة، تعاني من تجفيف أو إنتفاخ يشكّل دائمًا ماءً ذات مفعول مضاد للكلorين.

• يجب إبلاغ الطبيب بشكل فوري إذا وجدت لديك أفكار إنتحارية أو أفكار لإيذاء نفسك (أنظر تحذيرات قبل إستعمال الدواء). "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" لا يجوز للطبيب إلقاء في هذه الفقرة في هذه الفحوص.

لا يجوز إستعمال المستحضر لغاية تختلف عن تلك التي وصف من أجلها.

**الأطفال والمرأهقون**  
هذا الدواء غير مخصوص للإكتئاب لدى أطفال ومرأهقين دون عمر 6 سنوات.

تزيد مضادات الإكتئاب من خطورة حدوث أفكار إنتحارية لدى الأطفال، المراهقين والشباب. يجب التتابعة عن تأثيرات المرض على النشرة.

**الفحوص والمتابعة**

من الجائز حدوث إنخفاض في ضغط الدم خلال فترة العلاج بـ أريپلی، وبالتالي يجب أن تخضع لمتابعة طبية، وأن تجري فحوص دم منتظمة.

كما أنه، من الجائز أن يتم توجيهك من قبل الطبيب إلى إجراء فحوص دم بغرض المتابعة.

**التداللات/التفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت موهرًا، أو دوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات أخرى، إحدى أخرى بما في ذلك أدوية

دون وصفة طبية وأضافات أخرى، إحدى أخرى بما في ذلك أدوية أخرى بما في ذلك، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

أدوية العلاج إرتفاع ضغط الدم - قد يزيد أريپلی من تأثير هذه الأدوية.

إذا كنت تناولت، أو إذا تناولت موهرًا، إحدى أخرى بما في ذلك أدوية

دون وصفة طبية وأضافات أخرى، إحدى أخرى بما في ذلك أدوية

أدوية العلاج إرتفاع ضغط الدم - قد يزيد أريپلی من تأثير هذه الأدوية.

أدوية العلاج الغفتر - إيتراكونازول (Itraconazole).

• مضادات حيوانية - كلاريتريوميسين (Clarithromycin).

• أدوية لإضطرابات في نظم القلب - كينيدين (Quinidine).

• أدوية مضادة للإكتئاب (SSRIs) - فلوأوكسيتين (Paroxetine).

الأدوية التالية قد تقلل من تأثير أريپلی:

• أدوية لعلاج الغفتر - كارمازانازول (Carbamazepine).

• مضاد حيواني لعلاج السلس - ريفامپيسين (Rifampicin).

• أدوية للحد على النوم - بينزوديازيبينات مثل: لورازاپام (Lorazepam).

**استعمال الدواء والطعام**

بإمكانك تناول الدواء مع أو بدون طعام.

**استعمال الدواء واستهلاكه الكحولي**

لا يجوز شرب الكحول أو مشروبات كحولية خلال فترة العلاج بالدواء.

**الحمل والإرضاخ والخصوبة**

لا تستعمل الدواء إذا كنت تخططين للحمل أو إذا كنت حاملة، إلا إذا استشرت

طبيبك وتناشت معه بالخطورة المرتبطة بالحمل، مرضة أو تخططين للإراضع.

إستخدام هذا الدواء قد يؤثر على الوضع العام لرمضيتك.

عليك إبلاغ الطبيب حالاً إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنك أصبحت حاملة أو إذا كنت تخططين للحمل.

لا تتوقي عن العلاج من تقاء نفسك بل يستشيري الطبيب.



#### التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> بالإضافة لذلك، بالإمكان تبلغ شركة "يونيفارم مرض".

#### ٥ كثافة تخزين الدواء؟

تجنب التسمم؛ يجب حفظ هذه الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجالب ذئبة الأطفال / أو الرضع وذلك تفادياً إصافتهم بالتسنم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

#### ٦ معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose; Lactose monohydrate; Maize starch; Hydroxypropyl cellulose; Magnesium stearate; Iron oxide yellow.

يحتوي كل قرص من أربيبلي ٥ على 26 ملخ لكتوز.

يحتوي كل قرص من أربيبلي ١٠ على 52 ملخ لكتوز.

يحتوي كل قرص من أربيبلي ١٥ على 78 ملخ لكتوز.

يحتوي كل قرص من أربيبلي ٣٠ على 156 ملخ لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو حتى العلبة:

أربيبلي معبأ ضمن لوبيات (بليستر) التي يتم إدخالها إلى علبة كرتون. في كل علبة من أربيبلي ٥ يوجد ٥-٧-١٤-٢٠-٢٤-٣٠ قرصاً. في كل علبة من أربيبلي ١٠، أربيبلي ١٥ وأربيبلي ٣٠ يوجد ٥-٧-١٤-٢٠-٢٤-٣٠ قرصاً.

من الجائز أن تستهلك كافه أحجام العلبة. أربيبلي أربيبلي مسندتوري، محدبة من كل الجانبين ولونها أصفر فاتح. أرباص أربيبلي ٥ هي ذات خط للشطر من جانب واحد.

اسم صاحب الإنتشار وعنوانه: يونيفارم م.ض.، ص.ب. 21429، تل-أبيب، 6121301.

اسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.، بارك المصنعة "ماقو كرمل".

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

أربيبلي ٥: 149 02 33528 01

أربيبلي ١٠: 149 03 33529 01

أربيبلي ١٥: 149 04 33574 01

أربيبلي ٣٠: 149 97 33891 01

تم إعدادها في تموز ٢٠٢١ بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.

على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

٦ عدوانية: فقدان الرغبة الجنسية؛ هلوسة؛ عجز جنسي.

٧ إحتقان في الأنف؛ ضيق في التنفس.

٨ طفح في الجلد؛ إرتفاع تعرق؛ حكة؛ تساقط الشعر؛ حساسية للضوء.

٩ إختناق حاد في ضغط الدم عند الانتقال المفاجئ من وضعية الاستقاء

أو الجلوس إلى الوقوف (Orthostatic hypotension)

إلى دوار وإلى إغماء.

١٠ إختناق أو إرتفاع في ضغط الدم.

**اعراض جانبية نادرة (اعراض تظهر لدى ١-١٠ مستعملين من بين ١٠.٠٠٠):**

١١ إختناق نسبة الصفيحات في الدم (Thrombocytopenia).

١٢ فرقة أذينية: إقطاع التنفس؛ احصار أذيني بطيء، رجفان أذيني؛ نوبة صدرية (angina pectoris)؛ جريان غير كاف للدم إلى عضلة القلب (اقفار عصلة القلب)؛ نوبة قلبية؛ فشل قلبي.

١٣ إرتفاع حرارة جسم (heat stroke).

١٤ إرتفاع نسبه البروتكتين، البويريا، البيبروبين أو الكرياتينين في الدم؛ إطالة مقلعل QT: إرتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم (A1C).

١٥ إختناق نسبة البوتاسيوم في الدم (hypokalemia).

١٦ تفكك خلايا المضل (انحلال الخلايا المضلطة)؛ إختناق القدرة على

الحركة (akinesia)؛ شلل في العضل الذي يستمر جزء من الثانية ويعود إلى حرارة لا إرادية حادة، قصيرة ومتقطعة جداً (myoclonus)؛ تصرر التنسيق (التنسيق العصبي العضلي)؛ إضطرابات في النطق؛ اختلالات.

١٧ زياده في الرغبة الجنسيه؛ عدم القدرة على بلوغ ذروه الإثارة الجنسيه.

١٨ ظلقات؛ اشكار إنتحاريه؛ عدم الإستجابة للمحيط (catatonias)؛ المشي خلال النوم.

١٩ إحباط البول؛ التبول اليابي.

٢٠ ضخم الشينين (انحلال الخلايا المضل)؛ عدم انتظام الطمث؛ غياب أو إرتفاع رالطثم.

٢١ أعراض جانبية شيعوها غير معروفة (أعراض شيعوها لم يحدد بعد):

٢٢ إرتفاع نسبة الشحوم في الدم (dyslipidemia)؛ إرتفاع في الوزن.

٢٣ عدم السيطرة على الداوه عند تناول أربيبيلوزول، خاصة القمار القسري.

٢٤ تغيرات في نسبة خلايا دم معينة (leukopenia)؛ انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء؛ neutropenia –

٢٥ إختلالات.

٢٦ ضعف القدرة على إتخاذ الأحكام؛ القدرة العقلية أو القدرات الحركية؛ إنهاء وعدم القدرة على التواصل.

٢٧ صعوبة في تنظيم درجة حرارة الجسم أو دفع مفترط.

٢٨ خطرة لإنهاء الرئتين.

٢٩ لدى المتعالجين المسنين الذين يعانون من خرف بلغ عن حالات أكثر لوفاة خلال الملاج بالداوه. بالإضافة لذلك بلغ عن حالات سكتة أو سكتة "صغرى".

٣٠ أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال والمراهقين غالبية الأعراض الجانبية التي لوحظت لدى الأطفال بأعمار ٦-١٨ سنة، لوحظت لدى الكبار أيضًا.

٣١ أعراض جانبية شائعة - إرتفاع في نسبة الإنسولين في الدم: سلس بولي (خلال الليل)؛ تعاس؛ صداع؛ تقيؤات؛ إرهاق، زيادة أو قلة الشهية للطعام؛

فرط سيلان اللعاب وزلة في إفراز اللعاب؛ أرق؛ غثيان؛ إحتقان الأنف؛

رشح؛ زيادة الوزن؛ تشنجات وحرکات لا إرادية؛ عدم هدوء؛ إرتجاف؛

تضليل الخلايا.

٣٢ أعراض جانبية غير شائعة - جفاف في الفم، تقلاصات لا إرادية للسان

(تشنج اللسان)؛ ثبات البنين الذي يمكن أن يحدث لمدة دقائق أو ساعات؛ تكون فيها العينين ثابتة نحو الجاود أو نحو الأعلى؛

فرط نمو الشعر.

٣٣ إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما

تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة

الطبيب.

من الوعي فيما بيئتها (حالة صرع مستمر).

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا كنت تقايس من إحدى الأعراض

التي تم وصفها، أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو

غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا سببت تناول هذا الدواء في الجرعة المدورة المتمنية. تناول الجرعة

المدورة المتالية في المعدة الإعتمادي واستشر الطبيب.

يجوز تناول جرعة طبيعية على العلاج حسب توصية الطبيب، لا يجوز التوقف عن

العلاج بالداوه بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن

على حالك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد

من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات

الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب

أو الصيدلي.

#### ٤ الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أربيبلي قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لأن تعاني أي منها.

إذا كنت تقاسي واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية، توقف

عن تناول أربيبلي واحد طبقي حالاً.

١ إكتئاب جديد أو تفاقمه؛ أفكار إنتحارية؛ محاولة الإنتحار؛ قلق جديد أو تفاقم القلق؛ عدم راحة أو صحبة؛ الشعور بال拔翼؛ صعوبات في النوم؛ سخط؛ ضغب؛ عدم انتظام نظم القلب؛ إرتفاع في ضغط الدم، نشاط وفرط التكلم (هوس)؛ تغيرات في السلوكي.

٢ حادث دماغي، بما في ذلك سكتة.

٣ المتازمة الخبيثة للدواه المضاد للذهان (NMS Syndrome – NMS) تتجاوز 41 درجة مئوية، تصلب الخلايا، تغير في الحالة العقلية، عدم إستقرار فريزو لوسي (Inflexion of spine) غير اعتيادي، إرتفاع في ضغط الدم، نبض سريع أو عدم انتظام نظم القلب)، علامات إضافية: إرتفاع الكرياتين (creatine phosphokinase – CPK) في الدم بتناول طبقي تضرر العضلات، بما في ذلك عضلة القلب، فوسفوكيناز (CPK) في الدم يتباين طبقي تضرر العضلات، بما في ذلك عضلة القلب، ميوغلوبين في البول (Myoglobinuria) في البول، تغيرات في السلوكي، ضمور كولي حاد.

٤ إرتفاع السكر في الدم (hyperglycemia)، سكري. الأعراض التالية تدل على إرتفاع نسبة السكر في الدم: الشعور بالعطش، الحاجة للتبول، تواتر على بكثير من المعتن، الشعور بجوع شديد، الشعور بضعف وارهاق، ألم في البطن، إرثايك، رائحة فواكه في التنفس.

#### أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى ١-١٠ مستعملين من بين ١٠٠):

٥ ضعف؛ تهاب؛ قلة حيوية.

٦ إنخفاض في الوزن؛ فقدان الشهية للطعام.

٧ تشنجات؛ أو حركات لا إرادية؛ الحاجة الحرقة طوال الوقت.

٨ تقيؤات؛ غثيان؛ الشعور بارتفاع في المعدة؛ إمساك.

٩ دوار، صداع؛ صعوبات في النوم، قلق والشعور بعدم هدوء؛ تشوش الرؤية.

١٠ أمراض في الطرق التنفسية العلوية.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى ١-١٠ مستعملين من بين ١٠٠):

١١ نبض بطبي، تبقي سريع (خفقان).

١٢ وذمة في الأطراف، إنخفاض البدان، الكاحلين أو الرجلين.

١٣ ألم في الصدر.

١٤ سقوطات.

١٥ إرتفاع في إنزيمات الكبد في فحوص الدم.

١٦ إرتفاع في نسبة السكر (الجلوكوز) في الدم.

١٧ إرتفاع في تركيز الهرمونون الكاتكت ديهيدروجيستاز؛ إرتفاع في نسبة الهرمونون غاما - غلوتاميل ترانسپتيداز (GGT).

١٨ ضعف عضلات؛ تقلصات عضلية؛ ياركتينونية؛ فقدان الذاكرة؛ تيس

العضلات؛ بطء في الحركة؛ فقدان جزئي أو كامل لحركة العضلات؛ تصلب العضلات؛

العين؛ رجفان؛ قلة الحركة؛ نوبة شخصون البصر (crisis).