

ماء أكسجيني ٣٪ فلوريش محلول

FLORIS

التركيب وتركيز المادة الفعالة:

ماء أكسجيني 3% w/w 3% HYDROGEN PEROXIDE

لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية"

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عُكِّب استخدام المستحضر بشكل صحيح. استشر صيدلياً إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

١. لماذا مُعدّ الدواء؟

الدواء مُعدّ للتطهير.

الصيدلية العلاجية مستحضرات مطهرة.

٢. قِبل استخدام الدواء

X يُمنع استخدام الدواء:

• إذا كانت لديك حساسية للمواد الفعالة أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

• على جلد سليم وفي العينين

• في فراغات مغلقة من الجسم وفي جروح ناتجة عن

عمليات جراحية

• للاستخدام بحقنة

• لتطهير أدوات العملية الجراحية

ⓘ تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

يجب الامتناع عن لامة العينين.

في حال اللامسة، يجب الغسل باستخدام الكثير من الماء.

إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أياً كان، عليك إبلاغ الطبيب

بذلك قبل تناول الدواء.

ⓘ إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما

فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر

الطبيب أو الصيدلي بذلك.

ⓘ معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء

• يمكن أن ينتج بقعة بيضاء مؤقتة لدى لامة الجلد

يمكن أن يُبَيِّض مادة الماء الأكسجيني لون الثياب

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، يجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

طريقة الاستعمال:

الجرعة الموصى بها عادة هي: يجب تنظيف المنطقة المُعدّة للتطهير بظن طبي

مفقوع بالمادة. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها لمنع الانتعاع. الدواء مُعد

للاستخدام الخارجي فقط. إذا فرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع

الولد خطأ من الدواء، توجّه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة

للمستشفى مصطحباً معك عبوة الدواء.

كيف تستعملين/ين إن تساهمي/ي في نجاح العلاج؟

لا تتناول الأدوية في الظلمة! اغسلي الأظفار والجرعة في كل مرة تتناول فيها

الدواء. استخدم الفطرات إذا كنت تحتها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق باستخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام الماء الأكسجيني ٣٪ أعراضاً

جانبية لدى بعض المستخدمين.

لا تفرغ لدفى قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الاستخدام والتوجّه للطبيب:

• في حال حدوث تهيج أو طفح (أو يكونا موجودين قبل استعمال المستحضر).

أعراض جانبية أخرى نشوء حروق على الجلد تتحول إلى مسحات

بيضاء لتسبب ميت. يزول الألم المرافق لذلك بعد نحو ساعة

إذا ظعير أحد الأعراض الجانبية، إذا تقاع أي من الأعراض الجانبية، أو

حين تعاني من عارض جانبي لم يُذكر أعلاه، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية عبر الاستشارة

الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، الموجودة في الصفحة الرئيسية

لموقع وزارة الصحة: www.health.gov.au

أو عن طريق التحويل إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au/>

٥. كيف تخزن الدواء؟

• امنع التسرع! يجب حفظ هذا الدواء وأى دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي

الأطفال وأول الرض، وكذلك لتفادي التسلم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلحية (exp date) الظاهر على ظهر العبوة.

تاريخ انتهاء الصلحية هو اليوم الأخير من الشهر المشار إليه.

• خزن في مكان بارد، في درجة حرارة لا تتعدى 25°C.

• يمكن استعمال المنتج بعد فتحه حتى تاريخ انتهاء الصلحية.

• أغلق بأحكام. احفظ في العبوة الأصلية. انتبه لتاريخ انتهاء صلاحية المنتج.

٦. معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على

Purified water, Dibasic Sodium Phosphate, Phosphoric acid

كيف يتلو الدواء، وماذا تعدي العبوة

50 مل، وحلول صلب ومليتر، 1000 مليلتر (1 لتر)

المنتج وصاحب التسجيل. ين تسعون فلوريش مض. المنطقة الصناعية مسعاف، برید

محلول مسعاف ٢٠١٧٤٠٠٠

تم فحص واعاد هذه النشرة في ١١،٢٠٢١ وفق توجيهات وزارة الصحة. رقم تسجيل

الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ٥٧٣٨٢٧٠٢٠

من أجل التبسيط وتسجيل الأفراد، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من

ذلك الدواء معد لإبادة كلا الخسنيين.