

كالامين غسول

غسول

FLORIS

التركيب:

المواد الفعالة والتركيز:

كالامين 15%، أكسيد الزنك 5%

(Calamine 15% , Zinc Oxide 5%)

لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند 6 "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو

إلى الصيدلي.

عليك استخدام المستحضر بشكل صحيح استشر

صيدياً إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

1. لماذا معدّ الدواء؟

الدواء معدّ للتخفيف من حالات تهيج الجلد المختلفة

الفصيلة العلاجية:

مُخدر التهيج الموضعي

2. قبل استخدام الدواء

ⓧ يُمنع استخدام الدواء:

• إذا كانت لديك حساسية للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة المواد غير الفعالة - انظر البند 6 "معلومات إضافية".

ⓧ تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

• يُمنع استعمال هذا الدواء على فترات متقاربة أو متواصلة دون استشارة الطبيب.

• إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أيًا كان، عليك إبلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.

• يجب الامتناع عن ملامسة العينين والأنسجة المخاطية. في حال حدوث ملامسة كهذه، يجب شطف العينين بماء جيداً.

ⓧ قبل العلاج بواسطة كالامين غسول، أخبر الطبيب إذا:

• كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أيًا كان

ⓧ إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

ⓧ معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء: غسول ذو ترسبات قليلة. يجب رجه قبل الاستعمال.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تتحصى مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة المعمول بها في حال عدم وجود تعليمات

أخرى من الطبيب هي:

هز القارورة وادهن بلطف على الجلد المُصاب

واسمح للمنطقة بأن تصبح جافة. يمكن القيام

بالمعالجة عدس مرات يوميًا وفقًا للحاجة. في حال لم

يظُرأ تحسن على حالتك خلال أسبوع يجب التوجه

إلى الطبيب.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يُمنع الابتلاع. الدواء معدّ للاستخدام الخارجي فقط.

إذا أفرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع

الولد بالخطأ من هذا الدواء، توجهَ حالاً إلى الطبيب

أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا

معك عبوة الدواء.

لا تتناول الدواء في الظللة! افحص اللاصقة

والوجبة في كل مرة تتناول فيها الدواء. استخدم

النظارات إذا كنت تحتاجها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى فيما يتعلق باستخدام

الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام كالامين

غسول أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا

تفرغ لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا

تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب:

في حال حدوث تهيج، طفح أو التهاب موضعي

(لم تكن موجودة قبل استعمال المستحضر)، (نادر):

توقف عن تناول العلاج وتوجه إلى الطبيب

إذا تقادم أيُّ من الأعراض الجانبية، أو حين تعاني من أعراض جانبية لم يُذكر أعلاه، عليك استشارة

الطبيب. يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن الأعراض

الجانبية عبر الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن

أعراض جانبية، الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع

وزارة الصحة: www.health.gov.au

أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au/>

5. كيف تخزن الدواء؟

• امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأيّ دواء آخر

في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو

الرضع، وذلك لتفادي التسمم. لا تسبب التقيؤ دون

تعليمات صريحة من الطبيب.

• يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

(exp. date) الظاهر على ظهر العبوة. تاريخ انتهاء

الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المُشار إليه.

• احفظه في مكان بارد، في درجة حرارة تقل عن

٢٥ درجة مئوية.

• أغلقه بإحكام،

• احفظه في العبوة الأصلية.

• يمكن استخدام المنتج بعد فتحه، حتى تاريخ انتهاء

الصلاحية.

6. معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Purified water, Glycerin, Bentonite

Sodium citrate, Liquefied phenol

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

غسول ذو لون وردي فاتح

المحتوى: ١٠٠ مليلتر

المُنْتِج وصاحب التسجيل:

بن شمعون فلوريش م.ص.، المنطقة الصناعية

مسغاف، بريد متجول مسغاف ٢٠١٧٤٠٠.

تم أعداد هذه النشرة في 11.2021 وفق توجيهات وزارة

الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في

وزارة الصحة: ١٢٥٤٧٢٨٨٧٩

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المُذكر.

على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.