

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ז - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קלמין תרחיף

תרחיף

FLORIS

הרכב:

החומרים הפעילים וריכוזם:
קלמין 15%, אבץ חמצני 5%
(Calamine 15%, Zinc Oxide 5%)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים:
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש
לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה.
היועץ ברקוח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת גירוי עור שונים.
קבוצה תרפויטית - מאלחש גירוי מקומי.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים
או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר
מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי
פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

Ⓜ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או
תקופה ממושכת בלי היועץ ברופא.
- אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי,
עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

• יש להימנע מגע עם עיניים, רקמות ריריות.
אם נוצר מגע כזה, יש לשטוף היטב במים.

Ⓜ לפני הטיפול בקלמין תרחיף, ספר לרופא
• אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי

Ⓜ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה,
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

Ⓜ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של
התרופה: תרחיף עם משקע מועט.
יש לנער לפני השימוש.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח
אם אינך בטוח.

המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא הוא:

נער את הבקבוק ומרח בקלות על פני העור
הפגוע ואפשר יבוש המקום. ניתן לבצע את
הפעולה מספר פעמים ביום לפי הצורך. אם לא
חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים יש לפנות
לרופא. אין לעבור על המנה המומלצת. אין לבלוע.
התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית
חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים
אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות
בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בקלמין תרחיף עלול
לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.
ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

• במקרה של גירוי, פריחה או דלקת מקומית
(שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר), (נדיר):
הפסק את הטיפול ופנה לרופא.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר
אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון,
עליך להתיעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות
לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד
הבריאות www.health.gov.il
או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות
ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה
ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
(exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך
התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן במקום קריר, מתחת ל - 25°C.

• סגור היטב .

• אחסן באריזה המקורית.

• ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה,
עד שפג תוקפו.

6. מידע נוסף:

גום על החומרים הפעילים התרופה מכילה

Purified water, Glycerin, Bentonite,
Sodium citrate, Liquefied phenol

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תרחיף בצבע ורוד בהיר

תכולה: 100 מ"ל

היצרן ובעל הרישום:

בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב,
ד.ג. משגב 2017400.

עלון זה נערך ב- 11.21 בהתאם להנחיות

משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות
הממלכתי במשרד הבריאות: 1254728879

לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח
בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני
שני המינים.

