

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يسُقِّعُ الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ديكسيمون، كبسولات 25، 50، 100 ملغ

تحتوي كل كبسولة على: سيكلوسبورين (Ciclosporin) جرعة 25 أو 50 أو 100 ملغ على التوالي.

مواد غير فعالة ومسببات الحساسية (مستأجرة) في الدواء – انظر للنبذ 2 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة ب**إمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات مُخصّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك، لا تعطه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن وضعومات طبيبي مشابهة.

1. لأي غرض مُخصّص الدواء؟

كعلاج لمنع رفض الزرع عند زرع كلية كبد، وقلب البنجم مع كوركيكوسيتراينبات.

كعلاج عند زرع نخاع العظم.

كعلاج التهاب العينين من نوع التهاب العنبية (uveitis) الذي ليس على خلفية ثلوثية(Endogenous uveitis).

لعلاج المتلازمة الكلوية من نوع Minimal Change Disease (MCD) عند فشل العلاج الاعيادي.

لعلاج الحالات الصعبة من التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يكون العلاج الاعيادي غير ناجح أو أنه غير ملائم.

لعلاج الحالات الصعبة من الصدفية لدى المرضى فوق جيل 16 سنة والذين لا يستجيبون لعلاج آخر.

لعلاج الحالات الصعبة من ربو الجلد (atopic dermatitis) عند البالغين لمدة 8 أسابيع فقط، عندما يكون العلاج الاعيادي غير ناجح أو أنه غير ملائم.

الفصلية العلاجية: مُمَثِّات الجهاز المناعي.

إذا خضعت لعملية زرع عضو أو نخاع عظمي، وظيفة دكسيمون هي تنظيم جهاز المناعة في جسمك. يمنع دكسيمون رفض الأعضاء المزروعة عن طريق حجب تطور خلايا خاصة التي تتجاهم بشكل طبيعي النسيج المزروع.

إذا كنت تعاني من مرض غير مرتبط بالزرع، الذي به يقوم رد الفعل المناعي لهجمك بمهاجمة الخلايا في جسمك (مرض مناعي ذاتي)، فينبغ دكسيمون رودد الفعل المناعية في هذه الأمراض.

2. قبل استعمال الدواء

إذا كنت تأخذ دكسيمون بعد عملية زرع، فإن الدواء سيوقف لك فقط كل من خصص ذو خبرة في عمليات الزرع وأو في أمراض المناعة الذاتية.

إن المعلومات التي في هذه النشرة من شأنها أن تتغير وفقاً لسبب تناول الدواء – بعد زرع أو علاج مرض مناعة ذاتية.

اتبع تعليمات طبيبك بحذافيرها. هذا قد تكون مختلفة عن المعلومات العامة في هذه النشرة.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حسناً (أر جي)؛ (لمادة الفعالة (سيكلوسبورين) أو لأي واحد من المركبات الاضائية التي يحتويها الدواء (انظر للنبذ 6).

• كنت تتناول مستحضرات تحتوي على هيريكوم (Hypericum perforatum – St. John's Wort).

• كنت تتناول مستحضرات تحتوي على دايجيتارن اينديكسيلات (Digitalis) (Dabigatran etexilate) (لمنع خثرات الدم بعد العملية الجراحية) أو بوسيتان (Bosentan) والسيكيرين (Aalskiren) (لعلاج فرط ضغط الدم).

إذا كانت هذه الحالات تطبق عليك، **يجب إعلام الطبيب بدون أخذ دكسيمون**. إذا كنت غير متأكد، يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج ب**ديكسيمون**.

تطبق تلك القوانين إذا لم تكن متأكدًا، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي قبل تناول دكسيمون.

إذا كنت تتعالج لالتهاب العنبية الثانوي لمرض بهجت (Behcet's (uveitis) سراقب الطبيب سير العلاج بديكسيمون بحرص خصوصًا إذا كانت لديك أعراض عصبية (مثل: نسيان متزايد، تغيرات في الشخصية والتي تكون ملموسة مع الوقت، اضطرابات نفسية أو اضطرابات في المزاج، الشعور "بحرق" في الأطراف، ضغية أو الشعور بالأطراف، الشعور بالوخز في الأطراف، ضعف في الأطراف، اضطرابات في المشي، ألم رأس مع أو بدون غثيان وتقيؤ، اضطرابات في الرؤية وما في ذلك محدودة حركة العين).

إذا كنت مسنًا وتعالج بديكسيمون من أجل الصدفية أو ربو الجلد، عليك الانتاعن عن التعرض لأي نوع من موجات UVB أو العلاج بديكسيمون جهاز المناعة وقد يؤثر على فترة الجسم على محاربة الثلوثات.

• كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

• كنت تعاني من مشاكل في الكلى.

• كنت تتلقى دواءً يقلل من ضغط الدم.

• كنت تتناول ضغط دم مرتفع.

• كنت تتناول دواء لخفض ضغط الدم مع الدواء.

• لديك مستويات منخفضة من المعنيتين، من الممكن أن يعطيك الطبيب إضافات مغنسيوم، خصوصًا بعد عملية جراحية لزرع الأعضاء.

• لديك مستويات مرتفعة من البوتاسيوم في الدم.

• كنت تعاني من فقر الدم (Gout).

• كنت بحاجة لتلقي تطعيم.

إذا انطبقت عليك هذه الحالات قبل أو خلال العلاج بديكسيمون، توجه للطبيب فورًا.

الحماية من التعرض للشمس

ينبغ دكسيمون جهاز المناعة، وبذلك، يزيد الاحتياط لتطوّر أنواع سرطان، خصوصًا سرطان الجلد والجهاز الليمفاوي. عليك الحد من التعرض للشمس ولأشعة UV عن طريق ارتداء ملابس واقيه ودهن كريم واقي ذو عامل وقاية مرتفع بشكل متكرر.

يجب إعلام الطبيب قبل بدء العلاج إذا:

- كانت لديك مشاكل أو في السابق مشاكل مرتبطة بالتعلق في الكحول.
- كانت لديك صرع.
- كانت لديك مشاكل لأي إنكابت في الكبد.
- كنت حاملًا.
- كنت مرضعًا.
- كان الدواء يُعطى لطفلك.

إذا كانت هذه الحالات تصحك (أو لم تكن متأكدًا)، توجه إلى الطبيب قبل تناول دكسيمون، وذلك لأن الدواء يحتوي على مركب الذي، فينبغ لكحول. انظر للنبذ "معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء".

فحوصات خلال العلاج بديكسيمون

سيقوم طبيبك بإجراء الفحوصات التالية:

زراعة

وظائف الكبد والكلى.

• **مستويات الكرياتينين في الدم.**

• **مستويات الإيزيمين في الدم.**

إذا كنت تتلقى دكسيمون لحالات التي ليست ما بعد عملية الزرع (مثل: التهاب العينين من نوع التهاب العنبية، التهاب العنبية لفرقة العين المتوسطة أو الخلقية أو التهاب العنبية على خلفية مرض بهجت، ربو الجلد، التهاب مفاصل روماتويدي شديد أو المتلازمة الكلوية، يجوز تناول دكسيمون إذا كان لديك:

• مشاكل في الكلى (عند المتلازمة الكلوية).

• ثلوثات غير مسيطر عليها بمساعدة الأدوية.

• سرطان من نوع أي كان.

• مستخدم مرتفع ضغط الدم.

• ضغط دم مرتفع خلال العلاج ولا يمكن موازنته، على طبيبك إيقاف العلاج بديكسيمون.

الكوليسترول (نسلطات HMG-CoA بيتوكسل التي تسمى كذلك ستاتينات) بريفينيزورون، أتورفوسيد (سِمَنت علاج السرطان)، ريباليينيد (مستحضر ضد السكري يُعطى عن طريق الفم)، منطلات الجهاز المناعي (فيروليومس، سيروليومس)، أوميستيبتان وألوية مُحَدثة مضادة للسرطان تسمى إنتراسيكلتات (مثل دوكسوروبييين).

إذا انطبقت عليك هذه الحالات (أو لم تكن متأكدًا)، توجه إلى الطبيب قبل تناول دكسيمون.

استعمال الدواء والنظام

لا يجوز تناول دكسيمون مع الجريب فروت أو عصير الجريب فروت لأن ذلك قد يؤثر على عمل الدواء.

يمكن أخذ دكسيمون مع أو بدون الطعام.

الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء. سيقاُش الطبيب مع الاختطار المحتمل المنوط بأخذ دكسيمون خلال الحمل.

يجب إعلام الطبيب إذا كنت حاملًا أو تخططين للحمل.

• **كيفية أخذ دكسيمون**

يجب دائما أخذ الدواء في نفس الوقت في كل يوم، خصوصا يجب إخراج الكبسولة من عبوة اللوحة. يجب بلع الكبسولة كاملة مع الماء، لا يجوز المضغ/النشر/السحق.

مدة العلاج

سيقوم الطبيب لك مع الوقت بتوجيه طبيبك إذا كنت تحتاج علاج إضافي.

• **معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء**

يجب الاستمرار بأخذ دكسيمون طالما يخبرك الطبيب بذلك. لا يجوز تناول دكسيمون مع الجريب فروت أو عصير الجريب فروت لأن ذلك قد يؤثر على عمل الدواء.

يمكن أخذ دكسيمون مع أو بدون الطعام.

التهاب الكبد (اليرقان C):

أخير طبيبك إذا كان لديك التهاب الكبد C. قد تتغير وظائف الكبد لديك عند علاج التهاب الكبد C، والأمرد قد يؤثر على مستويات سيكلوسبورين في دمك. من الممكن أن يضرص طبيبك لفرقة دموية.

• **معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء**

يجب الاستمرار بأخذ دكسيمون طالما يخبرك الطبيب بذلك. لا يجوز تناول دكسيمون مع الجريب فروت أو عصير الجريب فروت لأن ذلك قد يؤثر على عمل الدواء.

يمكن أخذ دكسيمون مع أو بدون الطعام.

سيقوم الطبيب بمراقبة مستويات سيكلوسبورين في دمك بحرص زائد لمدة قصيرة عقب الانتقال من شكل جرعة واحد بإعطائه عن طريق الفم إلى شكل جرعة آخر.

الانتقال من شكل جرعة واحد مع واحد من سيكلوسبورين بالأطباء عن طريق الفم لشكل جرعة آخر، قد تقاسي أعراض جانبية. إذا حدث الأمر، رجاء أخبر الطبيب أو الصيدلي، لأنه من الجائز أن هنالك حاجة لملازمة الجرعة التي تتناولها، لا تقع أبدا بتغيير الجرعة من تلقاء نفسك، إلا بتعليمات من الطبيب.

طريقة الاستعمال

• **متى يجب أخذ دكسيمون**

من المهم تناول الدواء في نفس الوقت في كل يوم، خصوصا إذا خضعت لعملية زرع.

• **كيفية أخذ دكسيمون**

يجب دائما أخذ الجرعة اليومية بجرعين منفصلتين.

يجب إخراج الكبسولة من عبوة اللوحة. يجب بلع الكبسولة كاملة مع الماء، لا يجوز المضغ/النشر/السحق.

• **معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء**

يجب الاستمرار بأخذ دكسيمون طالما يخبرك الطبيب بذلك. لا يجوز تناول دكسيمون مع الجريب فروت أو عصير الجريب فروت لأن ذلك قد يؤثر على عمل الدواء.

يمكن أخذ دكسيمون مع أو بدون الطعام.

شيوها على بعد):

مشاكل خطيرة في الكبد مع أو بدون اصفرار العينين أو الجلد، غثيان، فقدان الشهية، بول داكن اللون، انتفاخ في البطن، في الجزء الخلفي من العين الذي قد يكون مرتبط بتشنج الرؤية والذي قد يؤدي للإضطراب في الرؤية عقب ارتفاع في الضغط داخل الرأس (ارتفاع ضغط الدم الحميد داخل الجمجمة benign intracranial hypertension).

مشاكل وضرس في الكبد مع أو بدون اصفرار الجلد والعيين، غثيان، فقدان الشهية،بول داكن.

اضطراب في الكلى الذي قد يؤدي لخفض نتاج البول بنسبة كبيرة.

مستوى منخفض من خلايا الدم الحمراء أو صفائح الدم. العلامات/تأثيرات شحوب الجلد، تعب، ضيق تنفس، بول داكن (علامة لتفكك خلايا الدم الحمراء)، كدمات أو نزيف بدون أسباب واضحة، ارتباك، توهان، انخفاض في اليقظة ومشاكل في الكلى.

• **أعراض جانبية شائعة جدا**

أعراض جانبية شائعة جدا (أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة):

اضطرابات في الكلى، مستخدم دم مرتفع، ألم رأس، رجفان لا ارادي للجسم، من مبالغ قلي للشرع على الجسم وعلى الوجه، مستوى مرتفع من الدهون في الدم.

إذا أثر عليك إحدى هذه الأعراض الجانبية بشكل وخيم، توجه للطبيب.

• **أعراض جانبية شائعة** (تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 100):

اختلاجات، اضطرابات في الكبد، مستوى مرتفع من السكر في الدم، تعب، فقدان الشهية، غثيان، تقبوت، عدم عهء الشباب، خدر أو وخز، سحونة، مستوى منخفض من خلايا الدم البيضاء، बात حر، حركات الاختلاجات عضلية، قرحة معدة، قرط من (انتفاخ) للثة لدرجة تغطية الأسنان، مستوى مرتفع من حمض اليوريك أو من البوتاسيوم في الدم، مستوى منخفض من المعنيتين في الدم.

إذا أثر عليك إحدى هذه الأعراض الجانبية بشكل وخيم، توجه للطبيب.

• **أعراض جانبية غير شائعة** (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

في دم، تعب، فقدان الشهية، غثيان، تقبوت، عدم عهء الشباب، خدر أو وخز، سحونة، مستوى منخفض من خلايا الدم البيضاء، बात حر، حركات الاختلاجات عضلية، قرحة معدة، قرط من (انتفاخ) للثة لدرجة تغطية الأسنان، مستوى مرتفع من حمض اليوريك أو من البوتاسيوم في الدم، مستوى منخفض من المعنيتين في الدم.

إذا أثر عليك إحدى هذه الأعراض الجانبية بشكل وخيم، توجه للطبيب.

• **أعراض جانبية غير شائعة** (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

أعراض اضطرابات دماعية تشمل نوبات اختلاجية مفاجئة، ارتباك ذهني، أرق، توهان، اضطرابات في الرؤية، قلة الوعي، ضعف في الأطراف، محدودية الحركة.

كذلك، طفح، انتفاخ شامل، ارتفاع في الوزن، مستوى منخفض من خلايا الدم الحمراء، مستوى منخفض من صفائح الدم الذي قد يزيد الاحتياط للزرف.

إذا أثر عليك إحدى هذه الأعراض الجانبية بشكل وخيم، توجه للطبيب.

• **أعراض جانبية نادرة** (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

اضطراب عيني مع الشعور بخدر أو وخز في أصابع اليدين وأصابع القدمين، التهاب في الكرياتين مع ألم وخيم في أعلى الأصابع، ضعف العضلات، فقدان قوة العضلات، ألم في عضلات الرجلين، اليدين أو يأي ماكل آخر في الجسم، تدمير خلايا الدم الحمراء ما يشمل مشاكل في الكلى مع أعراض مثل انتفاخ في الوجه، في البطن، في اليدين و أو في القدمين، تنفصص كمية البول، صعوبات تنفس، ألم في الصدر، نزيف (اختلاجات)، فقدان الوعي، تغيرات في سمية في الدورة الشهرية، تضخم الصدر لدى الرجال.

إذا أثر عليك إحدى هذه الأعراض الجانبية بشكل وخيم، توجه للطبيب.

• **أعراض جانبية نادرة جدا** (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):

انتفاخ في الجزء الخلفي من العين الذي قد يكون مرتبط بارتفاع الضغط داخل الرأس وباضطرابات في الرؤية.

إذا أثر عليك هذا العرض الجانبي بشكل وخيم، توجه للطبيب.

• **أعراض جانبية شائعة** (أعراض التي تظهر لدى أقل من 10,000):

التهاب، وتسهيل والقراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المبكر، بالرغم من ذلك، الدواء مُخصّص لأبناء كلا الجنسين.

• **محتاج وصاحب التسجيل: كوسل م. ض.**

شارع دكسل 1، أرتو عيّنًا 3060000