

ميفورتيك 180 ملخ، 360 ملخ أقراص مطالية

يحتوي كل قرص مطلي على:

ميفورتيك 180 ملخ:

180 ملخ حمض ميكوفينوليك (ما يعادل 192.4 mg Mycophenolic acid (equivalent to 192.4 mg Mycophenolate sodium)

ميفورتيك 360 ملخ:

360 ملخ حمض ميكوفينوليك (ما يعادل 384.8 mg Mycophenolic acid (equivalent to 384.8 mg Mycophenolate sodium)

الماء غير الفعال: انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية» والفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء».

اقرأ النشرة تتممن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على

معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلأة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن

مرضهم مشابه لمرضك.

معلومات هامة إقرأها بتمعن

• تذير: يؤدي ميكوفينولات (mycophenolate) لحدوث إجهادات وعيوب خلقية.

إذا كنت إمرأة مارأة على الحمل، فيتوجب عليك أن تجتازى فحص حمل نتيجته سلبية

قبل بدء العلاج والتقييد بالإرشادات لمنع الحمل التي أعطيت لك من قبل الطبيب المعالج.

• يتحدد مفعوك طببي، خاصة عن تأثيرات ميكوفينولات على الأجنحة. الرجاء أدرسي

العلومات جيداً واتبع التعليمات.

• قبل تناول المستحضر، يجب إستشارة الطبيب ثانية فيما إذا لم تفهمي الإرشادات بأكملها.

لمعلومات إضافية، انظر فقرة «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء» وفقرة «الحمل».

الإرضاوع منع الحمل».

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يعطي ميفورتيك بالإشتراك مع سيلكوسبيورين وكورتيكosteroidات لمنع رفض نسيج مزروع لدى كبار مزروع كثبة.

إذا توفرت لديك أسلأة حول كيفية عمل ميفورتيك أو لاما وصف لك هذا الدواء، راجع الطبيب.

الفصيلة العلاجية: من مثبطات جهاز المناعة.

2) قبل إستعمال الدواء

يوصى لك ميفورتيك فقط من قبل طبيب لديه خبرة بأدوية زرع الأعضاء.

- لدى الرجال، لا يجوز التبرع بالنطاف خلال العلاج بـ ميفورتيك وحتى 90 يوماً على الأقل بعد إنتهاء العلاج.
- التداخلات/التفاعلات بين الأدوية
 - إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طيبة وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
 - يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تتناول:
 - أدوية أخرى التي ترتبط جهاز المناعة مثل: آزاتيورپين أو تاكوليومس.
 - الأدوية المستعملة لعلاج النسب المرتفعة من الكواستنول بالدم مثل: كوليستيرامين.
 - الفحم الفعال المستعمل لمعالجة المشاكل الهضمية مثل الإسهال، أم الريحان والغازات.
 - الأدوية المضادة للمicroorganism على مفنزيروم وألومنيوم.
 - الأدوية المستعملة لمعالجة التلوث الفيروسي مثل أسيكلوفيير أو چانسيکلوفيير.
 - عليك أيضًا إبلاغ الطبيب إذا كنت تخطط لتلقي آية لقايات.
- لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
 - كنت أبorigي (لديك فطر حساسية) لـ حمض ميكوفينوليك، لميكوفينولات الصوديوم، لميكوفينولات موفيتيل أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، المفصلة في الفقرة 6 «معلومات إضافية» من هذه النشرة.
 - كنت إمرأة في سن الخصوبة ولم تجتازى فحص حمل سليم قبل تلقي الوصفة الطبية الأولى لـ ميفورتيك، وذلك لأن ميكوفينولات يسبب إجهادات وعيوب خلقية.
 - كنت في فترة الحمل، تحظر على الحمل أو كنت تعقددين بذلك حامل.
 - كنت إمرأة في سن الخصوبة ولا تستعملين بالدم مثل: كوليستيرامين.
 - إضافية، أنتظري فقرة «الحمل، الإرضاوع ومنع الحمل».
 - كنت مرضعة (معلومات إضافية، أنتظري فقرة «الحمل، الإرضاوع ومنع الحمل»).
 - إذا إنطقت عليك إحدى الحالات التي فصلت سابقًا، بلغ طبيب العلاج عن ذلك ولا تتناول الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:**قبل العلاج بـ ميفورتيك، إحك للطبيب أو الصيدلي:**

- إذا كنت تعاني أو كان لديك في الماضي إضطراب جدي في الجهاز الهضمي مثل ترقحة طعام أو من دون طعام وحيثها تناولها بنفس الشكل كل يوم، وذلك للتأكد من إمتصاص نفس كمية الدواء بجسمك كل يوم.
- إذا كنت تعاني من نقص روثاني تاريزيم- ليش - ليهان Lesch-Nyhan أو كيلي - سينفمير hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT) مثل متلازمة ليش - ليهان Kelley-Seegmiller.

يتوجب عليك أيضًا الإنتباه للأمور التالية:

- يضعف هذا الدواء من آلية دفاع جلد الجسم من الشمس، لذلك، فهو يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الجلد. عليك الحذر من تعرضك للشمس والأشعة UV وذلك بتقطيع الجلد المكسف ما أمكن ودهن واقياتأشعة ذات عامل وقائي مرتفع. يستشرط الطبيب بخصوص الحماية من الشمس.

الأطفال والمراهقون

- لا يوصى بإستعمال ميفورتيك لدى الأطفال والمراهقين نظرًا لعدم توفر آية معلومات العمل، الإرضاوع ومنع الحمل
- إذا كنت في فترة الحمل أو مرضة، تعقددين بأنك حامل أو تحظر على الحمل، استشيري الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول الدواء. يحدث معك الطبيب عن المخاطر في حال الحصول حمل وعن العلاجات البديلة لمنع رفض العضو المزروع لديك إذا كنت:

• تحذير للحمل.

- لم تلتقي طمث أو تعقددين بأنك لم تلتقي طمث، لديك نزف طمثي مختلف عن المعتراد، أو إذا كنت تعقددين بأنك حامل.
- أقتنت علاقات جنسية من دون إستعمال وسائل ناجحة لمنع الحمل.

• مثبطات جهاز المناعة الأخرى

- مثبطات جهاز المناعة الأخرى فعليك إبلاغ طببيك في الحال.

إذا أصبحت حاملًا خلال فترة العلاج بـ ميكوفينولات، يجب إعلام الطبيب في الحال، مع

- أن يرشدك حول مواصلة تناول ميكوفينولات حتى لقائك مع الطبيب.

الحمل

- ميكوفينولات يؤدي لحدوث إجهادات بشدة كثيرة جداً (تقريباً 50%) وعيوب خلقية خطيرة، علىك إبلاغ الطبيب فوراً.

من شأن طببيك أن يقوم بفحص نسبة كريات الدم البيضاء لديك خلال فترة العلاج

- بـ ميفورتيك وأن يرشدك حول مواصلة العلاج بـ ميفورتيك.

• المادة الفعالة بالدواء المسماة "حمض ميكوفينوليك" لا تشبه المادة في الأدوية الأخرى

- ذات الاسم المشابه، مثل "ميكوفينولات موفيتيل". لا تقم بالتبديل بين الأدوية بدون تعليمات من الطبيب.

إذا كنت إمرأة في سن الخصوبة، لا يجوز بدء العلاج بـ ميفورتيك من دون فحص حمل

- سلبي قبل بدء العلاج. يجب التقديم بالإرشادات لمنع الحمل التي أعطيت لك من قبل الطبيب.

• لدى متعالجين الذين يخططون للحمل، يجب دراسة علاج بأدوية بديلة مثبطة للجهاز

- المناعي، ذات خطورة منخفضة أكثر لتسبب تسمم لدى الجنين. يجب مناقشة الطبيب بخصوص الخطورة مقابل الفائدة من العلاج.

• لا يجوز إستعمال ميفورتيك إذا كنت مرضعة، وذلك لأن كميات ضئيلة من الدواء قد تنتقل

- على حليب الأم.

- منع الحمل لدى النساء اللواتي تتناولن ميفورتيك
 - إذا كنت إمرأة في سن الخصوبة فيتوجب عليك إستعمال طريقة ناجحة لمنع الحمل خلال الفترات التالية:
 - قبل بدء العلاج بـ ميفورتيك.
 - خلال طفولة فترة العلاج بـ ميفورتيك.
 - خلال 6 أسابيع بعد التوقف عن العلاج بـ ميفورتيك.
 - يجب إستشارة الطبيب المعالج حول الوسائل الأكثر ملائمة بالنسبة لك لمنع الحمل. تحدد وسائل منع الحمل هذه بحسب حالتك. يفضل إستعمال طريقة تقويم لمنع الحمل لأن ذلك يقلل من خطورة حدوث حمل غير مقصود.
 - يجب التوجه إلى الطبيب يأسعاً ما يمكن إذا كنت تعقددين بأن وسيلة منع الحمل لم تكن ناجحة أو إذا نسيت تناول قرص لمنع الحمل.

- إذا كنت تستوفين أحد المعايير التالية، فمن غير المفترض أن تتحملها:
 - كنت إمرأة في فترة سن الأساس، أي: عمرك 50 سنة على الأقل وتلتقي الطمث الأخير قبل أكثر من ستة (6) في حال توافقك عن تلقي الطمث جراء معالجة السرطان، فلا يزال هناك إمكان أن تتمالي.

- اجتنز عملية جراحية لإستئصال البوتين والمبيضين (oophorectomy)
 - مبيضيك لا يعملان (فشل مبيضيك، الذي تم تشخيصه من قبل طبيب النساء متخصص).
 - ولدت ولديك واحد من الحالات التالية، التي لا تتمكن من إدراكها:
 - نطج جيني XY (XY genotype) مثلاً مزدوجة (Turner's syndrome) أو عدم تطور الرحم (Uterine agenesis).
 - كنت طفلة أو مراهقة، لم تبدأ بلتقي الطمث.

- من العامل لدى زوجات الرجال الذين يتناولون ميفورتيك
 - ال Shaward المتفوقة لا تدل على ارتفاع في الخطورة لحدث تشوهات أو إجهادات إذا كان الأب يتناول ميكوفينولات، لكن لا يمكن تجاهل الخطورة بتاتاً.
 - لتوخي الحذر، من الموصى به أن تستعملين أنت أو زوجتك وسيلة منع حمل موثوقة خلال العلاج ولمدة 90 يوماً بعد إنتهاء تناول ميفورتيك.
 - إذا كنت تخطط للحمل مع زوجتك، تحدث مع طببك حول المخاطر المحتملة.

- السيادة واستعمال الماكولات
 - من غير المفترض أن يؤثر ميفورتيك على القدرة على السيادة أو إستعمال الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي هذا الدواء على 13 ملخ صوديوم (مكون أساسى في محل الطبخ) في كل قرص من ميفورتيك 180 ملخ، الذي يساوى بالقيمة لـ 0.65% من الكمية اليومية الفصوصى لإستهلاك الصوديوم الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية (2 غرام) لدى الكبار.
- يحتوي هذا الدواء على 26 ملخ صوديوم (مكون أساسى في محل الطبخ) في كل قرص من ميفورتيك 360 ملخ، تساوى هذه الكمية بالقيمة لـ 1.3% من الكمية اليومية الفصوصى الموصى بها لإستهلاك الصوديوم لدى الكبار.

- المستحضر يحوى لكتوز (أنظر أيضًا الفقرة 6 «معلومات إضافية»)**
 - إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة (بما في ذلك لكتوز، چالاكتوز أو چالوكوز)، اتصل بالطبيب قبل تناول ميفورتيك.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وتوقيت الاعطاء

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة التناول

يجب بلع القرص بشكاله الكامل مع كأس من الماء.

يما أن الأقراص مطلية، ممنوع مضغ، كسر أو سحق الأقراص. لا يجوز بلع قرص مكسور أو مشطور.

فترقة العلاج بـ ميفورتيك

تتم مواصلة العلاج طالما تبادل جهاز المناعة وذلك لمنع رفض الكلية الممزروعة.

إذا تناولت بالخطأ مقدارًا دوائياً أكبر

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل أو شخصاً آخر بالخطأ من الدواء، توجه في الحال إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك أعلبة الدواء. من الجائز أن يحتاج الأمر لعلاج طبي. خذ معك الأقراص وأردها للطبيب أو للطاقم الطبي في المستشفى. إذا نفذت الأقراص، خذ معك العلبة الفارغة.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة حال تذكرك، إلا إذا اقترب موعد تناول الجرعة القادمة. واصل تناول الدواء في الأوقات المحددة. يجب إستشارة الطبيب.

لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

في حال توقفك عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن العلاج بأدوية، إلا بتعليمات من الطبيب. إن التوقف عن العلاج بـ ميفورتيك قد يزيد من خطورة رفض الكلية الممزروعة لديك.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ميفورتيك قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لأن تكون عاديًّا منها.

قد يعني المعالجون المسنون من أعراض جانبية أكثر بسبب جهاز مناعة أكثر ضعفًا.

رفض المضادات الحيوانية، بما فيها ميفورتيك، فإن قدرة بيسمل على محاربة الملوثات تكون أضعف من المعتاد. لذا، إذا كنت تتناول ميفورتيك، فأنت قد تتعاني من تلوثات أكثر من المعتاد.

تشمل: تلوثات الدماغ، الجلد، الفم، المعدة والأمعاء، الرئتين والجهاز البولي.

يجري لك الطبيب فحوص دم منتظمة وذلك لمراقبة التغيرات بعد خلايا الدم أو بنسـ

مواد أخرى في الدم مثل السكر، الشحوم والكوليسترول.

بعض الأعراض الجانبية قد تكون خطيرة:

يجب التوجه في الحال إلى الطبيب إذا:

- لديك أعراض تلوث تشمل سخونة، شعريرة، تعرق، الشعور بإرهاق، نعاس، أو قلة الحرارة، إذا كنت تتعالج بـ ميفورتيك، فأنت قد تكون حساسًا أكثر من المعتاد للتلوثات التيبروسية، الجرثومية والفالترية. من شأن هذا الأمر أن يؤثر على أجهزة مختلفة من الجسم، حيث أن أكثرها شيوعاً هي الكلى، المثانة البولية والمسالك التنفسية العليا / أو السفلية.
- كنت تعاني من تقيؤات دموية، براز أسود أو دموي، قرحة في المعدة أو الأمعاء.
- لديك تضخم في الغدد، أورام جلدية أو تضخم في الأورام الحالية، أو تغير في الشفاه، حرقان، تغير لون الشمامات الحالية. بالمشابه لما قد يحدث لدى المرضى المعالجين بأدوية لتثبيط جهاز المناعة، فإن عدد قليل جدًا من المرضى المعالجين بـ ميفورتيك تطور لديهم سرطان في الجلد أو في العقد المفاواة.

أعراض جانبية أخرى:

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- إنخفاض نسبة خلايا الدم البيضاء.
- تناقص نسبة الكالسيوم في الدم (hypocalcaemia).
- تناقص نسبة البوتاسيوم في الدم (hypokalemia).
- إرتفاع نسبة حمض البول في الدم (hyperuricemia).
- إرتفاع ضغط الدم.
- قلق.
- إسهال.
- ألم في المفاصل (arthralgia).

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-100 مستعملين من بين 100:

- إنخفاض نسبة خلايا الدم الحمراء الذي قد يسبب إرهاق، ضيق تنفس وشحوب (فقد دم).
- سخونة، ألم في الحنجرة، تلوثات متكررة (أعراض محتملة لقلة الخلايا البيضاء في الدم إفقار المحببات).
- إنخفاض نسبة الصفيحات الدموية الذي قد يسبب نزف وظهور كدمات غير متوقعة (قلة الصفيحات الدموية).
- إرتفاع نسبة البوتاسيوم (hyperkalemia).
- إنخفاض نسبة المغنيزيوم (hypomagnesemia).
- دوار.
- صداع.
- سعال.
- ضغط دم منخفض.
- ضيق تنفس.

• ألم في البطن أو المعدة، إلتهاب جدار المعدة، نفخة في البطن، إمساك، صعوبات في الهضم، غازات، براز لين، غثيان، تقيؤات.

- إرهاق، سخونة.
- عدم سلامـة تـائـج فـحـوصـ وـظـافـ الـكـبدـ أوـ الـكـلـيـةـ.
- تلوث في الطرق التنفسية.
- حب الشباب.
- ضعـفـ (وهـنـ).
- ألم عضـلـيـ (myalgia).
- إنـفـاخـ رـاحـيـ الـيـدـيـنـ،ـ الـكـالـحـلـيـنـ أوـ الـرـجـلـيـنـ (أـعـراضـ محـتمـلـةـ لـوـذـمـةـ مـحـيـطـيـةـ).
- حـكةـ.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- ضربات قلب سريعة أو نظم غير منتظم لضربات القلب (ventricular extrasystoles).
- إحتقان (وذمة) في الرئة.
- كيسة تحتوي على سائل لمفي.
- رجفة، صعوبات في النوم.
- أحمرار وإنفاس العينين (التهاب الملتحمة)، تشوش الرؤية.
- أصوات تنفس تشبه الصفير (wheezing).
- تجشؤ، رائحة سيئة من الفم، إنسداد الأمعاء، تقرحات في الشفة، حرقان، تغير لون اللسان، بقع الفم، التهاب اللثة، إلتهاب الغشاء الصفاقـيـ (peritonitis) في البطن، إنسداد الغدد اللعـابـيةـ، إلتهاب الغشاء الصفاقـيـ (peritonitis) تلوث في العظام، الدم وفي الجلد.
- بول دموي، تضرر الكلى، ألم وصعوبة في التبول.
- تساقط الشعر، كدمات في الجلد.
- إلتهاب المفاصل (arthritis)، ألم في الظهر، تقلصات عضلية.
- فقدان الشهـيـةـ للـطـعـامـ،ـ إـرـفـاقـ نـسـبـةـ شـحـومـ الدـمـ (ـفـرـطـ شـحـومـ الدـمـ)،ـ السـكـرـ (ـدـاءـ السـكـريـ).
- الكوليسترول (ارتفاع الكوليسترول في الدم) أو إنخفاض نسبة الفوسفاتـ (ـفـوـسـفـورـ).
- في الدم.
- أعراض الإنفلونزا (مثل: إرهاق، شعريرة، ألم في الحنجرة، ألم في المفاصل أو العضلات)، إنفاس الكالحين وراحـيـ القـدمـينـ،ـ ألمـ،ـ رجـفةـ،ـ ضـعـفـ أوـ الشـعـورـ بـالـعـطـشـ.
- أحـلامـ غـرـبـيـةـ،ـ أـفـكارـ باـطـلـةـ (ـأـوهـامـ).
- عدم القدرة على تحقيق أو حفاظ على إنتصـابـ العـضـوـ التـانـاسـيـ.
- سعال، صعوبات في التنفس، ألام أثناء التنفس، ألام أثناء التنفس (أعراض محتملة لمرض رئوي خالي).

أعراض جانبية ذات شعـوـيـةـ غيرـ مـعـرـوـفـ (ـلـيـسـ بـإـلـمـكـ إـلـمـ تـقـدـيرـ الشـيـوـعـ منـ المـعـلـومـاتـ المـتـوـفـرـةـ):

- طفح.
- سخونة، ألم في الحنجرة، تلوثات متكررة (أعراض محتملة لقلة الخلايا البيضاء في الدم إفقار المحببات).

أعراض جانبية ذات شعـوـيـةـ غيرـ مـعـرـوـفـ (ـلـيـسـ بـإـلـمـكـ إـلـمـ تـقـدـيرـ الشـيـوـعـ منـ المـعـلـومـاتـ المـتـوـفـرـةـ):

- ميفورتيك 180 ملغ: أغراض مطلية، مستديرة، لونها أحـضـرـ لـيـمـونـيـ،ـ ذاتـ أـطـرافـ مـاـلـةـ مـطـبـوعـ عـلـيـهاـ "ـCـ"ـ منـ جـانـبـ وـاحـدـ لـلـقـرـصـ.

ميفورتيك 360 ملغ: أغـراضـ مـطـلـيـةـ،ـ مـسـتـدـيـرـ،ـ لـوـنـهـاـ أحـمـرـ/ـبـرـتـالـيـ شـاحـبـ،ـ مـطـبـوعـ عـلـيـهاـ "ـCTـ"ـ منـ جـانـبـ وـاحـدـ لـلـقـرـصـ.

حجم العلبة: 120 قرصًا.

اسم صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: نوفاريس إسرائيل م.ض، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم تحديدها في تشرين الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ميفورتيك 180 ملغ: 128 30 30715
ميفورتيك 360 ملغ: 128 33 30716

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

<https://sideeffects.health.gov.il>

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي و مجال رؤية الأطفال / أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
- التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين درجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية. يجب حمايته من الرطوبة.
- يجب الحفظ في العلبة الأصلية.
- لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت تلاحظ أن العلبة مخطوطة أو عليها علامات تلف.
- لا يجوز رمي الدواء في سلة القمامة أو في المغسل. يجب إستشارة الصيدلي حول كيفية التخلص من دواء لم تعد بحاجته. يساعد هذا الأمر في حماية البيئة.

6) معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا:

Lactose anhydrous, crospovidone, povidone (K-30), maize starch, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate.

مكونات طلاء القرص:

ميفورتيك 180 ملغ -

Hypromellose phthalate, titanium dioxide (CI 77891, E-171), iron oxide yellow (CI 77492, E-172), indigotine ميفورتيك 360 ملغ -

Hypromellose phthalate, titanium dioxide (CI 77891, E-171), iron oxide yellow (CI 77491, E-172) يحتوي كل قرص من ميفورتيك 180 ملغ على 45 ملغ لكتوز لامائي (anhydrous) و 13 ملغ صوديوم.

يحتوي كل قرص من ميفورتيك 360 ملغ على 90 ملغ لكتوز لامائي (anhydrous) و 26 ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

ميفورتيك 180 ملغ: أغـراضـ مـطـلـيـةـ،ـ مـسـتـدـيـرـ،ـ لـوـنـهـاـ أحـمـرـ/ـبـرـتـالـيـ شـاحـبـ،ـ مـطـبـوعـ عـلـيـهاـ "ـCـ"ـ منـ جـانـبـ وـاحـدـ لـلـقـرـصـ.

ميفورتيك 360 ملغ: أغـراضـ مـطـلـيـةـ،ـ مـسـتـدـيـرـ،ـ لـوـنـهـاـ أحـمـرـ/ـبـرـتـالـيـ شـاحـبـ،ـ مـطـبـوعـ عـلـيـهاـ "ـCTـ"ـ منـ جـانـبـ وـاحـدـ لـلـقـرـصـ.

حجم العلبة: 120 قرصًا.

إسم صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: نوفاريس إسرائيل م.ض، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم تحديدها في تشرين الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ميفورتيك 180 ملغ: 128 30 30715
ميفورتيك 360 ملغ: 128 33 30716

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عـلـجـ دـوـاـيـ"ـ (ـwww.health.gov.ilـ)ـ الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو بتنصـفـ الرابـطـ التـالـيـ:

<https://sideeffects.health.gov.il>