

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أوفلودكس، أقراص

يحوي كل قرص من 200 ملغ من أوفلوكساسين (ofloxacin)

الماد غير الفعالة والسليبة للحساسية في الدواء – أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية، والبند 2 – «معلومات مهمة» عن بعض مركبات الدواء.

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا كانت لديك أسئلة أخرى، أسأل الطبيب أو الصيدلي.

تد وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعمله لأكثرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدأ لك أن حالتهم الطبية مشابهة للحالت.

- دواعي استخدام الدواء؟**

الدواء مخصص لعلاج التهابات البكتيرية التي تسببها البكتيريا الحساسة للأوفلوكساسين:

 - التهابات الجهاز التنفسي، التهابات الرئوية، التهابات الأنف والحنجرة، التهابات الكلى والمسالك البولية، التهابات والأعضاء التناسلية (بما في ذلك الأمراض التناسلية السيلينية)، والتهابات الجهاز الهضمي بما في ذلك التهابات الأمعاء الجرثومية، والتهابات الأنسجة الرخوة والتهابات الجلد، والتهابات العظام والمفاصل.

الجموعة الدوائية: المضادات الحيوية التي تنتمي إلى عائلة الفلوروكينولون.

- قبل استعمال الدواء:**

يمنع استخدام الدواء في حال:

• كنت تعاني من حساسية للحادة الفعالة (أوفلوكساسين) أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6).

• كنت تتناول دواء يسمى «فيفونيغ» أو أدوية أخرى من عائلة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، كنت تتناول فيتامين K

• كنت تتناول فيتامين B12

• كنت تتناول أي صماد حيوي، فاستشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

• عانيت في الماضي من التهاب الأوتار بعد تناول المضادات الحيوية من عائلة الفلوروكينولون.

• تعاني من الصرع أو لديك تاريخ من النوبات أو التشنجات.

• تعاني من نقص في إنزيم الجلوكون 6 فوسفات ديهيدروجينيز (مرض وراثي يؤثر على خلايا الدم الحمراء). عند استعمال الدواء يمكن أن تتحلل خلايا الدم الحمراء وتسيب فقر الدم أو اليرقان.

• كنت حاملًا أو مرضعة.

• كنت حاملًا من 18 من عامًا، أو إذا كان عمرك يزيد عن 18 عامًا لكنت تعتقد أنك تزال في مراحل الحمل.

• تعاني من عدوى بكتيرية أو فطرية أو ميكسبة (MRSA) المقاومة للعشاد الحيوي ميثيسيلين.

• تعاني من اضطرابات في الرؤية.

ومتلازمة شوغرن [مرض مناعي ذاتي التهابي]، والأصابع (اعتلال عصبي) مثل الألم، الحساس بالحرقان، الوخز، التنميل و/ أو الضعف خاصة باليدين، والتهاب المفاصل اليرسي، ومرض بيهوت، وارتفاع ضغط الدم، أو ما يُعرف بتهصل الشريان والتهاب المفاصل الروماتويدي [التهاب المفاصل أو التهاب عضلة القلب] [تهاب القلب].

قبل تناول الدواء:

• يمنع تناول المضادات الحيوية مع عائلة ديهيدروجينيز / الكينولونات، بما في ذلك أوبلوكساسين، إذا كنت قد عانيت من آثار جانبية شديدة في الماضي أثناء استخدام الكينولونات أو الفلوروكينولونات. في هذه الحالة يجب إبلاغ الطبيب بأسرع ما يمكن.

• إذا كنت تعاني من آلم شديدة في البطن أو الصدرة أو الظهر، والتي قد تكون علامة عن تمدد الأوعية الدموية أو تمزق الأبر، فتوجه إلى غرفة الطوارئ على الفور.
يزداد الخطر إذا كنت تتعالج بالفوروكيتوسيريدات الهجازية.

• إذا بدأت تعاني من نوبات متكررة من ضيق التنفس، أو الظهر، والتي قد تكون علامة عن تمدد الأوعية الدموية، يجب إبلاغ الطبيب على الفور.
يزداد الخطر إذا كنت تتعالج بالفوروكيتوسيريدات الهجازية.

• إذا كنت تعاني من مرض عنقي في الماضي.
كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى.
تأكد من إبخبار طبيبك عن أي مشكلة في الكبد أو الكلى قبل البدء باستخدام هذا الدواء، حيث قد تكون هناك حاجة لخفض الجرعة.

• كنت تعاني من مرض في الجهاز العصبي يسمى ضعف العضلات الشدية (وهو العنضي بسيل) وهو مرض تكون فيه العضلات ضعيفة وتعب بسهولة.

• كنت مسنًا أو وضعت كل كورتيكوستيرويدات (تستخدم لعلاج الربو وأمراض الرئة المزمنة الأخرى)، لأنها قد تزيد من خطر التورم وآلم الأوتار.

• تعاني من ألم في السكبي.

• كنت تتناول دواء يسمى «فيفونيغ» أو أدوية أخرى من عائلة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، كنت تتناول فيتامين K

• كنت تتناول فيتامين B12

• كنت تتناول أي صماد حيوي، فاستشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

• عانيت في الماضي من التهاب الأوتار بعد تناول المضادات الحيوية من عائلة الفلوروكينولون.

• تعاني من الصرع أو لديك تاريخ من النوبات أو التشنجات.

• تعاني من نقص في إنزيم الجلوكون 6 فوسفات ديهيدروجينيز (مرض وراثي يؤثر على خلايا الدم الحمراء). عند استعمال الدواء يمكن أن تتحلل خلايا الدم الحمراء وتسيب فقر الدم أو اليرقان.

• كنت حاملًا أو مرضعة.

• كنت حاملًا من 18 من عامًا، أو إذا كان عمرك يزيد عن 18 عامًا لكنت تعتقد أنك تزال في مراحل الحمل.

• تعاني من عدوى بكتيرية أو فطرية أو ميكسبة (MRSA) المقاومة للعشاد الحيوي ميثيسيلين.

• تعاني من اضطرابات في الرؤية.

• في حالات نادرة قد تعاني من أعراض لتضرر الأعصاب (اعتلال عصبي) مثل الألم، الحساس بالحرقان، الوخز، التنميل و/ أو الضعف خاصة باليدين، والتهاب المفاصل الالتهابي، ومرض بيهوت، وارتفاع ضغط الدم، أو ما يُعرف بتهصل الشريان والتهاب المفاصل الروماتويدي [التهاب المفاصل أو التهاب عضلة القلب] [تهاب القلب].

قبل تناول الدواء:
• يمنع تناول المضادات الحيوية مع عائلة ديهيدروجينيز / الكينولونات، بما في ذلك أوفلوكساسين، إذا كنت قد عانيت من آثار جانبية شديدة في الماضي أثناء استخدام الكينولونات أو الفلوروكينولونات. في هذه الحالة يجب إبلاغ الطبيب بأسرع ما يمكن.

• إذا كنت تعاني من آلم شديدة في البطن أو الصدرة أو الظهر، والتي قد تكون علامة عن تمدد الأوعية الدموية أو تمزق الأبر، فتوجه إلى غرفة الطوارئ على الفور.
يزداد الخطر إذا كنت تتعالج بالفوروكيتوسيريدات الهجازية.

• إذا بدأت تعاني من نوبات متكررة من ضيق التنفس، أو الظهر، والتي قد تكون علامة عن تمدد الأوعية الدموية، يجب إبلاغ الطبيب على الفور.
يزداد الخطر إذا كنت تتعالج بالفوروكيتوسيريدات الهجازية.

• إذا كنت تعاني من مرض عنقي في الماضي.
كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى.
تأكد من إبخبار طبيبك عن أي مشكلة في الكبد أو الكلى قبل البدء باستخدام هذا الدواء، حيث قد تكون هناك حاجة لخفض الجرعة.

• كنت تعاني من مرض في الجهاز العصبي يسمى ضعف العضلات الشدية (وهو العنضي بسيل) وهو مرض تكون فيه العضلات ضعيفة وتعب بسهولة.

• كنت مسنًا أو وضعت كل كورتيكوستيرويدات (تستخدم لعلاج الربو وأمراض الرئة المزمنة الأخرى)، لأنها قد تزيد من خطر التورم وآلم الأوتار.

• تعاني من ألم في السكبي.

• كنت تتناول دواء يسمى «فيفونيغ» أو أدوية أخرى من عائلة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، كنت تتناول فيتامين K

• كنت تتناول فيتامين B12

• كنت تتناول أي صماد حيوي، فاستشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

• عانيت في الماضي من التهاب الأوتار بعد تناول المضادات الحيوية من عائلة الفلوروكينولون.

• تعاني من الصرع أو لديك تاريخ من النوبات أو التشنجات.

• تعاني من نقص في إنزيم الجلوكون 6 فوسفات ديهيدروجينيز (مرض وراثي يؤثر على خلايا الدم الحمراء). عند استعمال الدواء يمكن أن تتحلل خلايا الدم الحمراء وتسيب فقر الدم أو اليرقان.

• كنت حاملًا أو مرضعة.

• كنت حاملًا من 18 من عامًا، أو إذا كان عمرك يزيد عن 18 عامًا لكنت تعتقد أنك تزال في مراحل الحمل.

• تعاني من عدوى بكتيرية أو فطرية أو ميكسبة (MRSA) المقاومة للعشاد الحيوي ميثيسيلين.

• تعاني من اضطرابات في الرؤية.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناولون ، أو تتناول مؤخرًا، أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية وبالكلمات الغائبة، أخبر طبيبك أو الصيدلي. فإما إن كنت تتناولون:

• مضادات التخثر (خاصةً ما تمنع تخثر الدم، مثل وارفارين)، لأن مدة النزف قد تصبح أطول.

• مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل إندوميتاسين، سكرفلافك، نابزونين، مستحضرات الأنيبيوم، الحديد، المغنيسيوم، والزنك (أنظر القسم 3 – «كيفية استعمال الدواء»).

• الأدوية التي تتحكم في مستويات السكر في الدم (مثل جليبيكلاميد)، لأن تركيز هذه الأدوية في الدم قد يصبح أعلى وبالتالي يكون لها تأثير أكبر.

• التوفلياتي أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) يرجى إخباره طبيبك في ديكوفينين، ديكوفينول، فينوفين، لأن بعض الناس يصابون بنوبات صرع عند تناول هذه الأدوية مع الأوفلوكساسين.

• الأدوية التي قد تؤثر على وظائف الكلى (مثل ستيميتدين ، فزوفوسميد، أمبيوربين، بروبينيد، ميثونيرسكات)، حيث أن هذه الأدوية قد تزيد أحيانًا من مستويات الأوفلوكساسين في الدم.

• يجب أن تخبر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تغير معدل ضربات القلب الأوية التي تنتمي إلى مجموعة مضادات اضطراب النظم (مثل كينوليد، هيدروكيتدين، زيدورياميد، أمبيوران، سولتوكول، توليديل، إيبوتيليد، كيريتانيد)، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة مثل ميريتراين، كلوميبرامين، بعض المضادات الحيوية (التي تنتمي لمجموعة الماكروايد مثل إريثروميسين أو إرتروميسين)، وبعض الأدوية المضادة للذهان (مثل أولزانين، كلوزابين).

• **الحمل والرضاعة والخصوبة:**
• يجب إبلاغ طبيبك إذا كنت حاملًا أو مرضعة. هناك معلومات محدودة عن استخدام أوفلوكساسين لدى النساء الحوامل.

• من المعروف أن أفلوكساسين يفرز بكميات صغيرة مع حليب الثدي.

• **السياقة وتشغيل الآلات:**
• يجب إبلاغ طبيبك إذا كنت بحاجة إليها.

• **معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء:**
يحوي هذا الدواء عن أقل من 1 مليونيل موزيوم (23 ملغ) في كل قرص، بما يعني أنه عمليًا «خالٍ من الصوديوم».

• **كيفية استعمال الدواء**

• يجب دائمًا استعمال الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب. يجب عليك مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من الجرعة وطريقة تناول الدواء.

• الجرعة وطريقة العلاج يحددها الطبيب فقط. لا تتناول هذا الدواء أكثر من 8 ساعات متتالية.
بالنسبة لمرضى الكبد والمرضى الذين يعانون من اختلال وظائف الكلى، يسقوم الطبيب بتعديل الجرعة وفقًا لحالتهم.

• **الأطفال والمراهقون:**
أوفلودكس غير مخصص للاستخدام لدى الأطفال والمراهقين في مراحل النمو.

تناول الدواء:

• يجب ابتلاع الأقراص كاملة مع كوب كامل من الماء. يمكن سحق القرص عند خط القص في الجزء

• متساويين. لا توجد معلومات حول مضغ وطحن الأقراص.

• **تناول الدواء مع مضادات الحموضة، سكرانات، مستحضرات الأنيبيوم، الحديد، المغنيسيوم أو الزنك:**

• يجب الانتظار لمدة ساعتين عن الأقل بين تناول أوفلوكساسين وتناول أي من الأدوية المذكورة أعلاه، ولا فقد لا يعمل الدواء بشكل صحيح.

• **إذا تناولت جرعة كبيرة من الدواء بالخطأ:**
إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا بلع طفل الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ أو المستشفى. يرجى إخباره طبيبك في ديكوفينين، ديكوفينول، فينوفين، لأن بعض الناس يصابون بنوبات صرع حتى يمكن معرفة مدى الأضرار التي تسببها.

• يمكن أن تسبب القرص الزائدة الدم، والارتباك، والتشنجات، وفقدان الوعي، وإطالة فترة QT، والحساس بوجود أشياء غير موجودة، وانزعاش أو ارادي في الجسم والأطراف، والغثيان، ومشاكل شديدة في المعدة.

إذا نسيت تناول الدواء:

• إذا نسيت تناول القرص، فاقبلوا هذا العلاج (قد ما لم تكن موعد تناول القرص قريبًا. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

• يجب الاستمرار بالعلاج على النحو الموصى به من قبل الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

• حتى لو طرأ تحسن عن حالتك الصحية، لا توقفت عن تناول الدواء بدون استشارة الطبيب. إذا توقفت عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب، فقد تعود تلك الأعراض للظهور.

• لا تتناول الدواء في الظلام! تحقق من المصباح اليدوي للتحقق من وجود القرص في الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، أسأل الطبيب أو الصيدلي.

• **الأعراض الجانبية**
كما في أي دواء، قد يسبب استعمال أوفلوكساين أعراضًا جانبية عند بعض الأشخاص. لا تقزع من قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

• **أعراض جانبية تارة جدًا (أعراض تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من 10000):**
• قد قد الحساسية في كمية خلايا الدم الحمراء، والذي يسبب ضعف الجلد أو اصفراره، والتعب أو الضعف غير الطبيعي.

• اضطرابات في الرؤية الجانبية بعد تناول أنواع الخلايا المختلفة في الدم. يمكن أن تشمل الأعراض الحمى والتعب، والتهاب الحلق وتقرحات الفم والعضل والنزيف غير الطبيعي أو الدمع في المررة.

• أعراض غير عادية أو أمراض نفسية، اضطرابات في الحركات الإرادية مثل الارتعاش والتشنجات الإرادية. تغيرات في توتر العضلات، وبطء في الحركة.

• قد دقل تحسسي في العين أو الجلد حول العين.

• سبب أشعة الشمس (تفاعل حساس للضوء)، طفح جلدي التهابي (حمامي متعددة الأشكال).

• التهاب وتقرح في الفم، العينين، الأمعاء، الأعضاء

التناسلية. قد يكون هذا بسبب متلازمة ستيفنز

• جوسون أو انحلال البشرة النخري السمي وهي أعراض خطيرة.

• ضيق في الأوتار يشمل التهاب أو التمزق. خاصة إذا كنت مسنًا أو تتناول أيضًا الكورتيكوستيرويدات، مثل بريدنيزولون.

• التشنجات، الأرق، الكوابيس، القلق، الاكتئاب.

• مضادات الحموضة، الشعور بالرغبة في إبقاء الفم في غيره من اضطرابات العيون، الارتباك، الضباب في العينين، عدم الاستقرار، الارتعاش، اضطرابات الحسية، التنميل، الشعور «بالوخز والقرص»، وعدم وضوح الرؤية، الرؤية المزدوجة أو رؤية أوان غريبة، مشاكل في السمع أو فقدان السمع، حساسية الشدق والشم.

• التهاب يحتوي على دم.

• التهاب في الكبد يمكن أن يكون شديدًا. فقدان الشهية، يرقان في الجلد والعيون، بول داكن، تهيج أو تحسس في المعدة. جميع هذه الأعراض قد تكون إشارة لوجود مشاكل في الكبد والتي قد تشمل فشل الكلى الكفائي.

• تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية **بالوترة الموضحة أدناه:**
• أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدم من بين كل 1000):

• أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1 – 10 مستخدم من 10000):

• أعراض شديدة في التنفس، فقدان القدرة على التنفس، انخفاض ضغط الدم.

• أعراض شديدة في التنفس وضيق في التنفس.

• التهاب الأمعاء، التهاب في سبب النزيف.

• تسارع ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب).

• انخفاض ضغط الدم.

• أعراض شديدة في التنفس وضيق في التنفس.

• أعراض شديدة في التنفس وضيق في التنفس.

• اضطرابات في الرؤية الشبيهة (مثل هبات الحرارة)، فرفل التعرق، طفح جلدي قيحي.

• ارتفاع مستويات الكرياتينين في الدم.

• **أعراض جانبية تارة جدًا (أعراض تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من 10000):**
• قد قد الحساسية في كمية خلايا الدم الحمراء، والذي يسبب ضعف الجلد أو اصفراره، والتعب أو الضعف غير الطبيعي.

• اضطرابات في الرؤية الجانبية بعد تناول أنواع الخلايا المختلفة في الدم. يمكن أن تشمل الأعراض الحمى والتعب، والتهاب الحلق وتقرحات الفم والعضل والنزيف غير الطبيعي أو الدمع في المررة.

• أعراض غير عادية أو أمراض نفسية، اضطرابات في الحركات الإرادية مثل الارتعاش والتشنجات الإرادية. تغيرات في توتر العضلات، وبطء في الحركة.

• قد دقل تحسسي في العين أو الجلد حول العين.

• سبب أشعة الشمس (تفاعل حساس للضوء)، طفح جلدي التهابي (حمامي متعددة الأشكال).

• التهاب وتقرح في الفم، العينين، الأمعاء، الأعضاء

الحرقان، فقدان الحساس أو الألم (اعتلال العصبي)،

• التهاب الأوعية الدموية، وغالبًا ما يكون مصويًا وكذلك فقدان السمع، اضطرابات النوم، ضعف الذاكرة، وبطء جلدي.

• ضعف في العضلات والمفاصل وآلم في العضلات. اضطراب في وظائف الكلى قد يؤدي إلى فشل الكلى.

• التهاب في العين الأوتار.

• **أعراض جانبية تظهر بوترة غير معروفة (أعراض لم يتم تحديدها وتيرة ظهورها بعد):**

• يؤدي إلى تمزق الجلد في عدد خلايا الدم البيضاء يزيد من احتمال الإصابة بالعدوى.

• فقدان الوعي نتيجة انخفاض الحاد في مستويات السكر في الدم (بمجرد سكر الدم). أنظر القسم 2 – «خلال العلاج بالدواء».

• تسارع غير طبيعي في ضربات القلب، عدم انتظام في ضربات القلب قد يعرض الحياة للخطر، تغير في معدل ضربات القلب (يسمى «استطالة مقطع النهاب في الكبد يمكن أن يكون شديدًا. فقدان الشهية، يرقان في الجلد والعيون، بول داكن، تهيج أو تحسس في المعدة. جميع هذه الأعراض قد تكون إشارة لوجود مشاكل في الكبد والتي قد تشمل فشل الكلى الكفائي.

• تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية **بالوترة الموضحة أدناه:**
• أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدم من بين كل 1000):

• أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1 – 10 مستخدم من 10000):

• أعراض شديدة في التنفس، فقدان القدرة على التنفس، انخفاض ضغط الدم.

• أعراض شديدة في التنفس وضيق في التنفس.

• التهاب الأمعاء، التهاب في سبب النزيف.

• تسارع ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب).

• انخفاض ضغط الدم.

• أعراض شديدة في التنفس وضيق في التنفس.

• اضطرابات في الرؤية الشبيهة (مثل هبات الحرارة)، فرفل التعرق، طفح جلدي قيحي.

• ارتفاع مستويات الكرياتينين في الدم.

• **أعراض جانبية تارة جدًا (أعراض تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من 10000):**
• قد قد الحساسية في كمية خلايا الدم الحمراء، والذي يسبب ضعف الجلد أو اصفراره، والتعب أو الضعف غير الطبيعي.

• اضطرابات في الرؤية الجانبية بعد تناول أنواع الخلايا المختلفة في الدم. يمكن أن تشمل الأعراض الحمى والتعب، والتهاب الحلق وتقرحات الفم والعضل والنزيف غير الطبيعي أو الدمع في المررة.

• أعراض غير عادية أو أمراض نفسية، اضطرابات في الحركات الإرادية مثل الارتعاش والتشنجات الإرادية. تغيرات في توتر العضلات، وبطء في الحركة.

• قد دقل تحسسي في العين أو الجلد حول العين.

• سبب أشعة الشمس (تفاعل حساس للضوء)، طفح جلدي التهابي (حمامي متعددة الأشكال).

• التهاب وتقرح في الفم، العينين، الأمعاء، الأعضاء

كيفية تخزين الدواء

• تجنب التسدّم، يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول الأطفال و/ أو مجال رؤيتهم، وذلك لتجنب التسدّم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات مريحة من الطبيب.

• لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء الصلاحية لا تسدّن هذا الدواء بعد العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

• **شروط التخزين:** يجب تخزين الدواء في درجة حرارة أقل من 25 مئوية.

• **معلومات إضافية**
بالإضافة إلى العنصر الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على: Microcrystalline cellulose، hydroxypropylcellulose، sodium starch glycolate، hypromellose، magnesium stearate، titanium dioxide، macrogol.

كيف يفيد الدواء وما هو محتواه العلبي:
أقراص بيضاء مغطاة مع خط عرضي على كلا الجانبين.
أقدام البيعات المتعددة: 10 أو 20 قرصًا.
قد لا يتم تسويق جميع أشكال الدواء.

• حرر في 2 أبريل 2017 وفقًا لإجراءات الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحمدي بوزارة الصحة:
001-79-99-121-30

• من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بلغة المنكر.

• ومع ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل:

دكسل م .ض.

شارع دكسل 1، أور عكيّفًا 3060000، إسرائيل