

كالوبيا® شراب

المادة الفعالة وكemicتها بوحدة مقدار دوائي:
Pelargonium sidoides roots (1:8-10) (EPs® 7630) dried liquid extract
20 mg/7.5 ml
Extracting agent: ethanol 11% (w/w)

مستحضر سائل مجفف المستخرج من جذور النبات اللقاني البينداوي - بيلارجونيوم سيدوبيس (1:8-10)
20 mg/7.5 ml
سائل المستخلص: 11% إيثانول في الوزن.
لقانية كافة المواد الغير فعالة وموادات الحساسية في الدواء - أنتر بند 6.

اقرأ النشرة بامتعان حتى تنهيها قبل أن تستعمل الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى
الصيدلي.
 عليك تناول الدواء بحسب التعليمات في بند المقدار الدوائي في هذه النشرة.
استثمر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

عليك التوجه للطبيب في حال لم يطرأ تحسن على حالتك أو في حال طرأ تدهور على حالة طفلك بعد
7 أيام من استعمال الدواء.

1. لأى غرض مخصوص الدواء؟

الدواء كالوبيا شراب مخصوص:
- لاستعمال عند الرضم لدى البالغين ولدى أطفال فوق عمر سنة.
- لعلاج اعراض التهاب القصبات الحاد، يسمى أيضًا التهاب الشعب الهوائية في ماري التنس.
القصيبة العلاجية: دواء نباتي لعلاج السعال والزكام.
يمكن أن يقيس الرضم بأعراض مثل: سعال، نزلة، آلم في الحنجرة أو سخونة.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت أو طفلك:
- حساسًا (الرجي) للنبات اللقاني البينداوي (Pelargonium sidoides) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي
تحتويه الدواء. قائمة المركبات الإضافية مفصلة في البند 6.
- تعاني من مرض كبيدي حاد، حيث ليست هناك تجربة كافية بما يتعلق باستعمال هذا الدواء في هذه الحالات.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:
يجب استعمال الدواء في حال لم يطرأ تحسن على حالتك أو في حال طرأ تدهور في حال طفلك بعد 7 أيام من استعمال
الدواء في كل حالة سخونة والتي تستمر لمدة أيام ضيق نفس أو بلغم دموي.
يجب التوقف عن استعمال الدواء كالوبيا شراب والتوجه للطبيب في حال تطور أعراض التي من شأنها أن تشير
في أصلically إلى التهاب الشعب الهوائية (متلخصة العين) للأصفر، بول داكن، الم و خkim
فقط.

أطفال و مراهقون:

لا يجوز استعمال الدواء كالوبيا شراب لدى طفلك تحت عمر سنة، بما أنه لا توجد معلومات كافية بخصوص
استعمال هذا الدواء في هذه الأعمار. يجب الحضور لمنصبه من قبل الطبيب قبل الاستعمال، هذا نظرًا لاختصار عام أكبر
لدى الأطفال تحت عمر ستين حتى أربعة، في حال كان الطفل يعاني من سعال متواصل أو متكرر، يجب الحصول
لدى طفل من عمر ستين حتى أربعة، في حال كان الطفل يعاني من سعال متواصل أو متكرر، يجب الحصول
للحضور من قبل الطبيب قبل الاستعمال.

تفاعلات بين الأدوية والطعام:

إذا كنت تلتزم أو إذا كنت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات
غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، ليس معروفا فيما إذا هناك تفاعلات بين كالوبيا شراب وبين أدوية أخرى.

استعمال الدواء حول تأثير الطعام على استعمال الدواء:

لا توجد معلومات حول تأثير الطعام على استعمال الدواء.
الحمل والإرضاع:
لا يوجد استعمال كالوبيا شراب في الحمل والإرضاع وذلك لعدم وجود معلومات كافية بما يتعلق بالاستعمال
أثناء الحمل أو الإرضاع.

السيادة واستعمال الماكولات:

لا يوجد لكالوبيا شراب تأثير أو لديه تأثير غير ملحوظ على قدرة السيادة وتشغيل الماكولات.

معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء:
يحتوي الدواء كالوبيا شراب على كسيلينول. كل 2.5 مل شراب تحتوي على 0.027 وحدات تحويل
لكربيوهيدرات.

3. كيفية استعمال الدواء؟

علىك تناول المقدار الدوائي في حال عدم تناولك بشأن المقدار الدوائي وكيفية استعمال المستحضر.
المقدار الدوائي المعاد عادة:
لدى الكبار والمراهقين فوق عمر 12 سنة: 7.5 مل شراب 3 مرات في اليوم.
لدى الأطفال بين الأعمر 6-11 سنة: 5 مل شراب 3 مرات في اليوم.
لدى الأطفال بين الأعمر 1-5 سنوات: 2.5 مل شراب 3 مرات في اليوم.
لا يجوز تناول المقدار الدوائي الموصى به.

فترة الملاug بالدواء كالوبيا شراب:
بعد تخفيف أعراض المرض، يوصى بمواصلة العلاج بالدواء كالوبيا شراب لعدة أيام إضافية، وذلك لمنع عودة

عليك التوجه للطبيب في حال لم يطرأ تحسن على حالتك أو على حالة طفالك، أو في حال طرأ تدهور على حالتك
أو حالة طفالك بعد 7 أيام من استعمال الدواء.
لا يجوز تناول الدواء كالوبيا شراب لفترة تتدنى 3 أيام.

كيفية استعمال الدواء كالوبيا شراب:
يجب تناول الدواء كالوبيا شراب للبن في كل صباح، ظهر ومساء.
يجب الاستساغة بكميّة القپس المرفقة بعبوة المنتج.

تناول الدواء بالمقدار الدوائي الملازم من خلال الاستساغة يكفي القپس:
كما في القپس المرفق لعلوة المنتج تشمل 4 علامات معايرة، اثنان منها في كل جانب.
اقفتح القپس وأملأ بحدائق كلاين القپس حتى علامة الجرة الملاعة لك أو طفالك وقفًا للعمر.
الآن يمكن إعطاء الطفل أن يتبرك مباشرة من الكاب.
يجب تناول الدواء كالوبيا شراب متصلباً، وذلك لمنع الاختناق
وقت شرب الدواء.
يجب غسل الكاب فييناً بياء جار وتوجهها بعد كل استعمال.

في حال كنت تفضل استعمال ملقة، يجب بدايةً ببابا علامة الجرة الملاعة لطفلك بمساعدة كام القپس.
بعد ذلك، يجب نقل محتوى الكاب الملاعة.
يجب الحفاظ على غلق وتدوير السدادة بعد كل استعمال.

إذا تناولت أو طفلك بالخطأ قدرًا دوائياً مفرطاً عليك إبلاغ طفلك، حيث سيقرر هو فيما إذا كانت هناك حاجة
للتصرف على نحو ما ليس معروفا حتى الآن عن أعراض معينة في حال تناول جرعة الملاعة لك أو طفالك وقفًا للعمر.
تظهر الأعراض المائية المرصوفة في هذه الأعراض الطوارئ في المستشفى مصطلحة عنوة الدواء ممك.
إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المعتاد، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. حذف جرعة التالية في الوقت المعتاد
واستثمر الصيدلي أو الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة تحقق من الملصق والمقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع
النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسلنة إضافية بما يتعلق باستعمال الدواء، استثمر الطبيب
أو المصيلي.

4. أعراض جانبية

كما بكل دواء، قد يسبب استعمال كالوبيا شراب أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين.
لا تتفق من قراءة الأعراض الجانبية المفصولة فيما يلي تشمل كل الأعراض الجانبية التي تم التناول عنها خلال فترة العلاج
قائمة الأعراض الجانبية المفصولة فيما يلي تشمل كل الأعراض الجانبية التي تم التناول عنها خلال فترة العلاج
يجذر النبات اللقاني البينداوي (بيلارجونيوم سيدوبيس)، بما في ذلك حالات تناول مقدار دوائي مرتفع
وبالاستعمال طول الأداء.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) (يظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000) والتي تتلزم
عنابة خاصة:

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً للمساعدة الطبية عند ظهور مؤشرات لحساسية زادة

كما بكل دواء، قد يسبب استعمال كالوبيا شراب أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين.

لا تتفق من قراءة الأعراض الجانبية المفصولة فيما يلي تشمل كل الأعراض جانبية التي تم التناول عنها خلال فترة العلاج
يجذر النبات اللقاني البينداوي (بيلارجونيوم سيدوبيس)، بما في ذلك حالات تناول مقدار دوائي مرتفع
وبالاستعمال طول الأداء.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) (يظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000) والتي تتلزم
عنابة خاصة:

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً للمساعدة الطبية عند ظهور مؤشرات لحساسية زادة

كما بكل دواء، قد يسبب استعمال كالوبيا شراب أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين.

لا تتفق من قراءة الأعراض الجانبية المفصولة فيما يلي تشمل كل الأعراض جانبية التي تم التناول عنها خلال فترة العلاج
يجذر النبات اللقاني البينداوي (بيلارجونيوم سيدوبيس)، بما في ذلك حالات تناول مقدار دوائي مرتفع
وبالاستعمال طول الأداء.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) (يظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000) والتي تتلزم
عنابة خاصة:

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً للمساعدة الطبية عند ظهور مؤشرات لحساسية زادة

كما بكل دواء، قد يسبب استعمال كالوبيا شراب أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين.

لا تتفق من قراءة الأعراض الجانبية المفصولة فيما يلي تشمل كل الأعراض جانبية التي تم التناول عنها خلال فترة العلاج
يجذر النبات اللقاني البينداوي (بيلارجونيوم سيدوبيس)، بما في ذلك حالات تناول مقدار دوائي مرتفع
وبالاستعمال طول الأداء.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) (يظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000) والتي تتلزم
عنابة خاصة:

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً للمساعدة الطبية عند ظهور مؤشرات لحساسية زادة