

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبية فقط



محتوي كل قرص على:

موكسيفلوكساسين (على شكل هيدروكلوريد) 400 ملغ 400 mg. moxifloxacin (as hydrochloride)
المواد غير الفعّالة ومُسيّبات الحساسية: انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء"، والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصِفَ هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخريين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1) لم أعد هذا الدواء؟

- ميجاكسين أقراص معدّ لعلاج المرضى الذين أعماهم أكثر من 18 عاماً لـ:
- عداوى في المسالك التنفسية – وتشمل على التهاب الجيوب الأنفية (sinusitis) الجرثومي الحاد.
- تفاقم التهاب القصبات الهوائية (bronchitis) المزمن. من يجب استعمال ميجاكسين أقراص لعلاج هذه العداوى فقط في حالات لا يمكن فيها استعمال أدوية أخرى مخصصة لعلاجها أو أن علاجها لم ينجح.
- حالات ليست شديدة من التهاب الرئتين. يجب استعمال ميجاكسين أقراص فقط في حالات لا يمكن فيها استعمال أدوية أخرى مخصصة لعلاج هذه العدوى.
- عداوى الجلد.

المجموعة العلاجية؛ مضاد حيوي من عائلة الفلوروكينولونات.

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كانت لديك حساسية (أرجية) لموكسيفلوكساسين، لأي مضاد حيوي من مجموعة الكينولونات الأخرى أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة المواد غير الفعّالة، انظر البند 6 "معلومات إضافية".

كنت حاملاً أو مرضعة.

كان عمرك أقل من 18 عاماً.

لديك ماضٍ طبي من مرض في الأوتار أو الاضطراب في الأوتار كان مرتبطاً بالعلاج بمضاد حيوي من نوع الكينولون (انظر البند 2 "تحذيرات خاصة متعلّقة باستخدام الدواء" و البند 4 "الأعراض الجانبية").

ولدتك مع أو عانيت من أية حالة مع وتيرة نظم قلب (*heart rhythm*) غير سليمة (شاهدت في فحص إيه. إي. جي. وهو تسجيل للنشاط الكهربائي للقلب الكهربي)، أو إذا كنت تعانٍ من اضطراب في تواتر اللمح (لا سيما مستوى منخفض من البوتاسيوم، أو المغنيسيوم في الدم)، لديك وتيرة نظم قلب (*heart rhythm*) بطيئة جداً (تدعى "بطء ضربات القلب")، قلبك ضعيف (قصور عمل القلب)، لديك ماضٍ من وتيرات نظم قلب (*heart rhythm*) غير سليمة، أو إذا كنت تتناول أدوية أخرى تسبب تغييرات استثنائية في فحص مخطط كهربية القلب (إيه. إي. جي.) (انظر لاحقاً "التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية").

ذلك لأن ميجاكسين أقراص قد يؤدي إلى تغييرات في فحص مخطط كهربية القلب، أي إبطاء منقطع QT، أي

إبطاء التوصيل في الإشارات القلبية.

كان لديك مرض كبد خطير أو ارتفاع إنزيمات الكبد (نقلات الإنزيم)، أعلى بـ 5 أضعاف من المستوى الطبيعي العلوي.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

قبل العلاج بميجاكسين أقراص:

لا يجوز تناول أدوية مضادات حيوية من نوع الفلوروكينولونات/الكنيولون، بما في ذلك ميجاكسين أقراص، إذا عانيت من عارض جانبي خطير في الماضي أثناء تناول كينولون أو فلوروكينولونات. في مثل هذه الحال، عليك إبلاغ طبيبك في أسرع وقت ممكن.

قبل العلاج بميجاكسين أقراص أخبر الطبيب إذا:

قد يعجز ميجاكسين أقراص **تخطئ نظم القلب لديك (إيه.إيه.جي.)**، لا سيما إذا كنت امرأة أو إذا كنت مسناً. إذا كنت تتناول الآن أي دواء **لخفض مستوى البوتاسيوم في دمك**، استشر طبيبك قبل تناول ميجاكسين أقراص (انظر البند 3 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء") و"الأعراض الجانبية" و"الأعراض والإخصاب".
تأثيرات **التهاب المفصّل الحادّ** (*Acute hemorrhagic necrotizing arthropathy*) و**برنات وأورح قهوية** بعد تناول موكسيفلوكساسين.
كنت تعاني من **داء الصرع** أو من حالة قد تسبب لديك **الاختلاجات**، استشر طبيبك قبل تناول ميجاكسين أقراص.
لديك أو كان لديك في الماضي **أية مشاكل نفسية**، استشر طبيبك قبل تناول ميجاكسين أقراص.
كنت تعاني من **الوهن العضلي الوبيل (myasthenia gravis)**، لا تتناول ميجاكسين أقراص قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مرضك. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من ذلك، استشر طبيبك فوراً.

شخصٌ لديك توسع أو "بروز" في وعاء دموي كبير (تتمدد الأوعية الدموية في الأبهى أو تمدد الأوعية الدموية في وعاء دموي محيطي كبير).

تعرضت لحادثة سابقة من **تمزق الأبهى** (تمزق في جدار الأبهى).

شخصٌ لديك تسرب في صمامات القلب (قصور عمل صمامات القلب).

لديك ماضٍ عائلي من **تمدد الأوعية الدموية الأبهية** أو **تسلخ الأبهى** أو مرض خلقي في صمامات القلب أو عوامل خطر أخرى أو أن حالات مسبقة (مثلاً: اضطرابات في نسج ضام مثل متلازمة مارفان (Marfan syndrome) أو متلازمة إهلرز دانلوس (Ehlers-Danlos syndrome) (متلازمة تورنر (Turner syndrome)، متلازمة شوغرن (Sjögren’s syndrome) مرض التهابي مناعي ذاتي، أو اضطراب في الأوعية الدموية مثل داء تكاييسو (Takayasu arteritis)، التهاب الشرايين الصدعي (Giant cell arteritis)، مرض بهجت (Behcet’s disease)، ضغط دم مرتفع، أو إذا كان معروف لديك عن الإصابة بتصلب الشرايين، التهاب المفاصل الروماتويدي (مرض في المفاصل) أو التهاب الشغاف (عدوى في القلب)).

كنت تعاني من **السكري**، لأنك قد تكون معرضاً لأخطر حدوث **تغيير في مستويات السكر** في أثناء تناول موكسيفلوكساسين.

كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك من **نقص نازعة الهيدروجين جلوكوز 6 فوسفات (G6PD)** (مرض وراثي نادر)، أخبر طبيبك، للحصول على استشارة معاً إذا كان ميجاكسين ملائماً لك.

أثناء تناول ميجاكسين أقراص

أخبرت ضربات قلب أو نبضاً غير منتظم أثناء فترة العلاج، عليك إبلاغ طبيبك فوراً. يُحتمل أن يطلب/تطلب منك أن تخضع لفحص مخطط كهربية القلب لفحاش وتيرة نظم (*heart rhythm*) قلبك.

ارتفع ضغط خصلك دون مشاكل **قلبية** مع ارتفاع الجرعة. لهذا يجب متابعة الجرعة الموصى بها.
هناك احتمال أن تبدأ تتعرض **لحم أحمر في البرص** (**مفاجئ** و **دفع تائي**/صدمة)، وذلك عند تناول الجرعة الأولى أيضاً، ويكون مصحوباً بالأعراض التالية: **ضعف في الصدر**، شعور بالدوار، شعور بالإعياء أو الإغماء، أو أنك تشعر بدوار عندما تقف. إذا حدث ذلك، **توقف عن تناول ميجاكسين أقراص وتوجه للحصول على استشارة طبية**.

قد يؤدي ميجاكسين أقراص إلى **التهاب سريع وخطير في الكبد**، الذي قد يسبب قصور عمل الكبد، ويشكل خطراً على الحياة (بما في ذلك حالات غامكة، انظر البند 4 "الأعراض الجانبية"). يرجى أن تتصل بطبيبك قبل أن تتابع تناول الدواء، إذا تطورت لديك علامات مثل شعور بالإعياء بشكل سريع وأو شعور بالغلغلي المرتبط باصفرار بياض العينين، بول داكن، حكة في الجلد، ميل للزئيف أو مرض في الدماغ ناتج عن مشكلة في الكبد (أعراض لنقص أداء الكبد أو التهاب سريع وخطير في الكبد).

أعراض جلدية خطيرة: أعراض جلدية خطيرة بما في ذلك متلازمة ستيفنس جونسون Stevens-Johnson syndrome – SJS، **تقرح الجلد الخطير (toxic epidermal necrolysis)** و**طفح بثري مميم حاد (AGEP – acute generalised exanthematous pustulosis)** تم الإبلاغ عنها عند تناول موكسيفلوكساسين.

Stevens-Johnson syndrome – SJS: في البداية، قد يظهر الطفح على شكل قنطار ممتزكة أو بقع مستديرة مع برنات في مركزها غالباً. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر فروح في الفم، الحنجرة، الأنف، الأعضاء التناسلية والعينين (احمرار العيينين وتورهما). سبقت حالات الطفح الجلدية هذه غالباً حمى وأو أعراض شبيهة بالإنفلونزا. يمكن أن تتطور حالات الطفح هذه إلى تقرح الجلد الواسع، وتؤدي إلى مضاعفات تشكل خطراً على الحياة أو تسبب الوفاة.

AGEP – يظهر هذا الطفح في بداية العلاج كطفح أحمر، متضخم وواسع مع تواترات تحت الجلد وبنرات مصحوبة بجرارة. الموقع الأكثر انتشاراً لحدوثه هو في ثنايا الجلد، الظهر، والأطراف العلوية.

إذا تطور لديك طفح خطير أو أحد الأعراض الجلدية الأخرى، توقف عن تناول موكسيفلوكساسين، واتصل بطبيبك أو توجه لتلقي علاج طبي فوراً.

قد تسبب المضادات الحيوية من نوع الكينولون بما في ذلك ميجاكسين أقراص **اختلاجات**. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول ميجاكسين أقراص واتصل بطبيبك فوراً.

أعراض جانبية خطيرة، متوالية، مقيّدة، وقد تكون غير قابلة للإلتعاس.

هناك علاقة بين المضادات الحيوية المضادة للبكتيريا من نوع الفلوروكينولونات/الكنيولون، بما في ذلك ميجاكسين أقراص وبين الأعراض الجانبية النادرة جداً ولكنها خطيرة، ويستمر جزء منها وقتاً طويلاً (الأبهى متوالية أو سنوات)، مقيّدة أو قد تكون غير قابلة للإلتعاس. يشتمل ذلك على الألم في الأوتار، العضلات، والمفاصل في الأطراف العلوية والسفلية؛ صعوبة في المشي، شعور شاذ مثل "إير وديابيس" لساعات، ددعة، نقص الإحساس أو حرقه (التقلية)، اضطرابات في الإحساس بما في ذلك ضرر في الرؤية، الطعم والسعم، الإكتئاب، الضرس، في الذّاكرة، تعب خطير واضطرابات خطيرة في النوم.

إذا اختبرت أحد هذه الأعراض الجانبية بعد تناول ميجاكسين أقراص، اتصل بطبيبك فوراً قبل متابعة العلاج. تقرر أنت وطبيبك بشأن متابعة العلاج وتفكران في العلاج بمضادات حيوية من مجموعة أخرى.

في أحيان نادرة، قد تتعرض **لأعراض ضرر عصبي (neuropathy)**، مثل ألم، حرقه، لسع، نقص الإحساس أو/و ضعف، لا سيما في راحتي القدمين وفي الساقين أو في اليدين والذراعين. إذا اختبرت هذه الحالة توقف عن تناول ميجاكسين أقراص وأخبر طبيبك فوراً، لمنع تطور حالة قد تكون غير قابلة للإلتعاس.

قد تعاني من **مشاكل نفسية**، وهي تحدث أيضاً عندما تتناول للمرة الأولى مضادات حيوية من نوع الكينولون، وتشتمل على ميجاكسين أقراص. في حالات نادرة جداً، أدى الإكتئاب أو المشاكل النفسية إلى أفكار انتحارية وسلوك للإضرار الذاتي مثل محاولات انتحارية (انظر البند 4 "الأعراض الجانبية"). إذا تطورت لديك هذه الأعراض، توقف عن تناول ميجاكسين أقراص وأخبر طبيبك فوراً.

قد تعاني من الإسهال أثناء تناول أو بعد تناول مضادات حيوية بما في ذلك ميجاكسين أقراص. إذا تفاقم أو استمر الإسهال أو لاحظت أن برازك يحتوي على دم أو مخاط، عليك التوقف عن تناول ميجاكسين أقراص فوراً واستشارة طبيبك. في مثل هذه الحال، لا يجوز لك تناول أدوية توقف أو تبطلئ التبرز.

قد يحدث **آلام وتورم في المفاصل، والتهاب أو تمزق الأوتار** في أحيان نادرة (انظر البند 2 أعلاه "لا يجوز استعمال الدواء أثناء"، و البند 4 "الأعراض الجانبية"). أنت معرض لخطر أعلى إذا كنت مسناً (عمر أكثر من 60 عاماً)، اجتزت زرع الأعضاء، لديك مشاكل في الكلى أو إذا كنت تتلقى علاجاً بالكرتيكوستيرويدات. يحدث التهاب وتمزق الأوتار خلال الـ 48 ساعة الأولى من بدء العلاج، وحتى أنهما قد يحدثان بعد بضعة أشهر من التوقف عن العلاج بميجاكسين أقراص. قد تظهر الأعراض لأول من الألم أو التهاب الوتر (مثلاً في كاحلك، المعصم، المرفق، الكتف أو الركبة)، توقف عن تناول ميجاكسين أقراص، واتصل بطبيبك، ودع المنطفة المولمة ترتاح. تجنب القيام بأي جهد جسماني لا داعي له، لأن ذلك قد يرفع خطر تمزق الوتر.

إذا شعرت **بالحمى، حاد في البطن، الصدور أو المغص**، فقد تشكل هذه الآلام أعراضاً لم الدم الأبهية أو تسلخ الأبهى، وتوجه حلاً إلى غرفة الطوارئ؛ وقد يكون الخطر أعلى إذا كنت تتلقى علاجاً بكرتيكوستيرويدات جهازية. إذا تعرضت لتسقيط قفصين أو سريع في التنفس، لا سيما بعد الاستلقاء بشكل أفقي في سريرك، أو إذا شعرت بتورم في الكاحلين، القدمين أو البطن، أو بحضبات قلب مفاجئة (شعور بنبض سريع أو غير منتظم)، عليك إبلاغ الطبيب فوراً.

إذا كنت مسناً وتعاني من **مشاكل في الكلى**، عليك أن تحرص على استهلاك كمية كافية من السوائل، لأن الجفاف قد يزيد خطر حدوث قصور الكلى.

إذا **تضررت نظر**ك، أو إذا تبين لك أن عينيك قد تضررتا بطريقة أخرى، استشر طبيب عيون فوراً (انظر لاحقاً "السبب/ة واستخدام الماكينات" و البند 4 "الأعراض الجانبية").

قد تسبب المضادات الحيوية من نوع الفلوروكينولونات **ارتفاع مستويات السكر لديك في الدم** أكثر من المستويات الطبيعية (*hyperglycemia*) أو **انخفاض مستويات السكر لديك في الدم** أقل من المستويات الطبيعية (*hypoglycemia*)، وقد تسبب فقدان الوعي (سبب السكرية) في حالات خطيرة (انظر البند 4 "الأعراض الجانبية"). إذا كنت تعاني من السكري يجب رصد مستوى السكر لديك في الدم بدقة.

قد تؤدي المضادات الحيوية من نوع الكينولون إلى أن يصبح **جذك حساساً أكثر لأشعة الشمس أو لأشعة UV**. عليك تجنب التعرض المتواصل لأشعة الشمس أو أشعة الشمس القوية ولا يجوز لك استعمال أسرة التسمّع أو أي مضاد UV آخر أثناء تناول ميجاكسين أقراص.

لم تُثبت نجاعة محلول موكسيفلوكساسين عبر الفم لتسريب لعلاج الحروق الخطيرة، العداوى في الأنسجة العميقة، وعداوى قدم السكري مع التهاب العظم والنقي (عداوى في نخاع العظم).

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفال والمراهقين دون جيل 18 عاماً، لأنه لم تثبت نجاعة وأمان استعماله لدى هذه الفئة العمرية (انظر أعلاه البند 2 "لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا").

التفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت **تتناول، أو قد تتناول مؤخرًا أو قد تتناول أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك**، لا سيما إذا كنت تتناول:

إذا كنت تتناول ميجاكسين أقراص وأدوية أخرى تؤثر في قلبك، هناك خطر متزايد لتغيير وتيرة نظم القلب (*heart rhythm*). لهذا، لا يجوز تناول ميجاكسين أقراص سوية مع الأدوية التالية:

- أدوية تنتمي إلى مجموعة مضادات اضطرابات النظم (*anti-arrhythmic drugs*) (مثلاً: كينيدين، هيدروكينيدين، ديسوبيراميد، إيوارون، سوتالول، توفينيد، إيبوتيليد)،

- أدوية مضادة للذهان (مثلاً: فينوثيازينات، بيمزويد، سرتيندول، هالوبيريدول، سولتوبريد)،

- بعض الأدوية المضادة للجراثيم (مثلاً: ساكوينافيير، سبارفلاكساسين، إريثروميسين للإعطاء داخل الوريد، بنتاميدين، أدوية مضادة للملاريا، لا سيما هالوفانترين)،

- بعض الأدوية المضادة للبهتانين (مثلاً: تريفينادين، إمتيميترول، ميزولاستين)،

- أدوية أخرى (مثلاً: سيسايريد، فينكاسميسين للإعطاء داخل الوريد، بيريدول، ديافيغمانيل).

عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تتناول أدوية إضافية قد تخفض مستويات البوتاسيوم في دمك (مثلاً: بعض الأدوية المدرّة للبول، بعض الأدوية المسهّلة والحقنات الشرجية [إبرعات عالية] أو كورتيكوستيرويدات [أدوية مضادة للالتهاب، أوميغابريسين B] أو الأدوية تسبب بطء نظم القلب (*heart rate*)، لأنها قد تزيد خطر حدوث اضطرابات خطيرة في نظم القلب (*heart rhythm*) أثناء تناول ميجاكسين أقراص.

أي دواء يحتوي على **مغنيسيوم أو ألومنيوم** (مضادات الحموضة لسرعات الهضم، أو أي دواء يحتوي على حديد أو زنك، دواء يحتوي على ديتيازولين أو دواء يحتوي على كورفام لعلاج اضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد يقلل عمل ميجاكسين أقراص. لهذا، يجب تناول ميجاكسين أقراص قبل أو بعد 6 ساعات من تناول دواء إضافي.

يقبل تناول الفحّم الطبي عبر الفم بالتوازي مع ميجاكسين أقراص فعالية ميجاكسين أقراص. لذلك، يُستحسن عدم استعمال هذه الأدوية معاً.

إذا كنت تتناول الآن مضادات التخشّر عبر الفم (مثلاً: وارفارين)، فقد يحتاج طبيبك إلى مراقبة أوقات تخشّر دمك.

استعمال الدواء والغذاء

لا تتأثر فعالية ميجاكسين أقراص بالطعام بما في ذلك بمنتجات الحليب.

الحمل، الإرضاع والإخصاب

لا يجوز تناول ميجاكسين أقراص إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، استشري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

لا تشير الأبحاث على الحيوانات أن هذا الدواء يلحق ضرراً بالإخصاب لديك.

السبب/ة واستخدام الماكينات

قد يسبب ميجاكسين أقراص شعوراً بالدوخة أو الدوار، وقد تتعرض لفقدان الرؤية المفاجئ والعابر أو قد تصاب بالإغماء لوقت قصير. إذا تعرضت لهذه الحالة، فلا تقُد سيارة أو تشغل ماكينات خطيرة.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي كل قرص على 68 ملغ مونوهيدرات التالكوز. إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل سكريات معينة، اتصل بطبيبك قبل البدء باستخدام ميجاكسين أقراص.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم من الصوديوم (23 ملليغراماً) في كل قرص مطلي، أي إنه في الواقع يعتبر "خالياً من الصوديوم".

3) كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها عادة هي قرص واحد في اليوم. عليك تناول الدواء في ذات الساعة من كل يوم تقريبا.

1)منع تجاوز الجرعة الموصى بها.

ليست هناك معلومات حول الحقن/القطر/المضغ.

عليك ابتلاع القرص بأكامل (للتغلب على الطعم المر) مع أو دون طعام. يجب شرب الكثير من السوائل أثناء تناول ميجاكسين أقراص.

لا داعي إلى ملامعة الجرعة لدى المرضى المسنين، المرضى ذوي وزن منخفض أو المرضى الذين لديهم مشاكل في الكلى.

من المهم أن تكمل سيرورة العلاج حتى النهاية، حتى إذا بدأت تشعر أفضل بعد بضعة أيام. إذا توقفت عن تناول هذا الدواء في وقت مبكر، فقد لا تخفني العدوى لديك كلياً، قد تحدث العدوى ثانية أو تتفاقم حالتك، وقد تتطور لديك مقاومة للمضاد الحيوي.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى عليك إبلاغ الطبيب فوراً.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل خطأً من الدواء، توجهُ حلاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصحبتاً بمكعب عبوة الدواء.

إذا **تستفي تناول الدواء في الوقت المحدد**، يجب تناول جرعة فور تتذكرك في اليوم ذاته. إذا لم تتناول الجرعة في اليوم ذاته، عليك تناول جرعتك الاعتيادية (قرص واحد) في اليوم التالي. لا تتناول أكثر من جرعة واحدة من ميجاكسين أقراص في يوم واحد. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تناول الدواء استشر الطبيب أو الصيدلي.

إذا **توقفت عن تناول ميجاكسين أقراص**، إذا توقفت عن تناول هذا الدواء في وقت مبكر، فقد لا تخفني العدوى لديك كلياً. استشر الطبيب إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول الأقراص قبل انتهاء سيرورة العلاج.

يجب المداموة على العلاج وفقاً لتوصية الطبيب.

لا يجوز تناول أية جرعات أو إيقاف تناول ميجاكسين أقراص حتى إذا شعرت بأنه طراً تحسن على حالتك الصحية، حتى انتهاء العلاج الذي وصفه لك الطبيب، إلا إذا:

شعرت بأعراض جانبية في الأوتار (انظر البند 2 "تحذيرات خاصة متعلّقة باستخدام الدواء" وكذلك البند 4 "الأعراض الجانبية").

تطورت لديك مشاكل في الأعصاب (انظر البند 2 "تحذيرات خاصة متعلّقة باستخدام الدواء" وكذلك البند 4 "الأعراض الجانبية").

شعرت بمشاكل في الجهاز العصبي المركزي (انظر البند 2 "تحذيرات خاصة متعلّقة باستخدام الدواء" وكذلك

