

	עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד
זאפה 5, 7.5, 10 טבליות	זאפה ODT 5, 10 טבליות מסיסות בפה

הרכב:

כל טבליה של **זאפה 5** מכילה: אולנזפין 5 מ"ג

Olanzapine 5 mg

כל טבליה של **זאפה 7.5** מכילה: אולנזפין 7.5 מ"ג

Olanzapine 7.5 mg

כל טבליה של **זאפה 10** מכילה: אולנזפין 10 מ"ג

Olanzapine 10 mg

כל טבליה **מסיסה בפה** של **זאפה 5 ODT** מכילה: 5 מ"ג

Olanzapine 5 mg

כל טבליה **מסיסה בפה** של **זאפה ODT 10** מכילה: אולנזפין 10 מ"ג

Olanzapine 10 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה פרק 6 "מידע נוסף"

וסעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בפרק 2.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

מידע חיוני אודות התכשיר:

תכשירים אנטי-פסיכיאטיים (כגון **זאפה וזאפה ODT**) עלולים להעלות את הסיכון למותם באנשים מבוגרים הסובלים מבלבול, אובדן זיכרון וקשר למציאות (דמנציה הקשורה לפסיכוזה). התכשיר אינו מיועד לטיפול בפסיכוזה במבוגרים הסובלים מדמנציה.

זאפה וזאפה ODT מיועדות למבוגרים מעל גיל 18.

1. למה מיועדת זאפה וזאפה ODT?

לטיפול אקוטי ואחזקתי בסכיזופרניה.

זאפה וזאפה ODT מותוות לטיפול בתסמינים של הפרעות פסיכיאטיות.

זאפה וזאפה ODT מותוות לטיפול קצר טווח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים להפרעה דו קוטבית l.

מניעה של הישנות בהפרעה דו קוטבית:

בחולים שהתקף המאניה שלהם הגיב לטיפול באולנזפין, **זאפה וזאפה ODT** מותוות למניעה של הישנות בחולים עם הפרעה דו קוטבית.

טיפול משולב בהפרעה דו קוטבית l:

השילוב של **זאפה וזאפה ODT** עם ליתיום או ואלפראט מותווה לטיפול קצר טווח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים להפרעה דו קוטבית l.

קבוצה תרופיסית: תרופות אנטי-פסיכיאטיות א-טיפיות.

התסמינים של סכיזופרניה כוללים שמיעת קולות, ראיית דברים שאינם קיימים, אמונה בדברים שאינם נכונים, חשדנות וניתוק. התסמינים של הפרעה דו-קוטבית מסוג l כוללים לסירוגין תקופות של דיכאון ושל מצב רוח מרומם או עצבנות. עליה בפעילות וחוסר מנוחה, מחשבות דהורות, דיבור מהיר, שינויים בתיאבון, התנהגות אימפולסיבית וירידה בצורך לישון.

התסמינים של דיכאון עמיד כוללים ירידה במצב הרוח, התעניינות נמוכה, עליה בתחושות אשמה, ירידה באנרגיה, ירידה בריכוז, שינויים בתיאבון ומחשבות או התנהגות אובדנית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להקריש (אלרגי) על אולנזפין או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים.

- למידע ספציפי על התוויות נגד של ליתיום או ואלפראט יש לעיין בסעיף התוויות נגד של העלונים המצורפים לאריזה של התכשירים אלה.

אהררת מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

• **זאפה וזאפה ODT** גורמות להפרעה ביכולת הגוף להפחית מפרסורטור. יש להימנע ממעבים בהם ייתכן עליית יתר בחום הגוף והתייבשות, כגון פעילות גופנית מוגברת או שאייה תכופה במקומות חמים. יש להקפיד על שתיית נוזלים כדי למנוע התייבשות.

• **זאפה וזאפה ODT** עלולות לגרום לתךך דם במעבר משכיבה

לישיבה. התסמינים כוללים: סחרחורת, קצב לב מהיר או איטי, ובחלק מהחולים אף התעלפות. תופעה זו מתרחשת לרוב בתחילת הטיפול.

• **זאפה וזאפה ODT עלולות לגרום לישנוניות, תת לחץ דם במעבר משכיבה לשיבה ואי יציבות מוכיחה ותחושתיות שעוליים לגרום לפלילת וכתוצאה מ כך לשריפת ואפציות נוספות.** יש להשתמש בזהירות ולשקול יחס סיכון/תועלת במטופלים עם רקע רפואי או תרופות העלולים להגביר את הסיכון לגפירות.

- נצפתה עלייה במשקל בחולים שנטלו **זאפה וזאפה ODT**. יש לעקוב אחר המשקל באופן קבוע.
- יש לעקוב אחר רמות הסוכר והשומנים בדם כיוון ש**זאפה וזאפה ODT** עלולות לגרום לעליית מדידים אלו.
- במטופלים בעלי היסטוריה רפואית של רמות נמוכות של תאי דם לבנים, יש לבצע ספירות דם באופן קבוע בחודשים הראשונים לטיפול לצורך מעקב. **זאפה וזאפה ODT** עלולות לגרום לירידה ברמות תאי דם לבנים. יש לשקול הפסקת טיפול ב**זאפה וזאפה ODT** במציאת התסמין הראשון למצב זה. על מטופלים הסובלים מירידה ברמות תאי דם לבנים להיות תחת מעקב אחר הופעת חום או תסמינים אחרים המעידים על זיהום. במידה וישנם כאלו יש להפסיק את הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT** באופן מיידי.
- לא מומלץ לטויל **זאפה וזאפה ODT** בחולים מבוגרים הסובלים מדמנציה עקב היתכנות תופעות לוואי חמורות: נפילות, ישנוניות, בצקת היקפית, הלכיה משונה, בריחת שתן, לאות, עלייה במשקל, חולשה, חום, דלקת ריאות, יובש בפה, היות ויזואליות, שבץ ומוות.
- חולים סכיזופרניים ובפוליריים הינם בסיכון גבוה לביצוע ניסיונות התאבדות. לכן, בזמן הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT** יש לבצע מעקב צמוד אחר חולים אלו.
- יש להזהר במטופלים שסבלו בעבר או סובלים כעת מאצירת שתן, הגדלה של בלוטת הערמונית, עצירת או היסטוריה של חסימת מעיים, היות ושימוש ב**זאפה וזאפה ODT** במטופלים אלה עלול לגרום לתופעות כגון עצירות, יובש בפה וטכיכרדיה. מניסיון שהצטבר לאחר שיווק התרופה נמצא כי הסיכון לתופעות לוואי חמורות (כולל מקרי מוות)ה עלה בעת השילוב של **זאפה וזאפה ODT** עם תרופות אנטיכולינרגיות.

לפני הטיפול בזאפה וזאפה ODT ספר לרופא אם:

- הינן סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב.
- הינן סובל או סבלת בעבר משבץ או "מיני שבץ" (תסמינים שונים של שבץ).
- הינן סובל מבעיות בכבד, במערכת העיכול (כגון חסימה במעיים).
- הינן סובל מאלצהיימר.
- יש לך סרטן של.
- הינן חווה מחשבות אובדניות או פגיעה בעצמך. במקרה כזה עלך לנסות מיידיית לרופא או לחדר מיון.
- הינן סובל או סבלת בעבר מבלוטת ערמונית מוגדלת.
- הינן סובל או סבלת בעבר מפרוסטים, סוכרת או רמות סוכר גבוהות בדם, ולחץ דם גבוה או נמוך, רמות גבוהות של כולסטרול או טריגליצרידים בדם.
- הינן מרבה בפעילות גופנית או שווה במקומות חמים לעיתים תכופות.
- יש לך היסטוריה של שימוש לרע בתרופות.
- הינן רגיש לשון קלזשו או לתרופה כלשהי.
- הינן רגיש לקטזון - **זאפה:** תרופה זו מכילה לקטוז העלול לגרום לגרישות אצל אנשים הרגישים ללקטוז. **זאפה ODT:** תרופה זו מכילה מנטל ואצטלפאם אשלן.
- הינן סובל מכל בעיה רפואית אחרת.

עישון:

אם הינן מעשן - יש לדווח על כך לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

בדיקות מעקב:

יש לעקוב בתחילת ובמשך הטיפול אחר רמות הסוכר בדם. במיוחד אם הינן סובל מסוכרת או רמותו סוכר גבוהות (100-126 mg/dL בצום).

- יש לעקוב אחר רמות השומנים בדם (כולסטרול וטריגליצרידים), במיוחד בחולים הסובלים מהפרעות ברמות שומני הדם או מוגרמי סיכון לפתח הפרעות אלה. יש לבצע בדיקות דם לרמות שומנים בדם בתחילת הטיפול ובמהלכו גם אם אינן סובל מתסמינים כלשהם.

עלייה במשקל הינה תופעת לוואי נפוצה בטיפול ב**זאפה וזאפה ODT**. יש לקחת זאת בחשבון טרם תחילת הטיפול ולבצע בדיקות מעקב שגרתיות אחר המשקל.

במטופלים עם היסטוריה של רמות נמוכות של תאי דם לבנים, יש

לעקוב אחר רמות תאי דם לבנים בחודשים הראשונים לטיפול. יש לשקול הפסקת הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT** בהופעת התסמין הראשון המשמעותי המצביע על ירידה בתאי דם לבנים.

תגובות לן תרופות:

אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות לנליל מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- דיאפאם - מתן בן זמנית של **זאפה או זאפה ODT** ודיאפאם עלול לגרום לתת לחץ דם במעבר משכיבה לשיבה (אורטוסטטי).
- תרופות המשפיעות על האנזים CYP1A2 כגון: קארבאמאזפין, פלבוקסאמין, אומפראזול וריפאמפיצין - עלולות להשפיע על רמות אולנזפין בדם.
- תרופות המכילות פחם פעיל - עלולות להפחית את הספיגה של אולנזפין.
- תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית כגון תרופות להרגעה, תרופות לדיכאון ותרופות לשינה, תרופות לאפילפסיה - יש להיזהר במתן בו זמני של תרופות אלה ואולנזפין.
- תרופות להורדת לחץ הדם - אולנזפין עלול להגביר את אפקט הורדת לחץ הדם במתן משולב עם תרופות אלה.
- תרופות מתקוות פעילות דופמין (כגון התרופה לטיפול בפרקינסון - לבדופג) - אולנזפין עלול לעכב פעילות תרופות אלו.
- תרופות אנטיכולינרגיות - שילובן יחד עם **זאפה וזאפה ODT** עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי חמורות במערכת העיכול הנובעות מירידה בתנועתיות מערכת העיכול.

שימוש בתרופה מונון:

ניתן לטויל **זאפה וזאפה ODT** עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

הימנע מצריכת אלכוהול בזמן שימוש ב**זאפה וזאפה ODT**. שתיית אלכוהול בזמן נטילת **זאפה וזאפה ODT** עלולות לגרום לך להיות לבדופג) - אולנזפין עלול לעכב פעילות תרופות אלו.

יתר ישינוי בהשוואה לנטילת **זאפה וזאפה ODT** ללא אלכוהול.

הריון, הנקה ופוריות:

היריון

ההתייעץ עם הרופא אם הרוקח לפני השימוש בתרופה. ההתייעץ עם הרופא אם הינן בהיריון או מתכננות היריון. לא ידוע אם **זאפה וזאפה ODT** פוגעות בעובר. ילודים עלולים לפתח תסמונת גמילה במידה והאם נטלה את התרופה בטרמיסטר האחרון (שלושת החודשים האחרונים) של ההיריון. תסמונת הגמילה כוללת את התסמינים הבאים: חוסר שקט, רעד, קשיון/חולשה בשרירים, ישנוניות, עצבנות, בעיות נשימה ובעיות במערכת האכלה. אם הינן שלך מתפתח אחד או יותר מהתסמינים הנ"ל, צרי קשר עם הרופא.

הנקה

התרופה עוברת לחלב אם. שוחחי עם הרופא לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך אם הינן נטלת **זאפה וזאפה ODT**.

פוריות

הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT** עלול לגרום לעלייה ברמת פרולקטין בדם, היכולה להוביל לפגיעה הפיכה בפוריות בנשים בגיל הפריון.

נהיגה ושימוש במכוונת:

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לישנוניות ולהשפיע על יכולת קבלת החלטות, חשיבה חדה או תגובה מהירה ועל כן מחייבת זהירות בנהיגה ברכב. בהפעלת מכוונת מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות. הימנע מכל פעילות שזכו עד שתבין כיצד **זאפה וזאפה ODT** משפיעות עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

הטיפול מכילה לקטוז. אם הרופא אמר לך שיש לך אי סבילות לסוגים מסוימים של סוכר, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל תרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. ייתכן והרופא יאצין לשנות את המינון עד למציאת המינון המתאים לך.

- יש לעבור על המנה המומלצת.**
- זאפה 5 וזאפה 10:** במידת הצורך ניתן לחצות את הטבליה לשימוש מיידי. אין מידע לגבי תכשיה או לעיסה של הטבליה. יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
- זאפה 7.5:** אין לחצות את הטבליה. אין מידע לגבי תכשיה או לעיסה של הטבליה. יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
- זאפה ODT:** יש להפריד יחידה אחת מארזית המגשית ולקלף להירות את הכיסוי. אין לדחוף את הטבליה. יש להוציא את הטבליה בידים יבשות ולהניח בפה בשלמותה מלי. הטבליה נמסה ברוק במהירות, לכן ניתן לבלוע אותה בקלות עם או בלי משקה.
- לא קיים מידע על התכשיר בשימוש בזונדה.

- יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.
- אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** אתה עלול לחוש רדום, לחוות הפרעה בדיבור, אגרסיביות או חוסר שקט, קצב לב מהיר וירידה ברמת ההכרה.
- אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
- אם שכחת לטויל את התרופה** בזמן הדרוש, קח את התרופה כשתיזכר. אם זה בסמוך למועד נטילת המנה הבאה, דלג על המנה הקח את המנה בזמן הרגיל. אל לטויל מנה כפולה.
- יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.
- גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אל להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא או הרוקח.
- כדי למנוע תופעות לוואי חמורות אין להפסיק נטילת זאפה וזאפה ODT בפתאומיות. אם עליך להפסיק לטויל זאפה וזאפה ODT, הרופא ינחה אותך כיצד לעשות זאת.**
- אין לטויל תרופות בחושיך בזק תהויות והמנה בלב פעם שהינן נוטל תרופה. הרכב משקשים אם הינן זקוק הכל.**
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**זאפה וזאפה ODT** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהר למקרה רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

זאפה וזאפה ODT עלולות לגרום לתופעות לוואי חמורות:

- עלייה בסיכון למות** במטופלים קשישים הסובלים מבלבול, אובדן זיכרון ואובדן קשר עם המציאות (פסיכוזה הקשורה בדמנציה).
- זאפה וזאפה ODT** אינן מיועדות לשימוש במטופלים קשישים הסובלים מדמנציה.

עלייה ברמות הסוכר בדם (היפרגליקמיה) עלולה להתרחש במטופלים הסובלים מסוכרת ובמטופלים שאינם סובלים מסוכרת. עלייה ברמות הסוכר בדם עלולה לגרום ל:

- קטואצידוזיס - עלייה ברמת חומצה בדם בעקבות הצטברות קטונים
- תרדמת (קומה)
- מוות

יש הרופא שלך לבצע בדיקות דם לרמות סוכר בדם לפני תחילת הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT** ובמהלכו. במטופלים שאינם סובלים מסוכרת, עלולה להתרחש עלייה ברמות הסוכר בדם בעת הפסקת הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT**.

מטופלים הסובלים מסוכרת וחלק מהמטופלים שלא סבלו מסוכרת תת תחילת הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT** צריכים לטויל תרופה להורדת רמות סוכר בדם בעת הפסקת הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT**.

במידה והינך סובל מסוכרת, על הרופא שלך להנחות אותך באיזו תדירות לבצע בדיקות דם לרמות סוכר בדם ביום נטילת **זאפה וזאפה ODT**.

יש לפנות לרופא במידה והינך סובל מתסמיני רמת סוכר גבוהה בדם:

- ציאנון מוגבר
- עלייה בתכיפות מתן שתן
- הרגשת רעב מוגברת
- חולשה ועייפות
- בחילה
- בלבול או ריח פירות מהפה
- עלייה ברמות שומנים (כולסטרול וטריגליצרידים) בדם** עלולה להתרחש במטופלים ב**זאפה וזאפה ODT**. יש הרופא שלך לבצע בדיקות דם לרמות כולסטרול ושומנים בדם בתחילת הטיפול ובמהלכו גם אם אינך סובל מתסמינים כלשהם.
- עלייה במשקל** נפוצה מאוד במטופלים ב**זאפה וזאפה ODT**. בחלק מהמטופלים ישנה עלייה קצונית במשקל. יש להתייעץ עם הרופא בנוגע לשמירה על המשקל כגון תזונה בריאה ופעילות גופנית.
- שכיחות מוגברת של שבץ או "מיני-שבץ" - אירוע אסכמי חוליך (TIA) בקרב קשישים הסובלים מפסיכוזה הקשורה בדמנציה** (קשישים הסובלים מאובדן קשר עם המציאות בעקבות בלבול ואובדן זיכרון). **זאפה וזאפה ODT אינן מאושרות עבור מטופלים אלה.**
- תסמונת נירולופטית ממאירה (Neuroleptic Malignant Syndrome)** - מצב נדיר אך חמור מאוד אשר עלול להתרחש במטופלים הנוטלים תרופות אנטי-פסיכיאטיות, כולל **זאפה וזאפה**

ODT, תסמונת נירולופטית ממאירה עלולה לגרום ומחייבת אשפות. יש לפנות מיד לרופא במידה והינך סובל מ:

- חום גבוה
- הזעה מוגברת
- גושקות שרירים
- בלבול
- שינויים בנשימה, דופק ולחץ דם

7. תופעת לוואי הכוללת אוזוניפיליה ותסמינים סיסטמיים (DRESS - Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms). תופעה זו עלולה לכלול: פריחה, חום, בלוטות נפוחות ומעורבות של אירורים פיזיים נוספים כגון: כבד, כליות, ריאות ולב. תופעה זו עלולה לגרום לפעמים למוות, לכן יש לספר לרופא מיד אם אתה סובל מאחד מהסימנים הללו.

8. טרדיב דיסקיניה (Tardive dyskinesia) - מצב הגורם לתנועות לא רצוניות, בעיקר של הפנים או הלשון. התופעה עלולה להמשך גם לאחר הפסקת הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT**. התופעה עלולה גם להתחיל אחרי הפסקת הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT**. יש לספר לרופא אם יש לך תנועות גוף לא נשלטות.

9. ירידה בדיסקיניה **הם בעת שניו תנוחה** הכוללת תסמינים כגון סחרחורת, דופק מטייל או איטי או עלפון. התופעה מתרחשת בעיקר בתחילת נטילת התרופה.

10. קושי בבעייה העלול לגרום למזון או לשתייה להגיע לריאות.

11. פרוכוסים - ספר לרופא שלך אם אתה חווה פרכוס במהלך הטיפול ב**זאפה וזאפה ODT**.

12. בעיות ביוסית חום הגוף - אתה עלול לסבול מעלייה בחום הגוף, למשל, כשאתה מתעמל או נמצא באיזור חם מאוד. חשוב לשתות מים על מנת למנוע התייבשות. יש לפנות מיד לרופא במידה והינך נהייה חולה מאוד וסובל מתסמינים של התייבשות:

- הזעת יתר או חוסר הזעה
- יובש בפה
- מרגיש חם מאוד
- ציאנון מוגבר
- אצירת שתן

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות מאוד: חולשה (חוסר אנרגיה), יובש בפה, עצירות, הפרעות עיכול, ישנוניות, סחרחורת, פציעה מתאונה, נדודי שינה, פרקינסוניזם.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות:

חום, רעד, כאב גב, כאב חזה, כאבים בגפיים, כאבים במפרקים, עלייה בקצב הלב, יתר לחץ דם, הקאה, אי שקט גופני, תיאבון מוגבר, שינויי התנהגות, עלייה ברמות טריגליצרידיו, רמות גבוהות של לחץ דם במעבר משכיבה לשיבה, דימום תת עורי, התמבטא בכתמים בעור, בצקת פריפריאלית, עלייה בל רגילה, גושקות שרירים, לקוויי הגיה (דיבור), נזלת, שיעול, עין עצלה, דלקת הלוע, נמנום, בריחת שתן, זיהום בדרכי השתן, עלייה ברמות פרולקטין, גדילה ברמות של אלקאלין, פוספטאט בדם, הפרשת חלב מהשד, עלייה של תשדים בגברים, פגיעה בזיכרון, נמלול, מצב רוח מרומם (אופוריה), קוצר נשימה, עור יבש, אקנה, פגיעה בראיה, כאבי מחזור ודלקת בנרתיק בנשים, צואה קשה או מתן צואה לעיתים רחוקות.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות:

צמרמורת, בצקת בפנים, רגישות לאור, ניסיון התאבדות, שבץ, התרחבות כלי דם, בחילה, הקאה, בצקת בלשן, ירידה ברמות תאי דם לבנים, ירידה ברמות תטיות הדם, רמות גבוהות של בילירובין בדם, רמות נמוכות של חלבונים בדם, בעיות קואורדינציה, הפרעה בדיבור, ירידה בחשק המיני, קהות חושים, דימום מהאף, נשירת שיער, יובש בעיניים, שינויים במיקוד הראייה (קאדמוציה), אין אונות, שינויים במחזור החודשי (כגון אלו וסת, ירידה/עלייה בדימום הווסית, דימום בתינון כבד), אצירת שתן, הכיפות ודחיפות במתן שתן, נפח שתן גדול, כאב בשד, דיסטוניה (התכווצות שרירי הצוואר), קשוי בליעה, קשוי נשימה, הצואה של הלשון, נפיחות בבטן ומוות על רקע סוכרת.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות:

אפקט הגנאבור, חסימת מעיים, כבד שומני, אוסטאופורוזיס, תרדמת, בצקת בריאות, התרחבות אישונים, מוות פתאומי.

תופעות לוואי בשכיחות שאינה ידועה:

תגובה אלרגית (כגון: תגובה אנאפילקטית, התנפחות הפנים או הגרון (אנגיואדמה), גירוד, פריחה), תרדמת הקשורה לסוכרת, קטואצידוזיס (אנגיואדמה), נזירוד, פריחה), תרדמת הקשורה לסוכרת, תופעות לוואי שעלולות להופיע בעת הפסקת הטיפול (בחילה, הקאה, והזעה), צהבת, דלקת בלבול וכבד, פגיעה בכבד,

הפרשת רוק מוגברת, תסמונת הרגליים העצבנית (Restless legs syndrome), ניוטרופניה (ריכוז נמוך מסוים של תאי דם לבנים), קדפה כואבת וממושכת (ריפאיפם), פגיעה בשרירים הגורמת לכאבים

07D21

(רבדומילוליס), פקקת רודים, אגמום.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה סובל מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.