

سيروكويول™ 25 ملغ سيروكويول™ 100 ملغ سيروكويول™ 300 ملغ أقراص مطالية

غير مبرر. سيمتاج طبيبك إلى فحص قلبك، وإذا لزم الأمر، سيخيلك إلى طبيب قبل على الفور.

قد تحدث الحالات المذكورة أعلاه لاستخدام فئة الأدوية التي ينتهي إليها سيروكويول.

أخير الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كنت تشعر بأحد ما يلي:

- حمى، أعراض تشبه الإنفلونزا، ألم حلق أو أي التهاب آخر، بما أن ذلك قد ينبع عن انخفاض شديد في عدد كريات الدم البيضاء، فقد يتطلب وقف العلاج بسيروكويول وأو تقديم علاج.
- الإمساك المصحوب بألم بطن متواصل، أو الإمساك الذي لا يستجيب للعلاج الدوائي، قد يسبب ذلك حالة أشد من انسداد الأمعاء.

• **أفكار انتهاية وتفاقم الاكتئاب:** إذا كنت تعاني من الاكتئاب فقد تراودك أفكار انتهاية، والتي قد تشتت مع بداية تناول العلاج بسيروكويول، لأن الدواء يسفر بعض الوقت حتى يتحقق مفعوله، والذي قد يدوم حوالي أسبوعين أو أكثر من ذلك في بعض الأحيان. قد تحدث زيادة الأفكار الانتهاية كذلك إذا تم وقف العلاج بسيروكويول بشكل مفاجئ. وتعد هذه الأفكار شائعة أكثر لدى الشباب البالغين. تشير المعلومات الناجمة عن الدراسة السريرية إلى زيادة خطر الأفكار الانتهاية وأو السلوك الانتحاري لدى الشباب البالغين ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً ويعانون الاكتئاب.

في حال راودتك أفكار انتهاية، فيرجي التوجيه فوراً إلى طبيب أو مستشفى، من شأن التحدث مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين أن يكون مفيداً، حيث يجب توجيههم للاطلاع على هذه النشرة. يمكنكم مطالبه بخباركم كلما شعروا بتفاقم الاكتئاب أو عندما يتمتعون بقلق جراء تغيرات في سلوككم.

• **الآثار الجانبية الجلدية الخطيرة (SCARs)** تم الإبلاغ عن آثار جانبية جلدية شديدة والتي قد تشكل خطراً على الحياة أو تؤدي إلى الموت لدى المرضى الذين يتناولون سيروكويول. والتي تتجسد من خلال الأعراض التالية:

- متلازمة ستيف جونسون (SJS) (Steve-Johnson syndrome) طفح جلدي واسع النطاق ومحظوظ يظهر بثور وتفشل الجلد، خاصة في محيط الفم، والأنف، والعيون والأعضاء التناسلية.
- متلازمة (TEN) toxic epidermal necrolysis (TEN) - متلازمة أكثر وفاقة، والتي تسبب تفشر الجلد واسع النطاق.
- متلازمة DRESS - متلازمة رد الفعل الدوائية مع زيادة الخلايا الحمضية وأعراض مهاربة مثل أعراض تشبه الإنفلونزا المصحوبة مع الطفح، والحمى، وتضخم الغدد والنائر الشاذة في فحوصات الدم (بما في ذلك ارتفاع مستويات خلايا الدم البيضاء (الخلايا الحمضية) وارتفاع مستويات إنزيمات الكبد).
- (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) AGEP - يثور صفيرية مليئة بالقمع.

- وذمة متعددة الأشكال (Erythema Multiforme) - طفح جلدي مع بقع غير عادي، حمراء وتنسب المكة.

توقف فوراً عن تناول سيروكويول إذا كنت تطور أحد هذه الأعراض وأبلغ الطبيب أو توجه فوراً لتلقي العلاج الطبي.

زيادة الوزن: شوهدت زيادة الوزن لدى مرضى تناولوا سيروكويول، علىكم متابعة وزنك بشكل مستمر مع طبيبك.

الاطفال والمرأهقون: الدواء غير مخصص لأطفال ومرأهقين دون 18 من العمر.

تفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكمالت غذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا يجوز تناول سيروكويول إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية:

- أدوية لعلاج فيروس العوز المناعي البشري (إيدز).
- أدوية من فئة المضادات الفطرية (العلاج حالات العدوى الفطرية).

• إريثروميسين أو كلاريثروميسين (العلاج العدوى).

• نيفاذازون (العلاج الاكتئاب).

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناول:

• أدوية لعلاج الصرع (مثل فنتوتين أو كاربامازين).

• أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• باربيتورات (العلاج الأرق).

• ثيوبراديزين أو لينيوم (مضادات الذهان).

• أدوية تؤثر على سرعة القلب، مثل الأدوية التي قد تسبب قلة التوازن في الكهارل (انخفاض مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم)، مثل الأدوية المدررة أو المضادات المحبوبة المعينة (أدوية لعلاج حالات العدوى).

• أدوية قد تسبب الإمساك.

• أدوية تؤثر على وظيفة الخلايا العصبية بهدف علاج حالات طيبة معينة (تسمى مضادات الكولين).

قبل التوقف عن تناول أحد الأدوية التي تتناولها، يجب التوجيه للطبيب.

استخدام الدواء والم مواد الغذائية: يمكن تناول سيروكويول مع الطعام أو بدهنه.

لا يجوز تناول عصير البرييفروت أثناء العلاج بسيروكويول. قد يؤثر عصير البرييفروت على طريقة تأثير الدواء.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول: يجب توخي المذر مع كمية الكحول التي تستهلكها. بما أن الدمج بين سيروكويول والكحول قد يسبب لك النعاس.

الممل والرضاة الطبيعية: قبل تناول سيروكويول يجب إخبار الطبيب إذا كنت حاملأً أو تخططين للدخول في حمل أو تناولين الدخول في حمل. لا يجوز تناول سيروكويول، إلا في حال تحدث ذلك مع طبيبك.

لا يجوز استخدام سيروكويول إذا كنت مرضعة.

قد تحدث أعراض الفطام التالية لدى حديثي الولادة لأمهات تناولن سيروكويول خلال آخر ثلاثة أشهر من الحمل، تبيّس العضلات وأو وهن العضلات، النعاس، التململ، مشاكل في التنفس وصعوبات عند تناول الطعام. إذا كان طفلك الرضيع يطور أيّاً من هذه الأعراض، فيرجي التوجيه إلى طبيب.

القيادة واستخدام الآلات: قد يسبب استخدام هذا الدواء النعاس. لا يجوز قيادة السيارة أو تشغيل الآلات قبل أن تكون ملماً بطريقه تأثير الدواء عليك.

معلومات هامة عن بعض مكونات الدوا: أقراص سيروكويول تحتوي على لاكتوز الذي يشكل نوعاً من السكر. إذا كنت غير قادر على تحمل اللاكتوز أو تغذر عليك هضم بعض السكريات، فيرجي إبلاغ طبيبك قبل تناول سيروكويول.

سيروكويول 25 ملغ أقراص - أي قرص يحتوي على 19.00 ملغ من مونوهيدرات اللاكتوز

سيروكويول 100 ملغ أقراص - أي قرص يحتوي على 20.70 ملغ من مونوهيدرات اللاكتوز

سيروكويول 200 ملغ أقراص - أي قرص يحتوي على 41.40 ملغ من مونوهيدرات اللاكتوز

التركيبة - كل قرص يحتوي على: Quetiapine (as fumarate) 300 mg Quetiapine (as fumarate) 200 mg Quetiapine (as fumarate) 100 mg

كويتيابين (Ketamine) 25 ملغ كويتيابين (Ketamine) 100 ملغ كويتيابين (Ketamine) 300 ملغ

اللاطّاع على المكونات غير النشطة ومسبيات المساعدة، يرجى الالاطّاع على البند 6 "معلومات إضافية".

يرجى الإطلاع بعناية على النشرة حتى نهايةها، قبل أن تستخدم الدوا، تتضمن هذه النشرة معلومات مختصرة عن الدوا، إذا

راودتك أسلة إضافية، فيرجي التوجيه إلى طبيب أو الصيدلي. تم وصف هذا الدوا لعلاج مرضك. لا ترهز إلى أشخاص آخرين. فقد يضر بهم حتى إذا كنت تعتقد بأن مرضهم شبّه.

الدوا غير مخصص لأطفال ومرأهقين دون الـ 18 من العمر. الدوا ليس مخصصاً لكيار السن الذين يعانون من الفرف.

• تزيد الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق من خطر السلوك والأفكار الانتهاية لدى الأطفال، والراهقين والبالغين الشباب بعمر يصل إلى 25 عاماً. بمجرد بدء العلاج بالدوا، يجب على المرض مهمها كانت أعمارهم لأقربائهم، متباينة التغيرات السلوكيّة مثل: تفاقم الاكتئاب، والأفكار الانتهاية، والتصرف العدوانى وأما شاهد ذلك، في حال طرأت مثل هذه التغيرات، يجب التوجيه إلى طبيب فوراً.

• المرضى من كبار السن الذين يعانون من ذهان مرتبط بالذرف والمرضى الذين يتناولون دواء مضادة للذهان هم عرضة لخطر الموت بشكل زائد.

1. من يخصص هذا الدوا؟

• لعلاج الفضام.

• لعلاج حالات الهوس المرتبطة بالإضطرابات ثنائية القطب.

• سيروكويول ليس مخصصاً لعلاج وفائي من حالات الهوس أو المكرورة.

الفترة العلاجية - أدوية مضادة للذهان الفضام هو عبارة عن مرض حيث قد تسمع أو تشعر بأشياء، غير موجودة، أو أهيمان بالأشياء غير حقيقة، أو الشعور بالرببة الشديدة، أو القلق، أو الارتياب، أو الذنب، أو الوتر أو الاكتئاب.

الهوس هو عبارة عن حالة حيث تشعر بفترط الانفعالية، والبهجة، والذهول، والحماسة، وفترط النشاط، أو تدب القدرة على الحكم الصحيح والتصرف العدوانى.

الاضطراب الثنائي القطب هو عبارة عن حالة حيث قد تشعر بالحزن الدائم أو تجد أنك تعيش اكتئاباً، أو بينما تتنابك مشاعر الذنب، أو نقص الطاقة، أو قلة الشهية أو الصعوبة في النوم.

يمكن للطبيب أن يستمر في إعطاء العلاج بسيروكويول لك حتى إذا تحسن شعورك.

2. قبل استخدام الدوا

X لا يجوز استعمال هذا الدوا إذا:

• كانت لديك مساسية تجاه المادة الفعالة أو أي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدوا (يرجى الإطلاع على البند 6 "معلومات إضافية").

• كنت تتناول الأدوية التالية:

- أدوية لعلاج فيروس العوز المناعي البشري HIV.

- أدوية من فئة المضادات الفطرية (العلاج حالات العدوى الفطرية).

- إريثروميسين أو كلاريثروميسين (العلاج حالات العدوى).

- نيفاذازون (العلاج الاكتئاب).

إذا لم تكن متأكداً، فالرجاء التوجيه إلى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول سيروكويول.

! تحذيرات خاصة بشأن استخدام سيروكويول

قبل العلاج بسيروكويول، أخير الطبيب إذا:

• كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك حالياً أو في الماضي من مشاكل قلبية، مثل: مشاكل في وترية القلب، توهن ضلعة القلب أو التهاب قلب، أو إذا كنت تتناول أدوية تؤثر على سرعة القلب.

• كان لديك اضطرابات في الذهان.

• كنت تعاني سابقاً من سكتة دماغية لا سيما إذا كنت من كبار السن.

• لديك مشاكل كبدية.

• كنت تعاني من اضطرابات في أي وقت مضى.

• كنت تعاني من السكري أو كنت تنتهي إلى فئة معرضة لخطر الإصابة بالسكري، في مثل هذه الحالة، قد يبادر الطبيب إلى فحص مستويات السكر في دمك بينما يتم علاجك بسيروكويول.

• إذا كان لديك سابعاً مسليفات الدار.

• لا يجوز تناول سيروكويول إذا كنت من ملائكة الدم، علماً بأن

أن سيروكويول قد يزيد من خطر حدوث سكتة دماغية، أو في حالات معينة قد يزيد من خطر الموت لدى المستعين الصابرين بالغرق.

• كنت مسناً مصاباً بمرض باركنسون أو الباركنسونية.

• لك أو أحد أفراد عائلتك تاريخ من جلطات الدم، علماً بأن

الأدوية من سيروكويول قد يزيد من خطر حدوث سكتة دماغية.

• إذا كانت لديك حالياً أو في الماضي حالة من انقطاع النفس لفترة وجيزة أثناء نومك ليلة (يسى انقطاع التنفس أو الهرهور)، وكانت تتناول أدوية بطيء نشاط الدماغ العادي.

• إذا كانت لديك حالياً أو سابعاً حالة من عدم القدرة على تفريغ المثانة البولية شكل كامل (احتباس البول)، وتضخم البروستات، والانسداد المعي أو زيادة الضغط داخل العين، والتي تُعتبر حالات ناجمة في بعض الأحيان عن أدوية (تسمى مضادات الكولين)، تؤثر على طرقة وظيفة خلايا العصب بهذه طبيعة ممتهنة.

• لديك تاريخ من الإدمان على الكحول، أو الأدوية أو المخدرات.

أبلغ الطبيب فوراً إذا كنت تشعر بأحد الأعراض التالية بعد تناول سيروكويول:

• مزج من الحمى، أو تبيّس العضلات الشديدة، أو التعرق أو انخفاض

الوعي (إنها ظاهرة تسمى "neuroleptic malignant syndrome").

قد يتطلب منك تلقي علاج طبي عاجل.

• المركبات الالكتروائية، لا سيما في الوجه واللسان.

• الدوار أو إذا كنت تشعر ببعض شدید، مما قد يزيد خطر الإصابة

العرضية (السقوط) لدى كبار السن.

• اختلالات مطولة في القضيب، ومتواصل ومؤلم.

• لديك نظام قلب سريعة وغير منتظمة، حتى عندما تكون في حالة راحة، فخفان قلب، مشاكل في التنفس، ألم في الصدر أو إرهاق

سيروكويل 300 ملغ أقراص - أي قرص يحتوي على 62.10 ملغ من مونوهيدرات الالاكتوز
تحتوي أقراص سirokobil على أقل من 1mmol (23 ملغم) من الصوديوم وبالتالي فإنها تعتبر "خالية من الصوديوم".
التأثير على تأثير فحوصات البول: قد يسبب سirokobil نتيجة إيجابية في فحص البول لوجود أدوية لا تتناولها مثل: ميتابون ومستحضرات ضد الاكتناب من صنف مضادات الاكتناب ثلاثة الحلقات. يجب التأكد من صحة هذه النتائج من خلال الفحوصات الإضافية.

3. كيفية استخدام الدواء:

- يجب دائمًا استخدامه حسب تعليمات الطبيب. يجب التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد. سيتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط.
- سيقوم الطبيب بملء الجرعة اليومية من الدواء للتراويخ بين 150 ملغ و800 ملغ بناءً على مرضك وأحتياجاتك الشخصية.
- لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
- يجب تناول الأقراص مرة واحدة يومياً قبل النوم أو مررتين يومياً حسب المرض.

شكل التناول:

- يجب بلع الأقراص بأكملها مع الماء وبغض النظر عن الطعام.
- لا تتوفر معلومات عن السحق/القطع/المضغ.

مشاكل في الكبد:

- إذا كنت من كبار السن فقد يعدل الطبيب جرعتك.
- إذا تناولت سهواً مقداراً دوائياً أعلى: إذا أفرطت في استعمال المقادير الدوائية سهواً أو إذا بلغ الطفل خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى الطبيب أو عرقفة الطوارئ في المستشفى حالاً مصطبًا معك عبوة الدواء. قد تشعر بتعب، دوار، وضربات قلب غير طبيعية.

إذا نسيت تناول الدواء: إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز تناول جرعة مزدوجة. يجب تناول جرعة بمجرد التذكر.خذ جرعتك التالية في الوقت المعاد واستشر الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء: لا تشعر بالقلق عن العلاج بالدواء حتى إذا كنت تشعر بتحسن حالتك إلا بتوخيه من الطبيب. قد يتسبب التوقف عن تناول الدواء، في جفاف بالأعضاء التالية: أرق، غثيان، صداع، إسهال، تقيّف، دوار وعصبية. يمكن لطبيبك أن يوصيك بتحفيض الجرعة تدريجياً قبل تناول الدواء.

لا يجوز تناول أدوية في الظماء! تحقق من الملصق والجرعة
كلما تناولت دواء، أردت النظارات إذا كنت تختبأها.
إذا راودتك أسللة أخرى بشأن استخدام الدواء، فاستشر طبيباً أو صيدلياً.

4. آثار جانبية

- أسوةً بآية دوا، قد يسبب استخدام سirokobil آثاراً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تقلق أثنا، قراءة قائمة الآثار الجانبية. فقد لا تعياني أي منها.
- آثار جانبية شائعة للغاية** (قد تؤثر على أكثر من مريض واحد من أصل 10):
 - دوار (قد يسبب السقوط). (قد يزول بعد تناول الدواء - أرق، غثيان، صداع، إسهال، تقيّف، دوار وعصبية. يوصى بالتوقف عن تناول العلاج تدريجياً ولفترات تتراوح بين أسبوع واحد وأسبوعين). • زيادة الوزن • حركات عضلية غير طبيعية تشمل الصعوبة في بدء حركة، ارتعاش، تقليل أو تبييض العضلات بدون ألم • تغيرات في مستويات بعض الدهون في الدم (ثلاثي الغليسريدات والكوليستيرول).

الآثار الجانبية الشائعة (قد تؤثر على مريض واحد من أصل 10): ارتفاع سرعة القلب • الشعور بالخفقان، سرعة نبضات القلب أو بتقطيع النبضات • عسر الهضم أو الإمساك • و Hern • تورم الدرارين أو الساقين • ارتفاع مستويات السكر في الدم • انخفاض ضغط الدم عند الساقين (قد يسبب الدوار، الإغماء، والسعوط) • ضبابية الرؤية • أحلام غريبة وكوابيس • زيادة الشعور بالجوع • عصبية • مشاكل في النطق • أفكار انتحارية وتفاقم الاكتناب • ضيق النفس • التقيّف (خاصّة لدى كبار السن) • حمى • تغيرات في مستويات هرمون الغدة الدرقية في الدم • انخفاض مستويات بعض أنواع خلايا الدم في الدم • ارتفاع مستويات برولاكتين في الدم. قد يسبب ارتفاع هرمون برولاكتين في حالات نادرة: انتفاخ الصدر لدى الرجال والنساء، وإنتاج حليب بشكل غير متوقع. وقف الدورة الشهرية لدى النساء، أو عدم انتظام الدورة الشهرية.

الآثار الجانبية غير الشائعة (قد تؤثر على مستخدم 1 من أصل 100):
الأخلاجيات أو التشنفات • ردود الفعل التحسسية التي قد تشمل ظهور كتل بازرة على الجلد، وتورم جلدي وtorم حول الفم • متلازمة تململ الساقين (شعور بازداج في الساقين) • صعوبات في البلع • حركات لا إرادية في النشاط الكهربائي • في القلب يمكن ملاحظتها من خلال اختبار ECG (تمديد مقطعي QT) • سرعة القلب الأنفاس ضغط الدم والإغماء • صعوبات في التبول • الإغماء (قد يسبب السقوط) • انخفاض كمية الصوديوم في الدم الماء • انخفاض كمية الصوديوم في الدم • تفاقم سكري موجود.

الآثار الجانبية النادرة (قد تؤثر على مستخدم واحد من أصل 1000 مستخدم):
مزيج من الحمي، أو التعرق، أو تبiss العضلات، أو التعب الشديد أو الإغماء) (neuroleptic malignant syndrome) • اصفرار الجلد والعينين (البرقان) • التهاب الكبد (البرقان) • انتصاف العضلات والمؤلم • انتفاخ الذينين وإنماج المطلب غير المتوقع الدورة الشهرية • جلطات الدم في الأوردة، خاصةً في الساقين (يتجسد بالتوتر، والألم واحمرار الساق)، التي قد تصل من خلال مجرى الدم إلى الرئتين مسببة الام الصدر وصعوبات التنفس. إذا كنت لاحظت أحد هذه الأعراض فجب التوجه فوراً للتنفس المساعدة الطبية • المشي، النطق، تناول الطعام وغيرها من الأنشطة أثناً التوأم • انخفاض ضغط الدم • التهاب البنكرياس • "متلازمة أيضية" - حالة حيث قد تحدث ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية:
ارتفاع مستوى الدهن في البطن، وانخفاض مستوى الكوليستيرول (HDL-C)، وارتفاع مستوى الغليسيريدات في الدم، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم. • مزيج من الحمي، أو أعراض شبه الإنتفاخ، أو ألم ملطف، أو أي دعوى أخرى تكون مخصوصة بانخفاض شديد لعدد خلايا الدم البيضاء، وهي حالة تسمى درجة المحببات. • انسداد معوي • ارتفاع مستوى الكرياتين فوسفوكتين في الدم (مادة تصل من العضلات).

الآثار الجانبية نادرة للغاية (قد تؤثر على مستخدم واحد من أصل 10000):

طفح شديد، بثور ومتانق حمراه على الجلد . رد فعل تحسسي شديد قد يتجسد في صعوبات في التنفس أو صدمة تلقائية. • انتفاخ سريع لمثانة، عادة حول العيون، الشفاه والحلق (وذمة وعائية). • ظهور كثيف للبلور على سطح الجلد، الفم، العيون والأعضاء التناسلية. متلازمة ستيفنس-جونسون أظهرت بند التقديرات. • إفراز غير طبيعي للهرمون المسؤول عن حجم البول • انطلاق ألياف العضل وألم في العضلات (انطلاق الريبيات).

آثار جانبية لا يُعرف شيوخها:

طفح جلدي مع بقع حمرا، غير عادي (erythema multiforme) انظر البند 2. • ظهور سريع لمنطقة ذات جلد أحمر مطفحة يحتوي صبغة Acute Generalized Exanthematous Papulosis (AGEP) انظر البند 2. رد فعل تحسسي مفاجئ مع أعراض مثل الحمى، البثور على الجلد وقشر الجلد (TEN) انظر البند 2. • متلازمة DRESS - متلازمة المساسة الدوائية مع الخلايا المحمضية وأعراضها مثل أعراض تشبه الإنفلونزا المحمضية مع الطفح، والحمى، وتضخم الغدد والتئام الشذوذ في فحوصات الدم (يشمل ارتفاع مستويات خلايا الدم البيضاء، (خلايا المحمضية) وارتفاع مستويات إنزيمات الكبد) انظر البند 2. • قد تحدث أعراض فطام لدى أطفال لأمهات تناولن سirokobil أثناء الحمل. • سكتة انتلال عضلة القلب (انتلال عضلة القلب) • التهاب عضلة القلب (التهاب الأوعية الدموية) الذي يهدى إلى الوفاة

قد تسبب فئة الأدوية التي ينتمي إليها سirokobil مشاكل في سرعة القلب، وقد تكون خطيرة وتشكل خطراً على الحياة.

شوهدت الآثار الجانبية التالية في فحوصات الدم:
تغيرات في مستويات بعض الدهون (ثلاثي الغليسيريدات والكوليستيرول العام). • ارتفاع مستويات الغدة الدرقية في الدم. • ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد. • انخفاض مستويات خلايا الدم المحمضية. • انخفاض مستويات الصوديوم في الدم • ارتفاع مستويات بعض الدهون (ثلاثي الغليسيريدات والكوليستيرول العام). • تغيرات في كمية هرمونات الهرمون برولاكتين في حالات نادرة: انتفاخ الصدر وإنماج طليب بشكل غير متوقع لدى الرجال والنساء. وقف الدورة الشهرية لدى النساء، أو عدم انتظام الدورة الشهرية

قد يطلب منك الطبيب الخضوع لفحوصات دم من حين لآخر. إذا ظهرت آثار جانبية، إذا تفاقم أحد الآثار الجانبية، أو إذا كنت تشعر بأثر جانبية لم يرد ذكره هنا، فتوجه إلى طبيبك فوراً. يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن آثار جانبية من خلال انتفاع الطفح على الرابط الإلكتروني "الهيئة العامة للطعام والدواء" (www.health.gov.sa) والذى يحول إلى التموز الإلكتروني للإنترنت للإبلاغ عن آثار جانبية، أو من خلال دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.sa>

5. كيف ينبغي تخزين الدواء؟

- يجب عدم التخزين بدرجة حرارة أعلى من 30°C.
- لا يجوز استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP DATE).
- الظاهر على العلبة.

تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم من ذلك الشهر.

تجنب التسمم! يجب الاحتفاظ بهذا الدواء، وأي دواء آخر في مكان

مغلق بعيداً عن متناول الأطفال ومحظوظة في الماء.

الرضع مما سيجعل دون حالات التسمم. لا تنسى بالتقى إلا إذا

أرشدك طبيب بذلك بشكل صريح.

6. معلومات إضافية

إضافةً إلى المكون الفعال (أنظر أعلاه) يحتوي الدواء أيضًا على Core: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, sodium starch glycolate Type A, Povidone, magnesium stearate Coating: methylhydroxypropyl cellulose, titanium dioxide (E171), macrogol 400, ferric oxide, yellow (E172) (present only in the 25 mg and 100 mg tablets), ferric oxide, red (E172) (present only in the 25 mg tablets).

كيف تبدو الدواء، وما تحتوي الرزمة

أقراص مطلية سirokobil 25 ملغ دائري، ممدبة من الجانبين، ذات لون خوبي حيث يطبع على أحد جانبيها 'Seroquel 25' وهي ملمساً من الجانب الآخر.

أقراص مطلية سirokobil 100 ملغ دائري، ممدبة من الجانبين، ذات لون خوبي حيث يطبع على أحد جانبيها 'Seroquel 100' وهي ملمساً من الجانب الآخر.

أقراص مطلية سirokobil 200 ملغ دائري، ممدبة من الجانبين، ذات لون أبيض حيث يطبع على أحد جانبيها 'Seroquel 200' وهي ملمساً من الجانب الآخر.

أقراص مطلية سirokobil 300 ملغ على شكل كبسولة، ممدبة من الجانبين، بلون أبيض وطبع على جانب واحد '300' وعلى الجانب الآخر 'Seroquel'.

الم المنتج: أسترازينيكا إنجلترا. م.ض. ، مكليسفيلد، إنجلترا. صاحب الامتياز والمستورد: أسترازينيكا (إسراينيل) م.ض. ، شارع عتيبي يدع 1، كفار سوبا 4464301.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي الخاص بوزارة الصحة:

سيروكوبيل 25 ملغ: 109 39 29313 00
سيروكوبيل 100 ملغ: 109 40 29314 00
سيروكوبيل 200 ملغ: 109 41 29315 00
سيروكوبيل 300 ملغ: 135 33 31257 00

تم التحديث في تشرين الثاني 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة. تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكرة لدعايي التسليط وتسهيل القراءة، ليس إلا. ومع ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.