

يموّق الدواء دون وصفة طبية

كريبوسيلان كبسولات

الماء الفعال:

تحتوي كل كبسولة زرقاء (تعمل في المعدة على: activated charcoal 140 mg فحم فعال 140 ملجم simethicone 45 mg سيميثيون 45 ملجم

تحتوي كل كبسولة حمراء (تعمل في الأمعاء على: activated charcoal 140 mg فحم فعال 140 ملجم simethicone 45 mg سيميثيون 45 ملجم

الماء غير الفعالة ومضادات الحساسية: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية":

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء، تجنب هذه النشرة على معلومات موزعة عن النزف. إذا كانت لديك أسلمة إضافية، فترجم إلى الطبيب أو الصيدلي. عليك أن تستعمل المستحضر حسب التعليمات في بند الجرعة من هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا شعرت أنه لم يطرأ تحسن على حالك أو إذا تدهور شعورك بعد 10 أيام.

1. لم أعد هذا الماء؟

ضد لفرم الغازات في الجهاز الهضمي لعلاج أعراض الام والانفاس، يزيد من تجفيف الغازات وتخفيف الشعور بالامتلاء.

المجموعة العلاجية: مضاد الغازات/ماص من الأمعاء.

2. قبل استعمال الدواء

يمعن استعمال الدواء إذا: كانت لديك أسلمة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء إذا كنت تناول علاجاً طبياً آخر، تناول كريبوسيلان كبسولات بأيام متقارنة بينه وبين تناول الأدوية الأخرى (أكثر من ساعتين إذا كان ممكناً).

تحث مع الطبيب أو الصيدلي قبل أن تتناول كريبوسيلان كبسولات.

الأطفال والمرأهون: إذا كنت تتناول الدواء غير معد للأطفال دون سن 6 سنوات بسبب خطر الاختناق.

العقارات/ردود الفعل بين الأدوية إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مoxicat، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكممات غذائية، أخرين للطبيب أو الصيدلي بذلك.

يمكن أن يقال هذا الدواء امتصاص الأدوية الأخرى، لهذا يجب أن يكون هناك فارق زمني بين تناولها وتناول هذا الدواء (أكثر من ساعتين إذا كان ممكناً).

استعمال الدواء والغذاء

يجب تناول هذا الدواء قبل الوجبات.

الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب حول استعمال هذا الدواء أثناء الحمل. إذا اكتفت أنك حامل خلال العلاج، استشيري الطبيب، لأنه يجوز للطبيب فقط أن يقرر إذا كانت هناك حاجة إلى متاعبة الملاج.

يمكن إعطاء هذا الدواء خلال الرضاعة.

الحمل، أو مرضاة، تطهين حامل، أو الصيدلي إذا لم تكن متقدماً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة استعمال الدواء.

إذا كنت حاملاً أو مرضاة، تطهين أنك حامل، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تقصص من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متقدماً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة استعمال الدواء.

البرغة المترافق عليها عند غباء تعليمات أخرى من الطبيب: يجب تناول كبسولة زرقاء مع كبسولة حمراء 3 مرات في اليوم قبل الوجبات.

لا يجوز المرض، ويجب ابتلاع الكبسولات كاملة مع الماء.

يمعن تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت جرعة مفرطة يمكن أن يؤدي استعمال جرعات عالية إلى براز داكن. اتصل فوراً بالطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت تناول الدواء

يمعن تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المناسبة.

يمعن تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة المواتية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، يمكن أن يسبب استعمال كريبوسيلان كبسولات أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتل الآتي علىك من أي منها.

تم الإبلاغ عن حالات من ردود فعل تحسسية (شري، رد فعل تحسسي على أحد المكونات)، رد فعل تحسسي على كريبوسيلان كبسولات.

تم الإبلاغ عن حالات من اضطرابات في الهضم (الماء، تقيؤ، ازدحام إمساك أو إسهال)، بعد إعطاء كريبوسيلان كبسولات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم تذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية" بحسب الملاج (الوطني)، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استشارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية عبر الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

يمكن الإبلاغ أيضاً عبر البريد الإلكتروني:
safety@trima.co.il

5. كيف يُخَنِّن الدواء؟

تتجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وكذلك تجنب التسمم. لا تنسى التفاف دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة/البليستر. تاريخ انتهاء الصلاحية يتغير إلى اليوم الأخير من ذات الشهر.

شروط التخزين: يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة أقل من 25°C

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً على: كبسولة زرقاء (تعمل في المعدة):

gelatin, sorbitan oleate, polysorbate 80, titanium dioxide, indogitin.

كبسولة حمراء (تعمل في الأمعاء):

gelatin, sorbitan oleate, cellulose acetate phthalate, polysorbate 80, diethyl phthalate, erythrosine, titanium dioxide, indogiton.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

عبوة فيها 48 جرة (24 جرة كبسولة).

24 كبسولة زرقاء تحتوي على مسحوق أسود.

24 كبسولة حمراء تحتوي على مسحوق أسود.

اسم المنتج وعنوانه: مختبرات جرميدبرج، جادة جورج ميلميدي، 92300، 44، إيلاتي-بيريز، فرنسا صاحب التسجيل و عنوانه: تربما منتجات طبية إسرائيلية معتبروت، مرض، معبروت 4023000، إسرائيل.

تم تحريرها في تشرين الثاني 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 134-82-21600-07.

لتبييض قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصوص بصيغة المذكرة.

على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.