

بيتاوكورتين محلول لجلد الرأس

تفاولات/رود فعل بين الأدوية:
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، ألاك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
خاصة إذا كنت تتناول الأدوية ريتونافير أو إينتركونازول.

الحمل والإرضاع
إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتمدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، فاستشيري الصيدلي أو الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء
يحتوي بيتاوكورتين محلول لجلد الرأس على كُلُوروكاربِيزُول الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائمًا. عليك الاستئناف من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.
القدر الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

- دهن بيتاوكورتين محلول لجلد الرأس في الصباح وفي المساء. من الجائز تقليل المقدار الدوائي مع تحسن مثكلة فروة الرأس لديك.
- لا يجوز استعمال بيتاوكورتين محلول لجلد الرأس في أوقات متقاربة أكثر مما حدد لك.
- لا يجوز الاستعمال لفترة طويلة (متلًا بشكل يومي لمدة أسبوع أو أشهر عديدة) بدون تعليمات من الطبيب.
- احذر جدًا بالاً يدخل المحلول في عينيك. لا تلمس عينيك إلا بعد أن تغسل يديك.
- إذا شفطت أو غسلت شعرك، انتظر إلى أن يجف الشعر قبل دهن المحلول.

- إذا كنت تدهن المحلول على شخص آخر، احرص على غسل يديك بعد الاستعمال أو استعمل قفازات احادية الاستعمال من الپلاستيك.
- لا يجوز تجفيف الشعر بمصحف الشعر.
- تحذير! مادة قابلة للاشتعال! يجب الامتناع عن تعريض المحلول لنار مشكورة، الله النار ولا ي مصدر آخر للاشتعال، بما في ذلك التدخين إثناء دهن المحلول أو مباشرة بعد دهن المحلول حتى الجفاف الكامل للمستحضر.

إرشادات لدنه المحلول

1. اغسل يديك.
2. افتح غطاء القنية وضع الأنبوية على فروة الرأس التي بحاجة للعلاج.
3. اضغط بطفق على القنية، لتغطيه المنطقة بطبقة دقيقة ومتجانسة من المحلول.
4. بالإمكان تدليك المحلول إلى الداخل، ولكنك لست مازمًا بفعل ذلك.
5. ستشعر بان فروة رأسك باردة حتى جفاف المحلول.
6. اغسل يديك ثانية.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
لا يجوز البالغ.

للاستعمال الخارجي فقط.

إذا استعملت بالخطأ مقدارًا دوائيا أكبر
إذا دهنت كمية أكبر مما ينبغي أو إذا بلعت بالخطأ أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، من الجائز أن تتعرّج سوءًا. توجه حالًا إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ من المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت دهن بيتاوكورتين محلول لجلد الرأس، فقم بالدهن حال تنكرك ذلك. إذا كان الوقت قريبًا من الموعد الذي يفترض أن تقوم بهنه فيه، فيمكنك الانتظار حتى ذلك الموعد.

يجب المواطنة على العلاج حسب توصية الصيدلي.

w/w 0.1% فاليبرات betamethasone (as valerate) 0.1% w/w كل 10 مل تحتوى على 0.01 مل بيتاوكورتين فاليبرات.

مواد غير فعالة: قائمة المركبات غير الفعالة مفصلة في الفقرة 6 "معلومات إضافية" و الفقرة 2 "معلومات مهمة عن قسم من مستحضرات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

ووصف هذا الدواء لك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مماثلة لحالتك.

الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر سنة.

٤. لأى غرض مخصص الدواء؟

بيتاوكورتين محلول لجلد الرأس يحتوى دواء يسمى بيتاوكورتين فاليبرات، ويستخدم كمساعد في التخفيف من الإحمرار والحكة في مشكلة معينة في فروة الرأس، مثل الصدفية (psoriasis) والتهاب الجلد (dermatitis) الذي يترافق ببشرة.

المجموعة العلاجية: كورتيكosteroides.

٥. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت تدهن فروة الرأس (البريجي) لبيتاوكورتين فاليبرات أو كل واحد من المركبات الإضافية لـ بيتاوكورتين محلول لجلد الرأس (كما هو مفصل في الفقرة 6).

• إذا وجد لديك ثلث في فروة الرأس (فيروسي، جرثومي أو فطري).

لا تستعمل الدواء إذا اطبق عليك واحد مما ذكر. إذا لم تكن واثقًا، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال بيتاوكورتين محلول لجلد الرأس.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تحذير! حدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل أن تستعمل الدواء إذا:

• حدث لديك في الماضي رد فعل حساسى لستيرونيد آخر.

• كنت تدهن المحلول تحت ضمادة ممدودة. إن الضمادات من هذا النوع تسهل امتصاص المركب الفعال عبر الجلد ولذا قد تؤدي من المحلول.

• كنت تعاني من الصدفية (psoriasis)، سيرغب الطبيب في رؤيتك بأوقات متقاربة أكثر.

• كنت تدهن على مساحة واسعة من الجلد.

• هو عليه لدى الكبار ونتيجة لذلك قد يمتص كميات أكبر من المحلول.

• لا يجوز استعمال الضمادات لدى الأطفال أينما تم دهن محلول فروة الرأس.

• الاستعمال لدى الأطفال يجب أن يكون محدوداً لفترة 5 أيام.

اتصل بالطبيب إذا عانيت من توشش في الرؤية أو من اضطرابات أخرى في الرؤية.

إذا لم تكن واثقًا فيما إذا كان واحد مما ذكر يتطبع عليك، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب. بالإضافة التنبيل عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى الموقع المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

كذلك، بالإمكان التبليغ عبر البريد الإلكتروني: safety@trima.co.il

٥. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال وألو الرضيع، وذلك لتفادي إصبعتهم بالتسنم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة.
- يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

- يجب التخزين في مكان بارد، بدرجة حرارة دون 25°C.
- يجب الحفاظ على الصدواء. لا تعرض بيتاكورتين محلول لجلدة الرأس لضوء الشمس المباشر.
- احفظ الوعاء مغلقاً بالحاكم عندما لا يكون قيد الاستعمال. محظوظ قبل للارتفاع. احفظ بيتاكورتين محلول لجلدة الرأس بعيداً عن أي مصدر للنار، اللهب والحرارة.
- بعد الفتح للمرة الأولى بالإمكان الاستعمال لمدة 6 أشهر، وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: isopropyl alcohol, carbomer 940, chlorocresol, sodium hydroxide, purified water.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟ داخل كل علبة كرتون توجد قيودة تحتوي على 30 مل من المحلول الشاف.
- المنتج وصاحب التسجيل: تريما، منتجات طبية إسرائيلية معروفة م.ض.، معبروت 4023000.
- تم تحريرها في كانون الأول 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 050.46.23263.00
- من أجل سهولة وتهيئة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

إذا كنت تستعمل بيتاكورتين محلول لجلدة الرأس بشكل دائم، تحدث مع الطبيب قبل التوقف عن استعماله. حالتك قد تتفاقم إذا توقفت عن العلاج بشكل مفاجئ.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طبلة الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية

إذا لزم الأمر ذلك.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال بيتاكورتين محلول لجلدة الرأس قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز الآتي تعاني أي منها.

يجب التوقف عن استعمال بيتاكورتين محلول لجلدة الرأس ومراجعة الطبيب حالاً إذا:

- اكتشفت بأن حالة جلد فروة رأسك تتفاقم، يتطور لديك طفح عام أو أن جلدك يتفتح وذلك خلال فترة العلاج. فمن الجائز أن لديك حساسية لبيتاكورتين محلول لجلدة الرأس، تعاني من تلوث أو أنك بحاجة لعلاج آخر.
- كنت تعاني من الصدفية (psoriasis). وتطورت لديك بروزات مع قرح تحت الجلد. هذا الأمر قد يحدث في أوقات نادرة جداً خلال فترة العلاج أو بعدها ويرجع باسم الصدفية البشرية.

أعراض جانبية إضافية قد تلاحظها خلال استعمال بيتاكورتين محلول لجلدة الرأس تشمل:

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص):

• الحرقة، ألم، تهيج أو حكة في المنطقة التي ذُهُن فيها المحلول.

أعراض جانبية نادرة جداً (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 10,000 شخص):

- زيادة الخطورة لحدوث تلوث.
- رد فعل تحسسي في منطقة دهن المحلول.
- طفح، جلد حاک دروني أو أحمرار الجلد.
- جفاف وترقق الجلد الذي قد يتضرر أو يتهدى أيضاً سهولة أكبر قد تتطور علامات شد.
- من شأن الأوردة تحت الجلد أن تصيب بارزة أكثر للعين.
- زيادة أو قلة نمو الشعر أو ساقطه للشعر وتغيرات في لون الجلد.
- زيادة في الوزن، استدارة الوجه.
- تآخر في حدوث زيادة الوزن أو تباطؤ النمو لدى الأطفال.
- قد تصيب العظام رقيقة، متعرجة وسهولة الكسر.
- كدر عدسة العين (كتاراكت) أو زيادة الضغط داخل العين (جلوkom).
- ارتفاع نسب السكر في الدم أو سكر في البول.
- ارتفاع ضغط الدم.

أعراض جانبية وترتها غير معروفة

تشوش الرؤية

