

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أنافرانيل 25 ملغ أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

كلوميبرامين هيدروكلورايد 25 ملغ

Clomipramine Hydrochloride 25 mg

أنافرانيل إس. آر. 75 ملغ أقراص

أقراص ذات تحرير بطيء، بالإمكان شطرها

يحتوي كل قرص على:

كلوميبرامين هيدروكلورايد 75 ملغ

Clomipramine Hydrochloride 75 mg

المواد غير الفعالة:
أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 بند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصِف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بد لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إكتئاب من مصادر مختلفة

لا يوصى بإستعمال أنافرانيل لعلاج حالات الإكتئاب من أسباب وأعراض مختلفة لدى الأطفال والمراهقين (من أعمار 0-17 سنة) وذلك لأنه لا توجد معلومات كافية حول سلامة ونجاعة أنافرانيل في علاج هذا الإستطباب لدى الأطفال والمراهقين.

اضطراب الوسواس القسري

Obsessive compulsive disorder (OCD)

لا تتوفر خبرة بخصوص الأطفال الصغار من عمر 5 سنوات

الفصيلة العلاجية

مضادات الإكتئاب من فصيلة ثلاثية الحلقة، مثبتبات غير إنشائية لإعادة إستيعاب المونوأمين.

يستعمل أنافرانيل لدى الكبار لعلاج أنواع مختلفة من الإكتئاب واضطرابات الوسواس القسري المتعلقة بالسلوك والأفكار القسرية. ويتحسن كذلك المزاج والأعراض الجسدية مثل قلة النوم، الدوار، خفقان القلب واضطرابات أخرى.

يستعمل أنافرانيل أيضاً لعلاج اضطرابات الوسواس القسري لدى أطفال ومراهقين فوق عمر 5 سنوات.

يعمل أنافرانيل على ما يبدو على زيادة كمية النواقل الكيميائية الطبيعية (نورأدرينالين وسيروتونين) في الدماغ أو إطالة مدة تأثيرها.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا وُجد لديك أو كان لديك فرط حساسية (رد فعل تحسسي) ل كلوميبرامين أو لكل واحد من المركبات الإضافية المفضلة في الفقرة 6 «معلومات إضافية»، أو لأي دواء آخر من فصيلة مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة
- بمشاركة أدوية معينة لعلاج الإكتئاب مثل أدوية من فصيلة مثبتطات مونو أمين أوكسيداز (MAO) أو خلال 14 يوماً قبل أو 14 يوماً بعد علاج بمثبطات MAO
- بمشاركة أدوية مضادة للأنظمة مثل كينيدين وپروپايبنون
- إذا إجتزت نوبة قلبية في الآونة الأخيرة، أو إذا كنت تعاني من مرض قلبي خطير (متلازمة إطالة المقطع QT الخلقية)

في الحالات التالية:

- التسمم الخطير من مثبتطات الجهاز العصبي المركزي (مثل الأدوية المنومة، مسكنات الألم أو المستحضرات النفسية) أو من الكحول
- إحتباس بول شديد
- إرتباك شديد (هذيان)
- جلوكوما (ارتفاع الضغط داخل العين) ضيقة الزاوية غير المعالِية
- تضخم مفرط للبروستات مع إحتباس البول
- تضيّق فتحة البواب (الممر بين المعدة والأثني عشر)
- إسناد الأمعاء الشللي

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

في ظروف معينة، لا يجوز تناول أنافرانيل أو يمكن تناوله فقط بعد إجراء تقييم طبي دقيق. لذلك، يجب إعلام الطبيب إذا كنت تعاني أو إذا عانيت من إحدى الاضطرابات أو الأمراض التالية:

- الميل لحدوث نوبات صرعية
- اضطرابات في نظم القلب أو مشاكل أخرى في القلب أو الأوعية الدموية
- حالات نفسية أخرى
- ارتفاع الضغط داخل العين (جلوكوما)
- مرض في الكبد أو الكلى
- تغيرات في تعداد خلايا الدم
- تسمم (من الأدوية مثلاً)
- اضطرابات في تفرغ المعدة
- صعوبات في التبول أو تضخم غدة البروستات
- فرط نشاط الغدة الدرقية (thyroid) أو تناول أدوية علاج الغدة الدرقية بنفس الوقت مع تناول أنافرانيل
- الإدمان على الكحول
- إسماك أو إسناد الأمعاء بشكل متكرر
- إغماء
- تغير المزاج من إكتئاب إلى نشوة قصوى
- إذا وُجدت لديك أفكار إنتحارية
- إذا كنت تعاني من مرض الفصام
- إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعلاج بالصدمام الكهربائية (ECT)
- إذا كنت تتناول أدوية معينة لعلاج الإكتئاب، مثل: مثبتبات إعادة إمتصاص السيروتونين الإنشائية (SSRIs) (مثل فلوأوكسيتين) أو مثبتطات إعادة إمتصاص السيروتونين ونورأدرينالين (SNaRIs)، مضادات إكتئاب أخرى ثلاثية الحلقة والليثيوم
- إذا كنت تعاني من نقص البوتاسيوم (إنخفاض تركيز البوتاسيوم في الدم)

وسائل حذر إضافية

- من المهم أن نتناقش أنت وأبناء عائلتك أو الذين يعالجونك مع الطبيب بخصوص أي تغير في المزاج خلال العلاج ب أنافرانيل.
- بَلِّغ طبيبك، إذا كنت تضع العدسات اللاصقة وتعاني من تهيج في العينين.
- بلغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول أنافرانيل وذلك قبل أي إجراء جراحي أو قبل بدء علاج الأسنان.
- أنافرانيل قد يسبب زيادة حساسية الجلد لضوء الشمس، لذلك يجب الإمتناع عن التعرض المباشر لضوء الشمس، وضع النظارات الشمسية، وحماية الجلد بأئسة مناسبة.
- بلغ الطبيب أو الصيدلي خاضتك إذا كنت تقاسي من الإغماء، أي مرض آخر، أية حساسية، عدم تحمل للسكر (مثلاً لكتوز، سكروز) أو كنت تتناول أي دواء (بما في ذلك بدون وصفة طبية) أو أية أدوية للإستعمال الخارجي.

الفحوص والمتابعة

من المهم أن يقوم طبيبك بمراقبة تقدم علاجك بشكل دائم وذلك كي يتمكن من ملائمة المقدار الدوائي ونتيجة لذلك تقليل

الأعراض الجانبية.

من الجائز أيضاً أن يقوم طبيبك بإجراء فحوص الدم، يقيس ضغط دمك ويفحص الأداء الوظيفي لقلبك ووظائف الكبد.

قد يسبب أنافرانيل جفاف في الفم، الذي من شأنه أن يزيد من خطورة حدوث تَسوّس الأسنان. لذلك، خلال فترة العلاج المطوّل، يجب الخضوع لفحوص الأسنان بشكل دائم.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال وللمراهقين دون عمر 18 سنة إذا وُصِف لعلاج الإكتئاب من مصادر مختلفة.
الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 5 سنوات إذا وُصِف لعلاج اضطراب الوسواس القسري (OCD).

معلومات للعائلات وللمعالجين

عندما يُعطى أنافرانيل للأطفال وللمراهقين يجب الإنتباه للتغيرات السلوكية.

قد تتفاقم أعراض الإكتئاب، خاصة السلوك الإنتحاري، وذلك خلال فترة العلاج ب أنافرانيل.
فإذا تفاقمت، يجب الإتصال بالطبيب بشكل فوري.
لقد كانت هنالك تقارير عن زيادة وتيرة الاضطرابات السلوكية – بما في ذلك زيادة خطورة حدوث أفكار إنتحارية، إلحاق الضرر بالنفس والإنتحار – لدى الأطفال، المراهقين والشبان (حتى عمر 25 سنة) الذين لديهم إكتئاب أو تشخيصات نفسية أخرى والمُتعالجين بمضادات الإكتئاب.
لوحظ هذا الأمر ضمن معلومات من الأبحاث السريرية.
لا يجوز التوقف عن العلاج بشكل مفاجئ إلا بإستشارة الطبيب فقط وذلك لأنه قد تظهر أعراض الفطام.

المُتعالجون المستون

يحتاج المُتعالجون المستون عادة إلى مقادير دوائية أخفض من المُتعالجين الشبان ومن المُتعالجين في متوسط العمر.
إن إحتمال ظهور أعراض جانبية يكون أكبر لدى المُتعالجين المسنين.
يوفر الطبيب كافة المعلومات بخصوص الحذر في المقدار الدوائي والحاجة لإجراء مراقبة حثيثة.

الحمل والإرضاع

يجب إعلام الطبيب إذا كنت حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعة.
لا يجوز تناول أنافرانيل خلال فترة الحمل إلا إذا وُصِف بشكل خاص من قبل الطبيب.

يدرس الطبيب الخطورة المحتملة على الجنين مقابل الفائدة الطبية للأم ويقرر بشأن إستعمال أنافرانيل.

تنتقل المادة الفعالة ب أنافرانيل إلى حليب الأم ولذلك توصى الأمهات اللواتي يتناولن أنأفرانيل بعدم الإرضاع.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إتحك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية للقلب أو لضغط الدم
- أدوية تؤثر توتّر على الجهاز العصبي المركزي (مثل باربيتورات، بينزوديازيبينات، مواد تخدير للجعلميات الجراحية)
- مضادات الإكتئاب الأخرى (مثل: أدوية من فصيلة الـ SSRIs أو الـ SNaRIs)
- أدوية للتهدئة
- أدوية للصرع (مثل: باربيتورات أو حمض فالپيروثيك، كاربامازيبين وفينيتوين)

- أدوية تحت على النوم (مثل: بينزوديازيبينات)
- مسكنات الألم القوية (المواد الأفيونية)
- أدوية مانعة لتخثر الدم (مضادات تخثر الدم)
- أدوية للربو أو الحساسية
- أدوية لداء الـ پاركينسون
- أدوية للغدة الدرقية
- أدوية التي تحتوي على المادة الفعالة سيميتيدين لفرط إفراز الحوض في المعدة أو للقرحات المعدية

- وسائل منع الحمل الهرمونية (أقراص منع الحمل)
- إستروجينات
- ميثيل فينيدات (يستعمل خاصة لإضطراب الإصغاء والتركيز (ADHD))

- أدوية معينة لتخفيض شحوم الدم (راتنج مُبادل للشوارد) نظراً لأنه من الجائز أن تتداخل الكثير من الأدوية مع أنافرانيل، فمن الجائز أن يحتاج الأمر لملائمة المقدار الدوائي أو إيقاف العلاج بإحدى الأدوية.

إستعمال أنافرانيل والطفام

● **الجرّب فروت، عصير الجريب فروت، عصير التوت البري ـ من شأنها أن تؤثر على عمل الدواء**

السياقة وإستعمال الماكنت

من شأن هذا الدواء أن يضعف من ردود فعلك، قدرتك على السياقة وقدركت على إستعمال الأجهزة أو الماكنت.

من شأن أنافرانيل أن يجعلك تميل للنوم، وأن يقلل من يقظتك أو يؤدي لتشوش الرؤية.
إذا حدث لك هذا الأمر، تجنب سياقة المركبة، إستعمال الماكنت أو أي نشاط يتطلب يقظة كاملة.
من شأن هذه التأثيرات أن تشدّد عن طريق أدوية أخرى أو الكحول.
بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو اللعب بمقرّبة من الشارع وما شابه.

إستهلاك الكحول

يوصى خلال فترة العلاج بالإمتناع عن شرب الكحول وذلك لأن أنافرانيل قد يقلل من تحمل الكحول.

التدخين

يجب إبلاغ طبيبك عن التغيرات في عادات التدخين.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

أنافرانيل 25 ملغ، أقراص مطلية:
يحتوي القرص على لكتوز وسكروز.
إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة (مثلاً: لكتوز، سكروز)، إتصل بالطبيب قبل تناول أنافرانيل 25 ملغ، أقراص مطلية.

أنافرانيل إس. آر. 75 ملغ أقراص:
يحتوي القرص على زيت الخروع (castor oil) الذي من شأنه أن يسبب الإزعاج في البطن والإسهال.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاع من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة تناول

أنافرانيل إس. آر. 75 ملغ أقراص:

بالإمكان شطر الأقراص لكن لا يجوز مضغها.

أنافرانيل 25 ملغ: لا تتوفر معلومات بخصوص شطر أو مضغ القرص.

بالإمكان تناول أنافرانيل مع الطعام أو بدون الطعام.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

الأعراض التالية لفرط المقدار الدوائي تظهر عادة خلال عدة ساعات: نعاس شديد؛ تركيزٌ متدني؛ ضبابية العواس؛ نبض سريع، بطيء أو غير منتظم؛ قلة راحة وقلة هدوء؛ فقدان تناسق العضلات وتصلب العضلات؛ ضيق تنفس؛ إختلاجات؛ تقوؤات، سخونة.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. من الجائز أن يحتاج الأمر علاجاً طبياً.

إن المقدار الدوائي المفرط من هذا الدواء يشكل خطراً خاصة على الأطفال الصغار.

إذا نسيت تناول الدواء

يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة كما حدّد من قبل الطبيب المعالج.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول المقدار الدوائي المنسي بأسرع ما يمكن والعودة لجدول الأوقات الاعتيادي. مع ذلك، إذا حان تقريباً موعد تناول المقدار الدوائي القادم، يجب تقوية المقدار الدوائي المنسي ومواصلة خطة العلاج الاعتيادية.

يجب المراقبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لعلاج الإكتئاب ولعلاج إضطراب الوسواس القسري يتطلب الأمر علاجاً مطوّلاً بـ أنافرانيل. فترة العلاج تحدّد من قبل الطبيب فقط. من الجائز أن يرغب الطبيب بخفض المقدار الدوائي بشكل تدريجي قبل الإيقاف الكامل للعلاج، وذلك لمنع تفاقم الحالة ولخفض الخطورة لظهور أعراض الفطام من الدواء، مثلاً: الشعور بوعكة، آلام في البطن، إسهال، صعوبة في النوم، قلق أو عصبية، صداع، غثيان وشعور عام بالإزعاج.

لا يجوز تناول الأدوية في العنمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أنافرانيل قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

الأعراض الجانبية التي تستوجب إهتمام خاص

- من شأنها أن تحدث إضطرابات في كمية السوائل ونسبة الأملاح في الجسم، التي تترافق بأعراض مثل إرتباك، هلوسة، إختلاجات ووذمة دماغية (إنتفاخ جراء تراكم السوائل في الدماغ)، في مثل تلك الحالات يجب التوجه فوراً إلى الطبيب.
- يمكن أن تحدث بشكل نادر جداً، متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (neuroleptic malignant syndrome). الأعراض الرئيسية هي سخونة، نبض غير منتظم، إضطرابات في الوعي وتصلب العضلات، في مثل هذه الحالات يجب التوجه فوراً إلى الطبيب.
- أدوية مثل أنافرانيل، لوحدها أو بمشاركة أدوية أخرى، قد تسبب متلازمة السيروتونين. الأعراض المميزة لهذه المتلازمة هي: سخونة، تشنجات عضلية، إختلاجات، قلة هدوء، إرتباك وفقدان الوعي. في مثل هذه الحالات يجب التوجه فوراً إلى الطبيب.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً - أعراض التي تظهر لدى أكثر من

مستعمل واحد من بين عشرة

- الشعور بدوران
- إزهاق مؤقت
- دوار
- رجفة
- قلة راحة
- زيادة الشهية للطعام
- زيادة في الوزن
- جفاف في الفم
- إضطرابات في التبول
- تشنجات عضلية
- عدم القدرة على تركيز الرؤية
- تشوش الرؤية
- صداع
- تعرق
- إمساك

أعراض جانبية غير شائعة - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين

- من بين 1,000
- إرتفاع ضغط الدم
- إختلاجات
- إضطرابات في نظم القلب
- فقدان الشهية للطعام
- إضطرابات في الحركة وفي تناسق الحركات (coordination)
- تغيرات في الإدراك والأحاسيس

أعراض جانبية شائعة - أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستعملين

- من بين 100
- إرتباك مع توهان البغلاء وهلوسة
- إضطرابات في التركيز
- إضطرابات في النطق
- طعم سيء في الفم
- إضطرابات في النوم
- قلق
- فرط حيوية ومزاج عال
- فرط إنفعال
- عدوانية
- إضطرابات في السلوك
- تدني الذاكرة
- نتاؤب

- أرق
- كوابيس
- غدر أو الشعور بوغز في الذراعين والرجلين
- ضعف العضلات
- تصلب العضلات
- هبات الحر
- توسّع الحدقتين
- فحقان القلب
- انخفاض ضغط الدم بمشاركة دوار أثناء تغيير الوضعية
- تفاقم الإكتئاب
- غثيان
- حساسية للضوء
- ردود فعل جلدية تحسسية
- جلد حاك
- إرتفاع قيم الفحوص المخبرية
- إضطرابات في الأداء الوظيفي الجنسي والرغبة الجنسية (للبيبدو)
- غثنين في الأذنين

أعراض جانبية غير شائعة - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين

- من بين 1,000
- إرتفاع ضغط الدم
- إختلاجات
- إضطرابات في نظم القلب
- فقدان الشهية للطعام
- إضطرابات في الحركة وفي تناسق الحركات (coordination)
- تغيرات في الإدراك والأحاسيس

● تقبؤ

- أمراض في المعدة والأمعاء
- إسهال
- تضخم غدد الثدي وزيادة إفراز الحليب
- إضطرابات في النوم
- طعم سيء في الفم

أعراض جانبية نادرة جداً - أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000

- سخونة مرتفعة
- تناقص عدد خلايا الدم البيضاء (leukocytopenia)، تناقص عدد الصفائح الدموية (thrombocytopenia)، تناقص عدد خلايا الدم البيضاء من نوع العدلات (agranulocytosis) أو إرتفاع عدد خلايا الدم البيضاء من نوع الحمضات (eosinophilia)
- نزف من تحت الجلد
- ردود فعل لفرط الحساسية (ألرجيا) التي تشمل صدمة (shock) مع ردود فعل في الرئتين وكامل الجسم
- إضطرابات في الحركة
- جلوكوما
- إضطرابات في التوصيل الكهربائي للقلب
- التهاب الكبد مع أو بدون يرقان
- وذمة (إنتفاخ المفاصل، اليدين أو أجزاء أخرى من الجسم)
- تساقط الشعر
- نتاج غير كاف للبول
- تغيرات في EEG
- التهاب الرئتين

أعراض جانبية شيعوا غير معروف (أعراض شيعوها لم يحدد بعد)

- عدم إرتياح داخلي ورغبة دائمة في الحركة
- حركات شاذة لا إزادية متكررة
- تفكك العضلات
- إرتفاع نسبة الهورمون الذي ينتج الحليب (الپرولاكتين) في الدم
- قذف متأخر للسائل المنوي أو فشل القذف (لدى الرجال)
- غالبية الأعراض الجانبية التي فصلت سابقاً تزول خلال فترة العلاج بعد فترة التعود على المستحض.
- إذا كانت تلك الأعراض مطوّلة أو مزعجة، يجب مراجعة الطبيب.
- لقد كانت هنالك تقارير عن زيادة وتيرة الإضطرابات السلوكية - بما في ذلك زيادة خطورة حدوث أفكار إنتحارية، إلحاق الضرر بالنفس والإنتحار - لدى الأطفال والمراهقين الذين لديهم إكتئاب أو تشخيصات نفسية أخرى والمُتعالجين بمضادات الإكتئاب

● لوحظت خطورة زائدة لحدوث كسور في العظام لدى المُتعالجين بأعمار 50 سنة وما فوق الذين يتناولون دواء من هذا النوع

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.i) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.i

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا تسبب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية، يجب الحماية من الرطوبة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

أنافرانيل 25 ملغ:

Sucrose, Lactose monohydrate, Talc, Maize starch, Silica colloidal anhydrous, Stearic acid, Magnesium stearate, Glycerol 85%, Hypromellose, Vinylpyrrolidone, Povidone, Titanium dioxide (Cl 77891, E171), Polyethylene glycol 8000, Cellulose microcrystalline, Iron oxide yellow (Cl 77492, E172).

يحتوي كل قرص على 15 ملغ لكتوز مونوهيدرات وحوالي 17 ملغ سكروز.

أنافرانيل إس. آر. 75 ملغ أقراص:

Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Polyacrylate dispersion 30%, Calcium stearate, Hypromellose, Talc, Silica, colloidal anhydrous, Castor oil hydrogenated, Pigment suspension white: Titanium dioxide (Cl 77891, E171), Hypromellose (E464), Pigment suspension red: Iron oxide red (Cl 77491, E172), Hypromellose (E464).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

أنافرانيل 25 ملغ:

قرص ذو طلاء سكري، لونه أصفر فاتح، مستدير ومحدّب من كلا الجانبين.

حجم العبوة: 30 قرصاً.

أنافرانيل إس. آر. 75 ملغ أقراص:

قرص مطلي زهري اللون، على شكل كبسولة، محدّب وعليه علامة للشطر من كلا الجانبين. مطبوع عليه من جانب CG ومن الجانب الثاني GD.

حجم العبوة: 20 قرصاً.

إسم صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم إعدادها في تشرين الأول 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

أنافرانيل 25 ملغ:

108 06 24600

أنافرانيل إس. آر. 75 ملغ:

053 91 26407

من أجل سهولة وتبويب القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.