

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986
الاستعمال لمن عمره دون الـ 6 أشهر يكون بحسب وصفة طبيب فقط.
لمن عمره فوق الـ 6 أشهر يُسوق الدواء بدون وصفة طبيب.

أدقيل للأولاد معلق بطعم العنب

100 ملغ/5 ملل

أدقيل للأولاد معلق بطعم الفواكه

100 ملغ/5 ملل

المادة الفعالة وتركيزها:

تحتوي كل 5 ملل على: إيبوبروفين (Ibuprofen) 100 ملغ

للاطلاع على قائمة المواد غير الفعالة ومسببات الأرجية: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية" والفصل 2 "قبل استعمال الدواء" - البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في الفصل 3 - "كيف تستعمل الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.
يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 24 ساعة لدى الأطفال الرضع الذين عمرهم 3-6 أشهر أو بعد 3 أيام لدى الأولاد الذين عمرهم 6 أشهر فما فوق.

هذا الدواء ملائم لمعظم الأطفال الرضع الذين عمرهم فوق 3 أشهر، للأولاد وللبالغين.
الاستعمال لدى الأطفال الرضع الذين عمرهم 3-6 أشهر يكون بحسب وصفة طبيب.

يجب مراجعة الطبيب إذا كان ولدك يستعمل الأسبيرين بجرعة دوائية أعلى من 75 ملغ في اليوم أو إذا نشأ لدى ولدك طفح جلدي، صعوبات في التنفس، إسهال أو تعب متزايد.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

لخفض الحرارة وتسكين الآلام الخفيفة إلى المتوسطة، لدى الأطفال الرضع والأولاد من عمر 3 أشهر وحتى 12 عاماً.
الفصيلة العلاجية: مضادات الالتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs).

2. قبل استعمال الدواء

هذا الدواء ملائم لمعظم الأشخاص، لكن يجب على أشخاص معينين الامتناع عن استعماله. استشر الصيدلي أو الطبيب إذا لم تكن متأكدًا.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك أو لدى ولدك حساسية (أرجية) لإيبوبروفين أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).
- كانت لديك أو لدى ولدك في الماضي ردود فعل تحسسية (مثل الربو، التهاب الأنف (رينيتيس)، انتفاخات تحت الجلد (وذمة وعائية) أو شرى (أورتيكاريا)) نتيجة لاستعمال إيبوبروفين، حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين) أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب لاستيرويديية (NSAIDs).
- وجدت لديك أو لدى ولدك الآن (أو كانت لديك أو لدى ولدك في الماضي) قروح/نزيف دموي في المعدة (حدثان بارزان أو أكثر من الانتقاب أو النزيف المثبتين).
- عانيت أو عانى ولدك في الماضي من نزيف دموي أو من انتقاب في الجهاز الهضمي مرتبطين بعلاج سابق بأدوية مضادة للالتهاب لاستيرويديية (NSAIDs).
- كنت تعاني أو كان ولدك يعاني الآن من قصور الكبد الخطير، قصور الكليتين الخطير أو قصور القلب الخطير.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بأدقيل للأولاد، أخبر الطبيب إذا:

- عانيت أو عانى ولدك الآن أو في الماضي من ضغط دم مرتفع، من مشاكل في القلب أو من سكتة دماغية، لأن هناك ارتفاع طفيف في خطر حدوث مشاكل في القلب عند استعمال إيبوبروفين.
- كنت تعاني أو كان ولدك يعاني من عامل خطورة لمشاكل في القلب، مثل السكري أو الكوليسترول المرتفع.
- كنت تعاني أو كان ولدك يعاني من الربو أو من أي مرض تحسسي في الرئتين.
- عانيت أو عانى ولدك الآن أو في الماضي من مشاكل في الكبد، الكلية، القلب أو الأمعاء.
- كنت مصابًا أو كان ولدك مصابًا بالتجفاف، لوجود خطر لحدوث مشاكل في الكلية.
- كنت تعاني أو كان ولدك يعاني من الذئبة الحمامية المجموعية (SLE)، مرض مناعي ذاتي) أو من مرض مشابه آخر.
- كنت تعاني أو كان ولدك يعاني من مرض التهابي مزمن في الأمعاء مثل داء كرون أو الالتهاب التقرحي في الأمعاء الغليظة (التهاب القولون التقرحي).
- يوصى بالامتناع عن استعمال الدواء خلال الفترة التي يوجد فيها جدري الماء (الحماق).
- كان متلقي العلاج مصابًا بتلوث - لأن أدقيل للأولاد قد يخفي علامات التلوثات مثل الحمى والألم. لذلك، من شأن هذا الدواء أن يؤخر العلاج المناسب للتلوث، مما قد يؤدي إلى تزايد خطر حدوث مضاعفات. شوهدت حالات كهذه في حالات التهاب الرئتين التي تسببها الجراثيم، وتلوثات الجلد الجرثومية المرتبطة بجدري الماء (الحماق). إذا كنت تستعمل أو كان ولدك يستعمل هذا الدواء في أثناء وجود تلوث لديكما وكانت أعراض التلوث لديكما مستمرة أو أخذت في التفاقم، فاستشر الطبيب دون تأجيل.

ردود فعل جلدية - تم التبليغ عن ردود فعل جلدية خطيرة في سياق العلاج بهذا الدواء. يجب عليك التوقف عن تناول/إعطاء الدواء والتوجه فورًا لتلقي العلاج الطبي، إذا تطور لديك أو لدى ولدك طفح جلدي، آفات في الأنسجة المخاطية، حويصلات أو علامات أخرى على الأرجية، لأن ذلك قد يكون العلامة الأولى على رد فعل جلدي خطير جدًا. انظر الفصل 4.

تحذيرات أخرى

- تتطبق التحذيرات التالية تحديدًا على البالغين. على أي حال، فكر بها جيدًا قبل إعطاء أو تناول هذا الدواء:
- قد ترتبط أدوية مثل أدقيل بارتفاع طفيف في خطر الإصابة بنوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو بسكتة دماغية. تزداد احتمالية أي خطر عند تناول جرعات دوائية عالية وعند العلاج المتواصل. يُمنع تجاوز الجرعة الدوائية أو مدة العلاج الموصى بهما.
 - إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، إذا أصبت بسكتة دماغية أو إذا كنت تظن أنك معرض لخطر الإصابة بهذه الحالات (على سبيل المثال إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع، سكري أو كوليسترول مرتفع، أو إذا كنت مدخنًا)، فعليك أن تتحدث مع الطبيب أو الصيدلي بخصوص العلاج.
- إذا كنت مسنًا فاستشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

يجب إخبار الطبيب فورًا إذا:

- لم تختف أعراض ولدك بشكل سريع أو إذا كانت أخذت في التفاقم.
- لم تكن متأكدًا من ماهية مرض ولدك أو إذا كان المرض مصحوبًا بالطفح الجلدي، الصعوبات في التنفس، الإسهال أو التعب المتزايد.

التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تستعمل أو كان ولدك يستعمل، أو قد استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل أو كان ولدك يستعمل:
- أدوية أخرى تحتوي على إيبوبروفين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب لاستيرويدية، بما في ذلك تلك التي تستطيع شراءها دون وصفة طبيب.
 - الأسبيرين بجرعة دوائية منخفضة (حتى 75 ملغ في اليوم).
 - مدرات البول (تساعد على التبول).
 - مضادات التخثر (أدوية مميعة للدم مثل وارفارين).
 - أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع (مثل كابتوبريل، أتينولول، لوسارتان).
 - الليثيوم (لاضطرابات المزاج).
 - ميتوتريكسات (للصدفية، لالتهاب المفاصل ولأنواع من السرطان).

- زيدوفودين (لـ HIV، فيروس العوز المناعي البشري).
 - كورتيكوستيرويدات (دواء مضاد للالتهاب).
 - الجليكوزيدات القلبية (لمشاكل القلب).
 - سيكلوسبورين أو تاكروليموس (لمنع رفض الأعضاء بعد الزراعة).
 - ميفيبريستون (لإيقاف الحمل).
 - مضاد حيوي من فصيلة الكوينولونات (للتلوثات).
 - أدوية مضادة للاكتئاب من فصيلة SSRI.
 - أدوية مضادة للصفائح الدموية مثل ديبيري دامول، كلويدوچريل.
- إذا لم تكن متأكدًا من أنواع الأدوية التي يستعملها ولدك، فاعرض الدواء على الطبيب أو الصيدلي.

استعمال الدواء والطعام

لدى متلقي العلاج ذوي المعدة الحساسة، بالإمكان استعمال الدواء مع وجبة الطعام أو بعدها.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

الحمل

هناك عرض جانبي محتمل لهذا الدواء وهو التضرر الكلوي لدى الجنين وقلة السائل السلوي (الأمنيوسي) ابتداءً من الأسبوع الـ 20 من الحمل. يوصى بالامتناع عن استعمال أدوية من فصيلة NSAIDs ابتداءً من الأسبوع الـ 20 من الحمل.

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء خلال الأشهر الـ 6 الأولى من الحمل. لا يجوز استعمال أدقيل للأولاد خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل.

الإرضاع

في بضع دراسات، وُجدت تراكيز منخفضة جدًا لإيبوبروفين في حليب الأم، لكن من غير المرجح أن يكون لهذه الكميات تأثير على الطفل الرضيع.

الخصوبة

ينتمي إيبوبروفين إلى فصيلة أدوية قد تخل بالخصوبة لدى النساء. هذا الشيء قابل للانعكاس عند إيقاف استعمال الدواء. ليس مرجحًا أن يؤثر استعمال هذا الدواء من حين إلى آخر على احتمالات إحداث حمل لديك، مع ذلك، أخبري الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت تعانين من صعوبات في إحداث حمل.

السياقة واستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن تكون هناك تأثيرات على القدرة على السياقة وتشغيل الماكينات عند الالتزام بالجرعات الدوائية ومدة العلاج الموصى بها.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي هذا الدواء على السوكروز بتركيز 2.5 غم/5 ملل. يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار لدى متلقي العلاج المصابين بالسكري.
- يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليومول من الصوديوم (23 ملغ) في كل 15 ملل ولذلك يُعتبر خاليًا من الصوديوم.
- يحتوي هذا الدواء على السوربيتول. قد يسبب السوربيتول انزعاجًا في المعدة والأمعاء، وقد يؤدي إلى تأثير مسهل معتدل.
- يحتوي هذا الدواء على 12.5 ملغ من بينزوات الصوديوم في كل 5 ملل.
- يحتوي أدقيل للأولاد معلق بطعم العنب على 1.9 ملغ من بروبيلين جليكول في كل ملل.
- يحتوي أدقيل للأولاد معلق بطعم الفواكه على 0.4 ملغ كحد أقصى من الكحول البيئزيلي في كل ملل. قد يسبب الكحول البيئزيلي ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء. الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:

جدول الجرعات الدوائية بحسب الوزن

الوزن (كغم)	الجرعة الدوائية	عدد المرات في 24 ساعة
-------------	-----------------	-----------------------

	بحسب ملل للاستعمال بالمحقنة أو بملعقة القياس الصغيرة	بحسب TSP المشار إليه على كأس القياس الصغيرة	
	بحسب وصفة طبيب		أقل من 5 كغم
4-3	2 ملل	-	5.4-5
4-3	2.5 ملل	-	8.1-5.5
4-3	3.75 ملل	-	10.9-8.2
4-3	5 ملل	1 TSP	15-11
4-3	7.5 ملل	1.5 TSP	21-16
4-3	10 ملل	2 TSP	26-22
4-3	12.5 ملل	2.5 TSP	32-27
4-3	15 ملل	3 TSP	43-33
يجب الحرص على الخض جيداً قبل الاستعمال.			

جدول الجرعات الدوائية بحسب العمر			
عدد المرات في 24 ساعة	الجرعة الدوائية		العمر (سنوات)
	بحسب ملل للاستعمال بالمحقنة أو بملعقة القياس الصغيرة	بحسب TSP المشار إليه على كأس القياس الصغيرة	
	بحسب وصفة طبيب		6-3 أشهر
4-3	2.5 ملل	-	11-6 شهرًا
4-3	3.75 ملل	-	23-12 شهرًا
4-3	5 ملل	1 TSP	3-2
4-3	7.5 ملل	1.5 TSP	5-4
4-3	10 ملل	2 TSP	8-6
4-3	12.5 ملل	2.5 TSP	10-9
4-3	15 ملل	3 TSP	12-11
يجب الحرص على الخض جيداً قبل الاستعمال.			

قد تتفاوت أوزان الأولاد من نفس العمر بشكل ملحوظ. لذلك يجب الاجتهاد في استيضاح وزن الولد وتحديد الجرعة الدوائية بحسب جدول الوزن. يمكن تحديد الجرعة الدوائية بحسب هذا الجدول فقط إذا لم يكن ممكناً استيضاح وزن الولد.

لا يجوز إعطاء الدواء للأطفال الرضع الذين عمرهم أقل من 3 أشهر (إلا إذا أمر الطبيب بذلك) أو للأطفال الرضع الذين ورنهم أقل من 5 كغم دون أمر من الطبيب. يجب أن يتم إعطاء الجرعات كل 6-8 ساعات، بفواصل زمنية من 4 ساعات على الأقل بين الجرعة والأخرى. لا يجوز تناول ما يزيد عن الجرعة الدوائية الموصى بها في 24 ساعة. بالنسبة للأطفال الرضع الذين عمرهم 3-6 أشهر فإن الاستعمال يكون بحسب وصفة طبيب. من عمر 6 أشهر فما فوق، يكون الاستعمال دون وصفة طبيب.

إذا كان وزن الولد معلوماً لك - فيجب إعطاء الجرعة الدوائية كما يظهر في جدول الوزن الذي يشير إلى الجرعة الدوائية بحسب الوزن.

فقط إذا كان وزن الولد غير معلوم - فسيتم تحديد الجرعة الدوائية بحسب العمر كما يظهر في جدول العمر الذي يشير إلى الجرعة الدوائية بحسب عمر الولد.

تحذير: يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج
للاستعمال قصير الأمد فحسب.

لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من 24 ساعة لدى الأطفال الرضع الذين عمرهم 3-6 أشهر. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 24 ساعة أو تفاقمت، فيجب استشارة الطبيب.
لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من 3 أيام لدى الأولاد الذين عمرهم 6 أشهر فما فوق. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أيام أو تفاقمت، فيجب استشارة الطبيب.
يجب تناول أقل جرعة لأقصر مدة زمنية للتخفيف من الأعراض.
استشر الطبيب دون تأجيل إذا استعملت ذلك هذا الدواء أثناء وجود تلوث لديه وكانت أعراضه مستمرة أو أخذت في التفاقم.

كيفية تناول
يجب دومًا خض القنينة جيدًا قبل الاستعمال.

تعليمات الفتح

لنزع السداد، يجب الضغط عليه باتجاه الأسفل، وتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.
قللت السدادات المستعصية على الفتح من قبل الأولاد عدد حالات التسمم الناجمة عن الأدوية في كل سنة بشكل ملحوظ.
لكن، إذا صعب عليك فتح العبوة، فبإمكانك التوجه إلى الصيدلي لطلب إزالة نظام الأمان الخاص بالسداد وتحويله إلى سداد عادي، سهل الفتح.

يجب عليك استعمال المحقنة أو الكأس الصغيرة المخصصتين لقياس الكمية الصحيحة من الدواء. إذا لم يتم إرفاق أداة قياس بالعبوة، فاستشر الصيدلي. لا يجوز استعمال الملعقة الصغيرة البيئية لقياس كمية الدواء. تختلف الملاعق الصغيرة البيئية من حيث حجمها وقد لا تحصل على كمية الدواء الصحيحة عند استعمالها.
لا يجوز استعمال الدواء عندما تكون الحلقة البلاستيكية الموصولة بالسداد مكسورة أو منفصلة عنه.

إذا استعملت أو أعطيت ولدك جرعة دوائية أكبر من اللازم

إذا تناولت أو تناول ولدك جرعة أكبر من اللازم، أو إذا قام ولدك ببلع الدواء بالخطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى أقرب مستشفى لتلقي المشورة بخصوص الخطورة والاستشارة بخصوص الإجراء الذي يجب اتخاذه. أحضر معك عبوة الدواء. قد تشمل الأعراض على غثيان، ألم في البطن، تقيؤ (قد تكون هناك كمية قليلة من الدم)، صداع، طنين في الأذنين، ارتباك وحركات فقايزة في العينين.
عند استعمال جرعات دوائية عالية تم التبليغ عن نعاس، آلام في الصدر، دقات قلبية قوية، فقدان الوعي، تشنجات (بالأخص لدى الأولاد)، ضعف ودوار، دم في البول، إحساس بالبرودة في الجسم ومشاكل في التنفس.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت إعطاء أو تناول جرعة، فقم بإعطاء أو تناول الجرعة القادمة وفقًا للحاجة، بشرط أن تكون قد مرت 4 ساعات على الأقل على موعد تناول الجرعة السابقة. لا يجوز إعطاء أو تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواءً. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال أدقيل للأولاد إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني أو لا يعاني ولدك من أي واحد منها.

العرض الجانبي الأكثر شيوعًا هو تهيج المعدة الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل صعوبات الهضم والحرقة.

يجب التوقف عن إعطاء الدواء لولدك وإخبار الطبيب فورًا في حالة:

- دم في البراز
- براز قطراني (زفتي) أسود
- تقيؤ الدم أو جزيئات غامقة تبدو كحببيات القهوة
- أزيز غير مفسر، ربو، ضيق التنفس، طفح جلدي (قد يكون خطيرًا ومصحوبًا بالحويصلات أو بتقشر الجلد)، حكة أو كدمات، ردود فعل جلدية خطيرة بما في ذلك متلازمة ستيفينس جونسون، نظم قلبي سريع، احتباس السوائل (انتفاخ الكاحلين أو انخفاض في كمية البول)
- رقبة متصلبة، صداع، غثيان، تقيؤ، حمى وتوهان

- انتفاخ الوجه، اللسان أو الحنجرة (قد تكون هذه علامات على رد فعل تحسسي خطير)
- رد فعل جلدي يُعرف باسم متلازمة DRESS (متلازمة رد الفعل الدوائي مع كثرة اليوزينييات والأعراض الجهازية). تشتمل أعراض DRESS على: طفح جلدي، حمى، انتفاخ الغدد الليمفاوية وارتفاع عدد اليوزينييات (نوع من خلايا الدم البيضاء)

يجب التوقف عن إعطاء الدواء لولدك وإخبار الطبيب في حالة:

- ألم غير مفسر في البطن، صعوبات في الهضم، حرقة المعدة، غثيان أو تقيؤ
- اصفرار العينين، براز شاحب اللون وبول غامق اللون (قد تكون هذه علامات على مشاكل في الكلية أو في الكبد)
- ألم شديد في الحنجرة مصحوب بحمى مرتفعة
- كدمات أو نزيف دموي غير مفسرة، تعب، الإصابة بالعدوى بكمية أكثر من المعتاد من التلوثات مثل تقرّحات في الفم، زكام (نزلات البرد)، ألم في الحنجرة، حمى (قد تكون هذه علامات على فقر الدم أو اضطرابات أخرى في الدم)

أعراض جانبية أخرى

أعراض جانبية غير شائعة:

- صداع

أعراض جانبية نادرة:

- إسهال، انتفاخ أو إمساك. أخبر الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من عدة أيام أو إذا كانت تزعجك

أعراض جانبية نادرة جداً:

- قد تحدث مشاكل في الكلية أو الكبد عند استعمال إبيوبروفين
- قد تحدث سكتة دماغية أو مشاكل في القلب عند استعمال إبيوبروفين. احتمال حدوث ذلك ضئيل في مستوى الجرعة الدوائية المعطاة للأولاد
- تفاقم التهاب الأمعاء الغليظة (كوليتيس) وداء كرون
- ضغط دم مرتفع
- قرحة المعدة، نزيف دموي في المعدة، التهاب في الغشاء المخاطي في المعدة

أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف

- في حالات استثنائية، حدثت تلوثات خطيرة في الجلد والأنسجة الرخوة أثناء وجود جدري الماء (Varicella)
- يصبح الجلد حساساً للضوء

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة وعلى القنينة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر.
- **ظروف التخزين:**
يجب التخزين في درجة حرارة حتى 25°C.
تاريخ انتهاء الصلاحية بعد فتح الدواء مطابق لتاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

معلق بطعم العنب - المواد غير الفعالة:

Sucrose, Sorbitol Solution, Glycerin, Microcrystalline cellulose, Polysorbate 80, Sodium Benzoate, Citric Acid Hydrous, Grape Flavor Art. # 6175, Xanthan Gum, Carboxymethylcellulose Sodium, Disodium Edetate, FD&C Red # 40, FD&C Blue # 1, Purified Water.

معلق بطعم الفواكه - المواد غير الفعالة:

Sucrose, Sorbitol Solution, Glycerin, Microcrystalline cellulose, Polysorbate 80, Sodium Benzoate, Citric Acid Hydrous, Xanthan Gum, Carboxymethylcellulose Sodium, Tutti Frutti Art. Flavor 51880A, Disodium Edetate, FD&C Red # 40, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

معلق بطعم العنب: سائل بنفسجي شبه شفاف معبأ في قنينة بلاستيكية بحجم 120 ملل مع سداد حماية من الفتح من قبل الأولاد.

معلق بطعم الفواكه: معلق أحمر شبه شفاف معبأ في قنينة بلاستيكية بحجم 60 ملل أو 120 ملل مع سداد حماية من الفتح من قبل الأولاد.

قد لا تسوق جميع أحجام العبوات.

المصنع وعنوانه:

فاريقا ريتشموند إنك. فيرجينيا، الولايات المتحدة.

صاحب الامتياز وعنوانه:

جي.إس.كي. كونسيومر هيلتكير إسرائيل م.ض.، ص.ب. 3256، بيتاح تيكفا.

رقما تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

معلق بطعم العنب: 122.43.30111

معلق بطعم الفواكه: 122.42.30110

تم تحرير النشرة في كانون الثاني/يناير 2022 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

علامات تجارية بملكية أو بامتياز GSK © 2022 أو صاحب الامتياز.