

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري  
يسوق الدواء بموجب  
وصفة طبيب بيطري فقط  
للاستعمال لدى الحيوانات فقط

## 1) إسم الدواء البيطري، شكله و عيابه سولفاميتوبريم بيطري

Sulfamethoprim Veterinary  
محلول للتقديم ضمن ماء الشرب  
Solution per os (oral) for drinking water

## 2) المواد الفعالة

كل 1 ملل يحتوي على:  
سولفاديازين صوديوم 86.4 ملغ  
تريميتوبريم 16 ملغ

Each 1 ml contains:  
Sulfadiazine sodium 86.4 mg  
Trimethoprim 16 mg

للمواد غير الفعالة أنظر الفقرة 13.

## 3) لأي غرض مخصص الدواء؟

مستحضر مضاد للبكتيريا لعلاج التلوثات الناجمة عن جراثيم  
حساسة للمواد الفعالة لدى الدجاج فقط.

## الفصيلة العلاجية

سولفاديازين - مضاد حيوي من نوع سولفوناميد  
تريميتوبريم - مادة مضادة للبكتيريا

## 4) مضادات الإستطباب

غير معروف.

## 5) الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة  
الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج  
دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

(www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ  
عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 6) الحيوانات المستهدفة

الدجاج

## 7) طريقة الإيعاء والمقدار الدوائي

1-2 ملل سولفاميتوبريم بيطري لكل لتر من ماء الشرب، لمدة  
3 حتى 5 أيام متتالية (1 ملل من سولفاميتوبريم بيطري  
مخصص لعلاج 10 كلغ وزن دجاج حي).  
في الأيام الحارة يجب تقليل التركيز بسبب زيادة الشرب لدى  
الدجاج.

يجب تخفيف محتوى الوعاء بماء الشرب حتى الحصول على  
محلول متجانس.

## 8) طريقة إستعمال المستحضر

يجب تقديمه للقطيع كمصدر وحيد لماء الشرب خلال العلاج.

## 9) فترة الإنتظار

يجب التوقف عن العلاج قبل 8 أيام من الذبح. لا يجوز الإستعمال  
لدى الدجاجات البياضة للإستهلاك البشري.

## 10) تحذيرات

تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يهتم بالمستحضر

● يمكن أن تؤدي السولفوناميدات إلى فرط حساسية عند  
البلع، الإستنشاق، اللمس والحقن. من أجل تجنب الحساسية  
الناجمة عن اللمس المباشر للمستحضر، على الشخص الذي  
يهتم بالمستحضر إرتداء قفازات مطاوية وكمامة. يجب خلع  
الملابس التي لامست المستحضر، وغسل العينين والجلد فوراً  
في حال لامست المستحضر.

● في حال وجود فرط حساسية معروف لأحد مركبات المستحضر،  
فلا يجوز ملامسة المستحضر. إذا تطورت أعراض مثل طفح  
بعد التعرض للمستحضر، يجب التوجه للطبيب وإظهار هذه  
النشرة.

## 11) تعليمات التخزين

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر القنينة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

## 12) تعليمات بخصوص إتلاف المستحضر/بقايا المستحضر عند الإنتهاء من الإستعمال

- أي بقايا لمستحضر بيطري أو أي نفايات نتجت جراء إستعمال مستحضر بيطري يجب إتلافها على أنها نفايات سامة، لا يجوز رميها في المجاري.

## 13) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على:  
Saccharine sodium, Propylene glycol, Brown shade\*, Purified water.  
Brown shade: Carmoisine F red no.3, Yellow FDC no.6, Edicol supra red, Ponceau4R.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: قنينة بلاستيكية وفيها سائل شفاف بلون أحمر - برتقالي.
- أحجام العبوة: 1 لتر.
- المنتج وصاحب الإمتياز: أبيك للمنتجات البيطرية م.ض.، ص.ب. 489، المنطقة الصناعية بيت شيمش.
- تم فحص والمصادقة على هذه النشرة من قبل وزارة الصحة بتاريخ: أيار 2019
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 081-05-91497