

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

### إرلوتينيب تارو 25 ملغ إرلوتينيب تارو 100 ملغ إرلوتينيب تارو 150 ملغ أقراص مطلية

#### المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص على:

erlotinib 25 mg (as erlotinib hydrochloride)  
erlotinib 100 mg (as erlotinib hydrochloride)  
erlotinib 150 mg (as erlotinib hydrochloride)

إرلوتينيب 25 ملغ (ك إرلوتينيب هيدروكلوريد)  
إرلوتينيب 100 ملغ (ك إرلوتينيب هيدروكلوريد)  
إرلوتينيب 125 ملغ (ك إرلوتينيب هيدروكلوريد)

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: أنظر الفقرة 2 بند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

إرلوتينيب تارو غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 عاماً.

#### معلومات هامة لمراجعتك

- يجب الامتناع عن الحمل أثناء العلاج بـ إرلوتينيب تارو وكذلك لا يجوز الإرضاع أثناء العلاج بالدواء.
- يوصى بالتوقف عن التدخين أثناء العلاج بـ إرلوتينيب تارو.
- يجب تناول الدواء على معدة خاوية – على الأقل ساعة قبل وجبة الطعام أو ساعتين بعد انتهاء وجبة الطعام. لا يجوز تناول الدواء بمشاركة الجريب فروت أو عصير الجريب فروت.
- يحتوي إرلوتينيب تارو على سكر من نوع لاكتوز.

#### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

إرلوتينيب تارو مخصص للعلاج لدى الكبار ويمكن أن يوصف لك في الحالات التالية:

- علاج مرضى يعانون من سرطان رئة متقدم من نوع (NSCLC) Non-Small Cell في حال فشل علاج كيميائي سابق في إيقاف المرض لديك.
- الخط الأول لعلاج مرضى يعانون من سرطان رئة متقدم من نوع (NSCLC) Non-Small Cell، وذلك إذا كانت خلايا الورم تبدي طفرة في EGFR.
- علاج مداومة لمرضى يعانون من سرطان رئة متقدم من نوع (NSCLC) Non-Small Cell وذلك إذا كانت خلايا الورم تبدي طفرات في EGFR وبقي مرضك بغالبية دون تغيير بعد علاج كيميائي أولي.
- علاج مرضى يعانون من سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة أو منتشرة بمشاركة العلاج الدوائي الإعتيادي (gemcitabine).

الفصيلة العلاجية: مضاد للأورام، من مثبطات تيروسين كيناز

الفعالية الطبية: يحتوي إرلوتينيب تارو على المادة الفعالة erlotinib. إرلوتينيب تارو هو عبارة عن دواء يستعمل لعلاج السرطان بواسطة منع عمل البروتين المسبب للنمو المسمى (EGFR) Epidermal Growth Factor Receptor. هذا البروتين معروف بأنه يساهم في نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

#### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعالة (erlotinib) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء المفصلة في الفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة.
- كنت مرضعة.

إذا كان من المحتمل بأنك حساس، توجه الى الطبيب للاستشارة.

## تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

### قبل استعمال الدواء أخبر الطبيب:

- إذا كانت لديك صعوبة مفاجئة في التنفس التي تظهر مع سعال أو سخونة، لأنه من الجائز أن يصف لك الطبيب أدوية أخرى ويوقف العلاج بالدواء إرلوتينيب تارو.
- إذا كان لديك إسهال، لأنه من الجائز أن يصف لك الطبيب مستحضر مضاد للإسهال (مثل لوبيبراميد).
- على الفور، إذا كانت لديك إسهالات شديدة أو لفترات طويلة، غثيان، نقص الشهية أو تقيؤات، لأن الطبيب قد يوقف العلاج بالدواء إرلوتينيب تارو ويعالجك في المستشفى.
- إذا كانت لديك آلام شديدة في البطن، حالة خطيرة من حويصلات في الجلد أو تقشر الجلد. من الجائز أن يوقف الطبيب العلاج بشكل مؤقت أو للأبد.
- إذا كنت تختبر ظهوراً سريعاً/حاداً أو تفاقمًا لإحمرار وألمًا في العينين، تدمع العينين، تشوش الرؤية و/أو حساسية للضوء، توجه إلى الطبيب أو إلى الممرضة بشكل فوري نظراً لأنه من الجائز أن تحتاج لعلاج طارئ (أنظر الفقرة "الأعراض الجانبية" في سياق النشرة).
- إذا كنت تتناول سناتينات وتفاصي من آلام عضلية غير مبررة، حساسية العضلات للمس، ضعف أو تقلصات عضلية. من الجائز أن يوقف الطبيب العلاج.
- إذا كنت تستعمل عدسات لاصقة و/أو إذا كان لديك تاريخ من مشاكل في عينيك مثل الجفاف الحاد في العينين، التهابات أو قروح في الجزء الأمامي من العينين (القرنية)، استشر الطبيب.

لمعلومات إضافية اقرأ بتمعن الفقرة 4 – "الأعراض الجانبية".

### مرض كبدي أو كلوي

لا يعرف فيما إذا كان للدواء إرلوتينيب تارو تأثير مغاير في الحالات التي لا يعمل فيها الكبد أو الكلى بشكل طبيعي. إن العلاج بـ إرلوتينيب تارو غير موصى به إذا كنت تعاني من مرض كبدي خطير أو من مرض كلوي خطير.

### إضطراب إستقلابي المتعلق بالإقتران الجلوكوروني (glucuronidation) مثل متلازمة جيلبرت

يتوجب على الطبيب معالجتك بحذر إذا وجد لديك إضطراب إستقلابي متعلق بالإقتران الجلوكوروني (Glucuronidation disorder) مثل متلازمة جيلبرت (Gilbert's syndrome).

### التدخين

يوصى بالتوقف عن التدخين إذا كنت تتعالج بـ إرلوتينيب تارو، وذلك لأن التدخين قد يخفض كمية الدواء في الدم.

### الأطفال والمراهقون

لم تتم دراسة الدواء إرلوتينيب تارو لدى معالجين ما دون عمر 18 سنة. العلاج بهذا الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين.

### التداخلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خصوصاً إذا كنت تتناول أدوية أخرى التي قد ترفع أو تخفض كمية المادة الفعالة (erlotinib) في دمك أو تؤثر على نجاعتها. أدوية مثل:

- أدوية مضادة للفطريات (مثل كيتوكونازول).
- مثبطات البروتياز - مجموعة أدوية مضادة للفيروسات لمعالجة الإيدز/HIV واليرقان من نوع C.
- مضادات حيوية (مثل كلاريثروميسين، إريثروميسين، سيبروفلوكساسين).
- أدوية للصرع (مثل فينيتوين، كاربامازيبين).
- أدوية للتهديئة والنوم (مثل الباربيتورات).
- أدوية للسلس (مثل ريفامبيسين).
- أدوية مثبطة لمضخات البروتون (مثل أوميبرازول).
- أدوية مضادة للهيستامين حاجبة للمستقبل H<sub>2</sub> (مثل رانيتيدين).
- أدوية ونباتات طبية مضادة للإكتئاب (مثل St. John's wort).
- مثبطات البروتيازوم - مجموعة أدوية لمعالجة السرطان.

في حالات معينة قد تقلل هذه الأدوية من نجاعة الدواء إرلوتينيب تارو أو قد تزيد من الأعراض الجانبية ومن الجائز أن يضطر الطبيب لملاءمة العلاج بالنسبة لك. قد يتجنب الطبيب استعمال هذه الأدوية أثناء علاجك بـ إرلوتينيب تارو.

- أدوية مضادة لتخثر الدم (أدوية تساعد في منع تشكل خثرة دموية أو تخثر الدم مثل وارفارين) لأن الدواء إرلوتينيب تارو قد يزيد قابلية حدوث أنزفة. إستشر الطبيب، يتوجب عليه إجراء مراقبة منتظمة بواسطة فحوص الدم.
- أدوية لتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم (ستاتينات) لأن الدواء إرلوتينيب تارو قد يزيد الخطورة لحدوث مشاكل عضلية لها صلة بالعلاج بالستاتينات، والتي قد تسبب في حالات نادرة تلف خلايا العضل بدرجة شديدة (انحلال العضل) الذي يؤدي لتضرر في الكلى. إستشر الطبيب حول هذا الأمر.

#### استعمال الدواء مع الطعام والشراب

لا يجوز تناول الدواء إرلوتينيب تارو مع الطعام (أنظر الفقرة 3 – "كيفية استعمال الدواء؟").  
يجب تناول الدواء على معدة خاوية – على الأقل ساعة قبل وجبة الطعام أو ساعتين بعد انتهاء وجبة الطعام.  
لا يجوز تناول الدواء بمشاركة الجريب فروت أو عصير الجريب فروت.

#### الحمل والإرضاع

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الأدوية وذلك إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.  
يجب الإمتناع عن الحمل أثناء العلاج بـ إرلوتينيب تارو. إذا كنت في سن الخصوبة ويمكن أن تصبحي حامل، يتوجب عليك استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل خلال فترة العلاج بالدواء وحتى أسبوعين على الأقل بعد تناول القرص الأخير. إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بـ إرلوتينيب تارو يتوجب عليك إبلاغ الطبيب بشكل فوري، لكي يقرر فيما إذا كان بالإمكان مواصلة العلاج.  
لا يجوز الإرضاع أثناء فترة العلاج بـ إرلوتينيب تارو ولمدة أسبوعين، على الأقل، بعد تناول القرص الأخير.  
إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة، تظنين بأنك قد تكوني حامل أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

#### السياقة واستعمال الماكينات

لم يتم فحص إرلوتينيب تارو بالنسبة لتأثيراته المحتملة على القدرة على السياقة أو استعمال الماكينات. مع ذلك، من غير المحتمل أن يؤثر العلاج بالدواء إرلوتينيب تارو على هذه القدرات.

#### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي إرلوتينيب تارو على اللاكتوز. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، استشر الطبيب قبل بدء تناول هذا الدواء.  
يحتوي إرلوتينيب تارو على أقل من 1 مليمول صوديوم (أقل من 23 مليغرام) في كل قرص ولذلك فإنه يعتبر فعلياً "خالياً من الصوديوم".

#### 3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب.  
عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء.

#### مقدار دوائي إعتيادي

المقدار الدوائي وطريقة العلاج سوف يحددان من قبل الطبيب فقط.  
لعلاج سرطان الرئة: المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو قرص واحد في اليوم من إرلوتينيب تارو **150 ملغ**.  
لعلاج سرطان البنكرياس المنتشر: المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو قرص واحد في اليوم من إرلوتينيب تارو **100 ملغ**. يعطى الدواء إرلوتينيب تارو بالمشاركة مع العلاج الدوائي الإعتيادي لهذا المرض (gemcitabine).  
يمكن للطبيب أن يلائم لك المقدار الدوائي بفواصل ذات 50 ملغ. بالنسبة لأنظمة المقادير الدوائية المختلفة، الدواء إرلوتينيب تارو متوفر بعيارات دوائية ذات 25 ملغ، 100 ملغ أو 150 ملغ.  
يُمكن شطر القرص بعيار 100 ملغ.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

#### إذا تناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر

اتصل بالطبيب أو الصيدلي بشكل فوري.  
من الجائز أن تحدث لديك أعراض جانبية أكثر وقد يوقف لك الطبيب العلاج.  
إذا تناولت مقدار دوائي مفرط أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

#### إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول مقدار دوائي واحد أو أكثر من الدواء، إتصل بالطبيب أو الصيدلي بأسرع ما يمكن. إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة، بالمقابل عليك تناول الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي واستشارة الطبيب.

#### في حال توفئك عن تناول الدواء

من المهم جداً مواصلة تناول الدواء إرلوتينيب تارو كل يوم، طالما أوصاك الطبيب بفعل ذلك. يجب المواظبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بالنسبة لاستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال إرلوتينيب تارو قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية التالية. من الجائز في حالات معينة أن يخفض لك الطبيب المقدار الدوائي من إرلوتينيب تارو أو يوقف العلاج:

- إسهالات وتقيؤات (أعراض جانبية شائعة جداً التي يمكن أن تؤثر على أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة). الإسهالات الشديدة أو المتواصلة قد تؤدي لإنخفاض في نسب البوتاسيوم في الدم وإلى خلل في وظيفة الكلى، بالأخص إذا كنت تتعالج بنفس الوقت أيضاً بعلاجات كيميائية إضافية. إذا وجد لديك إسهالات شديدة أو متواصلة توجه إلى الطبيب بشكل فوري، من الجائز أن يضطر لمعالجتك في المستشفى.
- تهيج في العينين نتيجة إلتهاب ملتحة العين/إلتهاب القرنية والملتحمة (أعراض جانبية شائعة جداً التي يمكن أن تؤثر على أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة) وإلتهاب قرنية العين (عرض جانبي شائع الذي يمكن أن يؤثر على حتى مستعمل واحد من بين عشرة).
- شكل لتتهيج في الرئتين المسمى مرض رئوي خلالي (interstitial lung disease) (هذا العرض الجانبي غير شائع في الفئات السكانية الأوروبية، ولكنه شائع في الفئات السكانية اليابانية. يمكن أن يؤثر على حتى واحد من بين مئة مستعمل في أوروبا، وعلى حتى مستعمل واحد من بين عشرة في اليابان). هذا المرض يمكن أن يكون مرتبط بالتقدم الطبيعي لوضعك الصحي وفي حالات معينة قد يكون ذو نتائج مميتة. إذا تطورت لديك أعراض مثل صعوبة مفاجئة في التنفس التي تظهر مع سعال أو سخونة، توجه إلى الطبيب بشكل فوري، لأنه من الجائز أنك تعاني من هذا المرض. يمكن أن يقرر الطبيب إيقاف العلاج ب إرلوتينيب تارو إلى الأبد.
- لوحظت حالات لتتقب (perforations) في الجهاز الهضمي (عرض جانبي غير شائع الذي قد يؤثر على حتى مستعمل واحد من بين مئة). راجع الطبيب إذا وجدت لديك آلام بطنية شديدة. بالإضافة، إحك للطبيب إذا كانت لديك في الماضي قرحة هضمية (تقرح في مخاطية الجهاز الهضمي) أو مرض رتجي (diverticular disease)، نظراً لأن هذه قد تزيد الخطورة لحدوث ثقب (perforations).
- لوحظت حالات نادرة لفشل في وظيفة الكبد (عرض جانبي نادر الذي يمكن أن يؤثر على حتى مستعمل واحد من بين ألف). إذا دلت فحوص الدم لديك على وجود تغيرات خطيرة في وظائف الكبد، فمن الجائز أن يضطر الطبيب لإيقاف العلاج ب إرلوتينيب تارو.

#### أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية تظهر في أوقات متقاربة جداً (يمكن أن تؤثر على أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

- طفح جلدي الذي قد يظهر أو يتفاقم في المناطق المعرضة للشمس. في حال تعرضك للشمس، يوصى باستعمال ملابس تحمي المناطق المكشوفة و/أو استعمال مستحضرات واقية من الشمس
- تلوثات
- فقدان الشهية للطعام، انخفاض الوزن
- اكتئاب
- صداع، تغيرات في الحس على سطح الجلد أو الشعور بتتمل في نهايات الأطراف
- صعوبات في التنفس، سعال
- غثيان
- تهيج في الفم
- ألم في البطن، صعوبات هضمية ونفخة (كمية زائدة من الغازات أو هواء في المعدة أو في الأمعاء)
- فحوص دم غير سليمة لوظائف الكبد

- حكة، جفاف الجلد وتساقط الشعر
- إرهاق، سخونة، قشعريرة

أعراض جانبية تظهر في أوقات متقاربة (يمكن أن تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين عشرة):

- رعاف
- أنزفة من المعدة أو من الأمعاء
- ردود فعل التهابية من حول الأظافر
- تلوثات في جريبات الشعر
- حب الشباب
- تشققات في الجلد
- انخفاض في وظيفة الكلى (عندما يعطى الدواء للإستطببات غير المرخصة بمشاركة علاج كيميائي)

أعراض جانبية غير شائعة (يمكن أن تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين مئة):

- تغيرات في الرموش
- فرط الشعر في الجسم وفي الوجه بنمط انتشار رجولي
- تغيرات في الحواجب
- تقصف أو تحرر الأظافر

أعراض جانبية تظهر في أوقات نادرة (يمكن أن تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين ألف):

- احمرار أو ألم في راحتي اليدين أو الساقين (Palmar Plantar erythrodysesthesia syndrome = متلازمة بالمر بلانتر)

أعراض جانبية نادرة جداً (يمكن أن تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين عشرة آلاف):

- حالات لتتقب (perforations) أو تقرح القرنية.
- حالة خطيرة من حويصلات في الجلد أو تقشر الجلد (يمكن أن تدل على متلازمة Stevens-Johnson).
- التهاب المنطقة الملونة في العينين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تتفادى التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### شروط التخزين

- يجب التخزين ما دون 25°C.
- لا يجوز رمي الادوية إلى مياه المجاري أو إلى القمامة. اسأل الصيدلي عن كيفية إتلاف الادوية غير المستعملة. ستساعد هذه التدابير على الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Lactose monohydrate, cellulose, microcrystalline and calcium hydrogen phosphate, anhydrous, sodium starch glycolate, silica, colloidal anhydrous, cellulose, microcrystalline, sodium lauril sulfate, magnesium stearate, film coating consisting of: hypromellose, hydroxypropylcellulose, titanium dioxide, macrogol.

إرلوتينيب تارو 25 ملغ – يحتوي كل قرص مطلي على 17.66 لاكتوز أحادي الهيدرات.

إرلوتينيب تارو 100 ملغ – يحتوي كل قرص مطلي على 70.65 لاكتوز أحادي الهيدرات.  
إرلوتينيب تارو 150 ملغ – يحتوي كل قرص مطلي على 105.98 لاكتوز أحادي الهيدرات.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

**إرلوتينيب تارو 25 ملغ:**

القرص المطلي هو قرص دائري، محدب من كلا الجانبين، بلون أبيض يبلغ قطره نحو 6 ملم. القرص مختوم بـ "E9OB" على جانب واحد و"25" في الجانب الثاني.

**إرلوتينيب تارو 100 ملغ:**

القرص المطلي هو قرص دائري، محدب من كلا الجانبين مع خط شطر في كلا الجانبين، بلون أبيض يبلغ قطره نحو 10 ملم. القرص مختوم بـ "E9OB" فوق خط الشطر و"100" تحت خط الشطر.

**إرلوتينيب تارو 150 ملغ:**

القرص المطلي هو قرص دائري، محدب من كلا الجانبين، بلون أبيض يبلغ قطره نحو 10,4 ملم. القرص مختوم بـ "E9OB" على جانب واحد و"150" في الجانب الثاني.

تحتوي كل عبوة على 30 قرص مطلي.

**صاحب الإمتياز وعنوانه:** تارو إنترناشيونال م.ض.، شارع هكيتور 14، خليج حيفا 2624761

**إسم المنتج وعنوانه:**

Synthon Chile Ltda, El Castano 145, Lampa, Santiago, Chile

تم تحرير هذه النشرة في شباط 2022 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

**أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

إرلوتينيب تارو 25 ملغ: 168-93-35955-00

إرلوتينيب تارو 100 ملغ: 168-92-35954-00

إرلوتينيب تارو 150 ملغ: 168-91-35932-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.