

زوفران أقراص 4 ملغم

أوندانسيترون (هيدروكلوريد ديبيدرات) 4 ملغم للقرص.
Ondansetron (as hydrochloride dihydrate) 4 mg

زوفران أقراص 8 ملغم

أوندانسيترون (هيدروكلوريد ديبيدرات) 8 ملغم للقرص.
Ondansetron (as hydrochloride dihydrate) 8 mg

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في الفقرة 6.

أنظر أيضًا «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» في الفقرة 2.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء حتى تتحوّل هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء إذا توفرت لديك أسلحة إضافية. راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالته الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لاي غرض مخصوص الدواء؟

أقراص زوفران مخصصة لـ

• علاج الغثيان والتقيؤات الناتجة عن العلاج الكيماوي (لدى الكبار والأطفال) أو عن العلاج بالأشعة (لدى الكبار فقط).

• منع وعلاج الغثيان والتقيؤات بعد عملية جراحية (لدى الكبار فقط).

الفصيلة العلاجية

من مضادات مستقبلات السيروتونين (5HT₃).
تحتوي أقراص زوفران على المادة الفعالة المسماة أوندانسيترون. ينتهي زوفران

لمجموعة الأدوية المسماة مضادات التقيؤ

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا

• كنت تتناول أي موغرفين (يستعمل لعلاج مرض الباركنسون).

• كنت حساساً (أرجي) لـ أوندانسيترون أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي تحبّبها الدواء (كماء هو مفصل في الفقرة 6).

إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أقراص زوفaran.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ زوفران. إحكام لطبيبك إذا

• مانيت ذات مرة من مشاكل القلب (مثل قصور القلب الذي يؤدي إلى ضيق في التنفس وانتفاخ الكاحلين)

• كان نظام قلبك غير منتظم (إضطرابات في النظم)

• وجّدت لديك متلازمة خلقية لطالة مقطع QT في التخطيط الكهربائي للقلب، يجب إعطاء الدواء بحذر للصالحين الذين قد يتظاهر لديهم إطالة QT. خاصة معالجين لديهم نسب غير سليمة للشوارد الكهربائية. فشل في القلب، بنيات قلب بطيئة أو معالجين متداوّلوا إضافات طبية التي قد تؤدي إلى إطالة QT أو إضطرابات في الشوارد الكهربائية

• كنت حساساً لأدوية شبيهة بـ أوندانسيترون. مثل جرانسيترون أو بالونسيترون

• لديك مشاكل في الكبد

• لديك إنسداد في الأمعاء

• كان في المتوقع أن تختبر عملية جراحية لتضخم اللوزتين. نظراً لأن الدواء قد يحجب نزف مستتر

• لديك مشاكل في الأمعاء

• كان في المتوقع أن تختبر عملية جراحية لتضخم اللوزتين. نظراً لأن الدواء قد يحجب نزف مستتر

• لديك إنسداد في الأمعاء

• الصيدلي الخاص بك قبل تناول أقراص زوفران.

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طيبة.

بيانات طبية وإضافات غذائية. إحكام لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك. ذلك لأن زوفران قد

يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية. كذلك، بعض الأدوية الأخرى قد تؤثر على طريقة عمل زوفران. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تتناول:

• كاربامازيبين أو فينيتوين المستعمل لعلاج الصداع

• ريفامبيسين المستعمل لعلاج التللوثات مثل السل (TB)

• مضادات حيوية مثل إبريتوميسين

• أدوية مضادة للغطريات مثل كينوكونازول

• مضادات الالانتيموتية التي تستعمل لعلاج عدم إنتظام نظم القلب

• حاجيات بيتا التي تستعمل لعلاج مشاكل معينة في القلب أو في العينين.

• العلاج القلقي أو لمنع الشقيقة

• ترامادول وفتانيل، مسكنات للألم

• أدوية تؤثر على القلب (مثل هالوبيريدول أو ميتادون)

• أدوية السرطان (خاصة انتراسيكلينات وتراستوزوماب)

• SSRIs (مثبطات إنقبالية لإعاذه امتصاص السيروتونين) التي تستعمل لعلاج الإكتئاب وأ/أ القلق والتي تشمل فلوأوكسيتين، پاروكسيتين، سيرترالين، فلووكوسامين، ستيبلاتوبرام، إستيلاتوبرام. كانت هناك تقدير حول تطور متلازمة

سيروتونين عند مشاركة هذه الأدوية مع زوفران.

• SNRIs (مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورأدرينالين) التي تستعمل لعلاج الإكتئاب وأ/أ القلق التي تشمل فينلافاكسين، دولوكسيتين.

كانت هناك تقدير عن تطور متلازمة سيروتونين عندما تم مشاركة هذه الأدوية مع زوفران.

• أدوية إضافية التي قد تؤدي إلى حدوث متلازمة السيروتونين مثل ميرتازابين

لعلاج الإكتئاب، أدوية من فصيلة مثبطات مونو أمين أووكسيدار لعلاج مرض

الباكرىسيتس، ليثيوم لعلاج الإضطرابات النفسية أو ازتق الميثلين الذي يعطي بالحقن.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا أي مما ذكر أعلاه يخصك، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أقراص زوفران.

إحكام لطبيبك أو للصيدلي الخاص بك حالاً إذا قاسيت من إحدى الأعراض التالية

خلال وبعد العلاج - زوفران:

إذا قاسيت من ألم مفاجئ في الصدر أو من ضغط في الصدر (إفقار عضلة

القلب).

الحمل، الإباضة والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل، تعتدين بذلك قد تكوني حامل أو تخططين للحمل.

إستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول زوفران. لأن زوفران قد يرفع قليلاً من خطورة ولادة طفل لديه تلك مشقوف (عيوب جنّي أو كامل في إغلاق الحنك).

لا ترضعي إذا كنت تتناولين زوفران. ذلك لأن كميات قليلة تنتقل إلى حليب الأم. إستشيري طبيبك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على المكونات:

• كل قرص من زوفران 4 ملغم يحتوي على 81.875 ملغم لكتوزول 4 مانى

كل قرص من زوفران 8 ملغم يحتوي على 163.75 ملغم لكتوزول 4 مانى

إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، تحدث مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال زوفران حسب تعليمات الطبيب.

عليك الاستيقاظ من النوم أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار

الداواني وطريقة العلاج - زوفران.

الجرعة الداوانية وطريقة العلاج يحدّدان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الداوانية التي وصفت لك تتعلق بالعلاج الذي تنتفاه

لعلاج الغثيان والتقيؤات جراء العلاج الكيماوي أو العلاج بالأشعة (الكبار فقط)

في يوم العلاج الكيماوي أو العلاج بالأشعة

• الجرعة الداوانية للكبار هي 8 ملغم التي يتم تناولها ساعة حتى ساعتين

قبل العلاج و 8 ملغم إضافية يتم تناولها بعد 12 ساعة بعد الجرعة الداوانية الأولى.

في الأيام التالية

• الجرعة الداوانية الإعتيادية للكبار هي 8 ملغم مرتبين في اليوم

• يمكن أن يعطى العلاج حتى 5 أيام.

