



كتيب معلومات المرضى حول البيلة الانتيابية الليلية الهيما غلوبينية:

معلومات سلامة هامة للغاية للأطفال والرضع المصابةين بالبيلة الانتيابية
الليلية الهيمو غلوبينية والذين يأخذون سوليريس



يساعدك سوليريس® على التعامل مع البيلة الانتيابية الليلية الهيمو غلوبينية

ضع صورة طفلك
 هنا

يستخدم سوليريس لعلاج مرض خطير جداً يدعى البيلة الانتيابية الليلية الهيمو غلوبينية. هذا المرض لا تسببه البكتيريا أو الفيروس، لذا فإنه ليس معيناً أو قابل للانتقال إلى الأشخاص الآخرين.

بعض الأدوية، مثل سوليريس، تعمل من خلال التأثير على الجهاز المناعي للجسم، لذا قد تجعل طفلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى معينة.

يرجى استعراض معلومات السلامة بالغة الأهمية أدناه.

معلومات سلامة في غاية الأهمية

بما أن سوليريس يقوم بحجب جزء من الجهاز المناعي للجسم، فإن مقاومة طفلك الطبيعية للعدوى قد تنخفض، خصوصاً مقاومة بعض الكائنات التي تسبب عدوى المكورات السحائية، بما في ذلك التهاب السحايا والإنفلونزا الدموي، المعروف أيضاً باسم تسمم الدم أو الإنفلونزا.

تعد عدوى المكورات السحائية مرضًا خطيراً للغاية ومن الممكن أن يصبح مهدداً لحياة الإنسان في أقل من 4 ساعات.¹

قم بتقديم هذا الكتيب إلى أي من مقدمي الرعاية لطفلك من أجل مساعدتهم في التعرف على العلامات والأعراض الخاصة بالتهاب السحايا. يتوجب عليهم أن يسعوا للحصول على عناية طبية **فورية** إذا ظهرت أي علامة أو أعراض.

يتم إعطاء سوليريس عن طريق حقنة دوائية سائلة تدخل إلى الجسم عن طريق الوريد، ويتعين أن يتم تحضيرها من قبل طبيب أو شخص مدرب على إعطاء هذا الدواء. إذا ما كان سوليريس يسبب رد فعل، يرجى إبلاغ الطبيب الذي قام بإعطاء طفلك دواء سوليريس.

من الممكن أن يقوم أخصائي الرعاية بإعطاء طفلك اللقاح من أجل تقليل فرصة إصابة طفلك بعوى المكورات السحاياية. ومع ذلك، لا يمكن للقاح أن يحمي طفلك تماماً من احتمالية الإصابة بالتهاب السحايا. يتبعن أن يتم تطعيم طفلك ضد عوى المكورات السحاياية قبل أسبوعين على الأقل من تلقي أول حقنة من دواء سوليريس.

إذا لم يتتوفر هنالك أي لقاح لطفلك، فيتعين على طفلك أن يتلقى مضاداً حيوياً خلال فترة العلاج وحتى أسبوعين بعد تلقيه للقاح.

يتبعن أن يتم تطعيم طفلك أيضاً ضد الإنفلونزا النزفية وعوى المكورات الرئوية تبعاً لتوصيات دولتك لكل مجموعة.



من الممكن أن ينهي التهاب السحايا حياته في غضون 4 ساعات¹. لا تنتظر الطفح ليظهر لأنه من الممكن ألا يظهر². إذا ظهرت أي علامات أو أعراض، فيتعين عليك طلب الرعاية الطبية فوراً.

علامات وأعراض التهاب السحايا و/or الإنثان والتي تعد عدوى مهددة للحياة

يقوم طفلك بأخذ دواء سوليريس®، والذي يقلل من الدفاعات الطبيعية ضد التهاب السحايا والإنثان. بعد التهاب السحايا والإنثان من **الأمراض الخطيرة للغاية** والتي قد تصبح في وقت قصير **مهددة للحياة**. قد تختلف العلامات والأعراض لدى الرضع عن تلك التي يتم ملاحظتها لدى الأطفال. من الممكن أن تساعدك هذه الشروحات على تحديد العلامات والأعراض التي يمكن ملاحظتها في الأطفال الرضع. من أجل المعلومات الخاصة بالأطفال، يرجى الرجوع إلى صفحة 6 و7.


من المهم جداً طلب الرعاية الطبية **الفورية** فوراً إذا ما رأيت **أي** من العلامات والأعراض التالية.




حُمَّى³



برودة اليدين و/or القدمين³



تنفس سريع³



شحوب، جلد باهت/مبقع/طفح³



يرفض الطعام و/أو ينقأ³




لا يجب أن يتم التعامل معه³



نِعْس، مترهل، ولا يتجاوب³



بكاء غير اعتيادي، أنيين³




توتر أو انتفاخ البقعة اللينة من الرأس³

لا تظهر هذه العلامات والأعراض على جميع المصابين بالتهاب السحايا أو الإنفلونزا. من المهم جداً طلب الرعاية الطبية **على الفور** في حال ظهور أي من هذه العلامات والأعراض.

علامات وأعراض التهاب السحايا وأو الإنтан والتي تعتبر عدوى مهددة للحياة

يعتبر التهاب السحايا والإنتان من الإصابات الخطيرة جداً والتي قد تصبح مهددة للحياة بشكل سريع.


من الممكن أن تساعدك هذه الشروحات في التعرف على العلامات والأعراض التي يمكن ملاحظتها لدى الأطفال الصغار. للأطفال، ارجع إلى الصفحتين 4 و5. من المهم جداً طلب الرعاية الطبية **على الفور** في حال ظهور أي من هذه العلامات والأعراض.




^{2.4} حمى




^{2.4} أيدي و/أو أرجل باردة




^{2.4} قيء



² تشنج رقبة



² لا يجب الضوء الساطع



^{2.4} بشرة شاحبة ومنتفخة، بقع، وطفح

لا تحصل هذه العلامات والأعراض لجميع المرضى المصابين بالتهاب السحايا والإنفلونزا. من المهم جداً طلب الرعاية الطبية **على الفور** في حال ظهور **أي** من هذه العلامات والأعراض.




النعاس وصعوبة الاستيقاظ^{2,4}




التشوش والانفعالية^{2,4,5}



صداع شديد²



رقة جامحة²



صعوبات في التنفس^{2,4}



ألم في القدمين⁵

بطاقات معلومات سلامة المرضى

تحتوي بطاقات معلومات سلامة المرضى في نهاية هذا الكتيب على معلومات هامة والتي يتوجب أن تعرفها أو يعرفها أي شخص مسؤول عن رعاية طفلك طوال فترة علاج طفلك بسواليريس وما بعد ذلك، ولأن سواليريس قد يقلل من مقاومة طفال الطبيعية للإصابة بالعدوى، فمن المهم التعرف على العلامات والأعراض الخاصة بالعدوى بما في ذلك تلك التي تتعلق بالتهاب السحايا والإنفلونزا. تشمل هذه البطاقات على قائمة بالعلامات والأعراض لهذه العدوى من أجل أن يتعرف أي شخص يشرف على طفلك على عدوى التهاب السحايا والإنفلونزا، ويطلب الرعاية الطبية **الفورية**.

فم بملء البطاقات وفم بإعطاء بطاقة لأي شخص مسؤول عن صحة طفلك (على سبيل المثال، معلم أو حاضنة أطفال أو مربيه أطفال أو فريق العمل في المركز). تأكيد أيضاً من حمل مجموعة من البطاقات معك في جميع الأوقات. يمكن الحصول على نسخ إضافية من بطاقات معلومات سلامة المرضى مجاناً عن طريق الاتصال على: 1-800-250-255 أو إرسال بريد الكتروني إلى وحدة سلامة المرضى لحامل التسجيل على: drugsafety@neopharmgroup.com.



أبلغ الشخص الذي يراقب طفلك أن هذه البطاقات يجب أن تعرض على أي مختص رعاية صحية يشارك في علاج طفلك، إذا كان طفلك بحاجة إلى عناية طبية.

معلومات هامة عن السلامة

ما هي العلامات والأعراض التي يجب أن تتبهني خلال العلاج سوليريس؟

يقوم التطعيم بتنقيل خطر تطور الإصابة ولمن لا يمنع خطر الإصابة بشكل كامل. يجب أن تكون على علم بالعلامات والأعراض الخاصة بحالات العدوى الشديدة وأن تقوم بإخبار أخصائي الرعاية الطبية الخاص بك **على الفور** إذا كانت لدى طفلك أي من الأعراض التالية:

- حمى
- أيدي و/or أرجل باردة
- رفض الطعام و/or تقيؤ شديد
- لا يحب أن يتم التعامل معه
- نعس، مترهل، وغير متجاوب
- تنفس متسرع
- بشرة شاحبة ومتتفحة، بقع، وطفح
- بكاء غير اعتادي، أنين
- توتر أو انتفاخ البقعة اللينة من الرأس عادة

وإذاً أن سوليريس يقوم بحبب نظام المناعة في الجسم، فإن مقاومة طفلك الطبيعية للإصابات قد تتحفظ، خصوصاً ضد بعض الكائنات التي تسبب عدوى المكورات السحائية بما في ذلك التهاب السحايا والإنفلونزا المعروفة أيضاً باسم الإنفلونزا.

تعد عدوى المكورات السحائية مرضًا خطيراً للغاية ومن الممكن أن يصبح مهدداً لحياة الإنسان في غضون أقل من 4 ساعات.¹ قم بتقديم هذا الكتاب إلى أي من مقدمي الرعاية لطفالك من أجل مساعدتهم في التعرف على العلامات والأعراض الخاصة بالتهاب السحايا. يتوجب عليهم أن يسعوا للحصول على عناية طيبة فورية إذا ظهرت أي علامة أو أعراض.

للأهالي/ الأوصياء القانونيين للأطفال حديثي الولادة، يرجى إدراك أنه من الصعب رصد العلامات والأعراض النموذجية للصداع والحمى وتشنج الرقبة وألم العضلات والطفح والصدمة، ومن بين العلامات والأعراض الأخرى لدى الأطفال والتي يجب أن يكونوا على دراية بها هي بالخمول والتقيؤ وقلة الاهتمام بالتنفسية.

بطاقة معلومات سلامة المرضى

ضع صورة طفلك
 هنا

معلومات هامة للإشراف على الأفراد

يتم علاج هذا الطفل حالياً بدواء سولاريسين مما قد أدى إلى تقليل المقاومة الطبيعية ضد العدوى، خصوصاً عدوى المكورات السحانية التي تتضمن التهاب السحايا وتسمم الدم (المعروف أيضاً باسم الإنفلونزا). إذا لاحظت ظهور أي من هذه العلامات والأعراض المذكورة في هذه البطاقة على طفلك، والتي قد تشير إلى عدوى خطيرة، فقم بالاتصال بطبيبه الأخير على الفور.

من الممكن أن ينهي التهاب السحايا حياته في غضون 4 ساعات.¹ لا تنتظر الطفح ليظهر لأنه من الممكن ألا يظهر.² إذا ظهرت أي علامات أو أعراض، فيتعين عليك طلب الرعاية الطبية فوراً.

إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى طبيب الطفل، خذ الطفل إلى قسم الطوارئ فوراً واعرض هذه البطاقة على الموظفين.

اسم المريض _____

معلومات التواصل مع الأهالي/الأوصياء القانونيين

اسم الطبيب _____

معلومات التواصل مع الطبيب

معلومات سلامة هامة لأخصائي الرعاية الصحية

تم وصف علاج سولاريسين لهذا المريض. سولاريسين هو جسم مضاد يمنع تنشيط المتمم المطلوب. ونظرًا لآلية عمله، فإن استخدام سولاريسين يزيد من قابلية المريض للإصابة بعدوى المكورات السحانية (النيسيرية السحانية).

قبل البدء بالعلاج، يتعين على هذا المريض أن يكون قد تلقى لقاح المكورات السحانية، ولكنه/ا قد ت/يكون عرضة للاصابة بعدوى المكورات السحانية أو أي عدوى أخرى عامة. يتعين عليك أن ترافق بعناء ظهور علامات مبكرة لعدوى المكورات السحانية، وأن تقوم على الفور بتقييم ما إذا كان هناك شك بالعدوى، وأن تعالجها بالمضادات الحيوية إذا لزم الأمر. تعرّض بعض المرضى لردود فعل الحساسية بعد العلاج بسولاريسين. تشمل الأضطرابات العامة الشائعة أو اعطاء الدواء للمرضى الذين لديهم موانع استعمال ضيقاً في الصدر وقشعريرة وإعياء وإرهاق وردود فعل متلفة بالحقيقة وتورم وحمى.

لمزيد من المعلومات حول سولاريسين، الرجاء الرجوع إلى موجز خصائص المنتج. ومن أجل إجراءات السلامة، الرجاء الاتصال على 1-800-250-255 أو إرسال بريد الكتروني إلى وحدة سلامة المرضى لحامل التسجيل على: drugsafety@neopharmgroup.com.

بطاقة معلومات سلامة المرضى

أعراض التهاب السحايا والإنفلونزا الدموي: الأطفال الرضع		أعراض التهاب السحايا والإنفلونزا الأطفال الصغار	
	حمى ³		حمى ^{2,4}
	أيدي/أقدام باردة ³		أيدي/أقدام باردة ^{2,4}
	رفض الطعام و/أو التقيؤ ³		تقيؤ ^{2,4}
	لا يحب أن يتم التعامل معه ³		نعس وصعب الإيقاظ ^{2,4}
	نعس ومتراخي وغير مستجاب ³		تشوش والانفعالية ^{2,4,5}
	تسارع النفس ³		صداع شديد ²
	شحوب البشرة وترهلها، بقع/طفح ³		تشنج في الرقبة ²
	بكاء غير اعتيادي و أنين ³		لا يحب الضوء الساطع ²
	توتر أو انفاس في البقعة اللينة في الرأس ³		شحوب البشرة وترهلها، بقع/طفح ^{2,4}

References: 1. About us. Meningitis Research Foundation website. <http://www.meningitisuk.org/about-us.htm>. Accessed September 30, 2011. 2. Symptoms in young people. Meningitis Research Foundation website. <http://www.meningitis.org/symptoms/young-people>. Accessed June 17, 2011. 3. Meningitis symptoms in babies. Meningitis Research Foundation website. <http://www.meningitis.org/symptoms/babies>. Accessed June 17, 2011. 4. What are meningitis and septicaemia? Meningitis Research Foundation website. <http://www.meningitis.org/disease-info/what-are-meningitis-septicaemia>. Accessed July 6, 2011. 5. Haj-Hassan TA, Thompson MJ, Mayon-White RT, et al. Which early 'red flag' symptoms identify children with meningococcal disease in primary care? *Br J Gen Pract*. 2011;61:171-172.

يرجى الاطلاع على النشرة المصاحبة للجزمة الخاصة بـSOLIRIS®، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببعض المكورات السحاياية.

للأهالي/ الأوصياء القانونيين:

إذا ما ظهرت على طفلك أي علامات أو أعراض لالتهاب السحايا أو الإلتان، فيتعين عليه الاتصال بعقم الرعاية الصحية على الفور.

إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى مختص الرعاية الصحية الخاص بك، فابحث عن الرعاية الطارئة **فوراً** في قسم الطوارئ وأظهر للموظفين بطاقة معلومات سلامة المرضى

References: 1. About us. Meningitis Research Foundation website. <http://www.meningitisuk.org/about-us.htm>. Accessed September 30, 2011. 2. Symptoms in young people. Meningitis Research Foundation website. <http://www.meningitis.org/symptoms/young-people>. Accessed June 17, 2011. 3. Meningitis symptoms in babies. Meningitis Research Foundation website. <http://www.meningitis.org/symptoms/babies>. Accessed June 17, 2011. 4. What are meningitis and septicaemia? Meningitis Research Foundation website. <http://www.meningitis.org/disease-info/what-are-meningitis-septicaemia>. Accessed July 6, 2011. 5. Haj-Hassan TA, Thompson MJ, Mayon-White RT, et al. Which early red flag symptoms identify children with meningococcal disease in primary care? *Br J Gen Pract*. 2011;61:171-172.

ومن أجل إجراءات السلامة، الرجاء الاتصال على 1-800-250-255 أو إرسال بريد الكتروني إلى وحدة سلامة المرضى لحامل التسجيل على:
drugsafety@neopharmgroup.com.

يرجى الاطلاع على منشور العبوة المرفق لسلويريس (إيكوليزماب) الذي يتضمن معلومات حول عدوى المكورات السحائية الخطيرة

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالآثار الجانبية بالنقر على رابط "الإبلاغ عن الآثار الجانبية للعلاج بالدواء" والذي يظهر على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يرتبط باليومية التالية:
<https://sideeffects.health.gov.il>

وعن طريق مراسلة البريد الإلكتروني لمتصفف وحدة سلامة المرضى على:
drugsafety@neopharmgroup.com
هاتف: 1-800-250-255

849-FEB-2022