

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סטגלוזין 5/100 מ"ג טבליות
סטגלוזין 15/100 מ"ג טבליות
טבליה מצופה

כל **סטגלוזין 5/100 מ"ג** טבליה מצופה מכילה:
5 מ"ג ארטוגליפלוזין (בצורת ארטוגליפלוזין חומצה L-פירוגלוטמית) ו-100 מ"ג סיטגליפטין (בצורת סיטגליפטין פוספט מונוהידרט).

5 mg ertugliflozin (as ertugliflozin L-pyroglutamic acid) and 100 mg sitagliptin (as sitagliptin phosphate monohydrate).

כל **סטגלוזין 15/100 מ"ג** טבליה מצופה מכילה:
15 מ"ג ארטוגליפלוזין (בצורת ארטוגליפלוזין חומצה L-פירוגלוטמית) ו-100 מ"ג סיטגליפטין (בצורת סיטגליפטין פוספט מונוהידרט).

15 mg ertugliflozin (as ertugliflozin L-pyroglutamic acid) and 100 mg sitagliptin (as sitagliptin phosphate monohydrate).

לרשימה של החומרים הבלתי פעילים, ראה פרק 6 "מידע נוסף". ראה גם סעיף 2.9 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה לשלך.

1. למה מיועדת סטגלוזין?

סטגלוזין מיועדת למבוגרים בני 18 ומעלה עם סוכרת מסוג 2 כטיפול נוסף לדיאטה ולפעילות גופנית, על מנת לשפר שליטה ברמות הסוכר בדם (גליקמיה):

- כאשר מטפורמין ו/או סולפונילאוריאה (SU) ואחד מהמרכיבים של **סטגלוזין** אינם מספקים שליטה נאותה בגליקמיה.
- בחולים שכבר מטופלים בשילוב של ארטוגליפלוזין וסיטגליפטין בטבליות נפרדות.

קבוצה תרפויטית:

- ארטוגליפלוזין שייכת לקבוצת תרופות בשם מעכבי סודיום גלוקוז קו-טרנספורטר-2 (SGLT2).
- סיטגליפטין שייכת לקבוצת תרופות בשם מעכבי DPP-4 (דיפפטידיל פפטידז-4).

כיצד סטגלוזין פועלת

- ארטוגליפלוזין פועלת על ידי חסימת חלבון SGLT2 בכליות. הדבר גורם להפרשת הגלוקוז בשתן.
- סיטגליפטין מסייעת להגביר את רמות האינסולין המיוצרות לאחר אכילה. היא גם מפחיתה את כמות הסוכר המיוצרת על ידי גופך.

מה זאת סוכרת מסוג 2?

סוכרת מסוג 2 היא מצב שבו גופך אינו מייצר מספיק אינסולין או שהאינסולין שגופך מייצר אינו פועל היטב כפי שהוא צריך. הגוף שלך יכול גם לייצר יותר מדי סוכר. כשזה קורה, סוכר (גלוקוז) מצטבר בדם. דבר זה יכול להוביל לבעיות רפואיות חמורות כגון מחלת לב, מחלת כליות, עיוורון וזרימת דם לקייה.

2. לפני השימוש בסטגלוזין

2.1 אין להשתמש בסטגלוזין אם:

אתה רגיש (אלרגי) לארטוגליפלוזין או סיטגליפטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מופיעים בפרק 6).

2.2 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בסטגלוז'ן לפני הטיפול בסטגלוז'ן, ספר לרופא אם אתה:

- סובל מבעיות בכליות.
- סובל או סבלת בעבר מזיהומים פטרייתיים בנרתיק או בפין.
- הייתה לך מחלת לב חמורה או עברת שבץ.
- סובל או סבלת בעבר ממחלה בלב (כמו דלקת הלב).
- יש לך סוכרת מסוג 1. אין להשתמש בסטגלוז'ן לטיפול במצב זה.
- נוטל תרופות אחרות לטיפול בסוכרת: יש סבירות גבוהה יותר שתהיה לך רמת סוכר נמוכה בדם עם תרופות מסוימות.
- עלול להיות בסיכון להתייבשות (למשל, אם אתה נוטל תרופות שמגבירות ייצור שתן [משתנים] או מורידות לחץ דם, או אם אתה מעל גיל 65). שאל את הרופא על דרכים למניעת התייבשות.
- יש או היו לך אבני מרה, תלות באלכוהול, או רמות גבוהות מאוד של טריגליצרידים (צורה של שומן) בדמך. מצבים רפואיים אלה עלולים להגביר את סיכויך ללקות בדלקת הלב (ראה פרק 4).
- חווה איבוד מהיר של משקל, בחילה או הקאה, כאב בטן, צמא מוגבר, נשימות מהירות ועמוקות, בלבול, ישנוניות או עייפות חריגות, ריח מתוק להבל הפה שלך, טעם מתוק או מתכתי בפה שלך או ריח שונה לשתן או לזיעה שלך, פנה מייד לרופא או לבית החולים הקרוב ביותר. תסמינים אלו יכולים להיות סימן ל"חמצת קטוטית סוכרתית" (diabetic ketoacidosis) – בעיה שאתה עלול לסבול ממנה עם סוכרת בשל עלייה ברמות של "גופי קטון" בשתן או בדם שלך, הנראית בבדיקות. הסיכון לפתח חמצת קטוטית סוכרתית עלול לעלות בצום ממושך, צריכת אלכוהול מופרזת, התייבשות, הפחתה פתאומית במינון האינסולין או צורך מוגבר באינסולין בעקבות ניתוח גדול או מחלה קשה.

חשוב לבדוק את כפות הרגליים באופן קבוע ולהישמע לכל עצה אחרת הניתנת על ידי איש מקצוע רפואי בנוגע לטיפול בכף הרגל.

דווחו מקרים של דלקת הלב בקרב מטופלים שטופלו בסיטגליפטין (ראה פרק 4).

דבר עם הרופא מייד אם פיתחת שילוב של תסמיני כאב, רגישות למגע, אדמומיות, או נפיחות של איברי המין או באזור בין איברי המין ופי הטבעת בליווי חום או תחושה כללית לא טובה. תסמינים אלה יכולים להיות סימן לזיהום נדיר או חמור ואף מסכן חיים, הנקרא חיתולית נמקית (necrotizing fasciitis) של חייץ הנקבים או נמק על שם פורנייה (Fournier's gangrene) המשמיד את הרקמה שמתחת לעור. נמק על שם פורנייה מחייב טיפול מיידי.

כאשר תרופה זו נלקחת בשילוב עם אינסולין או תרופות שמגבירות הפרשת אינסולין מהלב, רמת הסוכר בדם יכולה לרדת (היפוגליקמיה). ייתכן שהרופא שלך יקטין את המינון של האינסולין שלך או של תרופה אחרת שלך.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא שלך או ברוקח.

גלוקוז בשתן

בשל אופן פעולתה של **סטגלוז'ן**, בדיקת השתן שלך תהיה חיובית לסוכר (גלוקוז) בזמן שאתה נוטל את התרופה.

2.3 בדיקות ומעקב

הרופא שלך ישלח אותך לבדיקות דם על מנת לבדוק את תפקודי הכליות שלך לפני ובמהלך הטיפול בסטגלוז'ן. בדוק את הסוכר בדם שלך, כפי שהסביר לך הרופא. הרופא שלך ינטר את הסוכרת שלך על ידי בדיקות דם סדירות, כולל בדיקת רמות הסוכר שלך בדם וההמוגלובין A1C שלך.

2.4 ילדים ומתבגרים

אין לתת תרופה זו לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. לא ידוע אם תרופה זו בטוחה ויעילה בעת שימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

2.5 תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות שמגבירות ייצור שתן (משתנים).
 - תרופות אחרות אשר מורידות את כמות הסוכר בדם שלך, כגון אינסולין או תרופות שמעלות הפרשת אינסולין מהבלב.
 - דיגוקסין (תרופה המשמשת לטיפול בקצב לב בלתי סדיר ובעיות לב אחרות). ייתכן שיהיה צורך לבדוק את רמת הדיגוקסין בדמך אם אתה נוטל אותה יחד עם סטגלוז'ן.
- אם משהו מהמפורט לעיל נוגע לך (או אם אינך בטוח), ספר לרופא שלך.

2.6 שימוש בתרופה זו ומזון

ניתן ליטול את הטבליה עם או ללא מזון.

2.7 היריון והנקה

אם את בהיריון או מיניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות, שאלי את הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת תרופה זו.

לא ידוע אם סטגלוז'ן עלולה להזיק לעובר שלך. עלייך להימנע מנטילת תרופה זו בתקופת ההיריון.

לא ידוע אם תרופה זו עוברת לחלב אם. דברי עם הרופא שלך על הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך אם את נוטלת סטגלוז'ן. עלייך להימנע מנטילת תרופה זו אם את מיניקה או מתכננת להיניק.

2.8 נהיגה ושימוש במכוונת

לתרופה זו אין השפעה או שהיא בעלת השפעה זניחה על היכולת לנהוג ולהפעיל מכוונת. אולם, דווח על סחרחורת וישנוניות עם סיטגליפטין, אשר יכולות להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכוונת. אין לנהוג או להשתמש בכלים או מכוונת כלשהם, אם אתה חש מסוחרר בזמן נטילת סטגלוז'ן.

נטילת תרופה זו בשילוב אינסולין או תרופות המעלות הפרשת אינסולין מהבלב יכולה לגרום לרמות הסוכר בדם לרדת לרמה נמוכה מדי (היפוגליקמיה), דבר שעלול לגרום לתסמינים כגון רעידות, הזעה או שינויים בראייה, ועלול להשפיע על היכולת שלך לנהוג ולהפעיל מכוונת.

2.9 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תכשיר רפואי זה מכיל פחות מ-1 מילימול סודיום (23 מ"ג) בטבליה והינו בעיקרו 'נטול נתרן'.

3. כיצד תשתמש בסטגלוז'ן?

יש להשתמש בסטגלוז'ן תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המנה המומלצת של סטגלוז'ן היא טבליה אחת כל יום.

מנת סטגלוז'ן שתיטול תלויה במצבך ובכמות הארטוגליפליזין והסיטגליפטין הדרושה כדי לשלוט ברמת הסוכר בדם שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

- בלע את הטבליה; אם אתה מתקשה בבליעה, אתה יכול לחצות, ללעוס, לשבור או לכתוש את הטבליה לשימוש מייד.
- טול טבליה אחת כל בוקר. השתדל ליטול אותה באותה השעה; זה יעזור לך לזכור לקחת אותה.
- ניתן ליטול את הטבליה עם או ללא מזון.
- עלייך להמשיך בדיאטה שנרשמה לך ובתוכנית הפעילות הגופנית בזמן נטילת סטגלוז'ן.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר מכפי שהיית צריך

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול סטגלודין

אם שכחת ליטול מנה, קח אותה ברגע שנזכרת. עם זאת, אם זה כמעט הזמן למנה הבאה שלך, דלג על המנה שפספסת וחזור ללוח-זמני הנטילה הרגיל שלך. אל תיקח מנה כפולה (שתי מנות באותו יום) כדי לפצות על מנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת סטגלודין

אין להפסיק ליטול תרופה זו ללא התייעצות עם הרופא שלך. רמות הסוכר שלך בדם עלולות לעלות אם תפסיק ליטול את התרופה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, סטגלודין עלולה לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק לקחת סטגלודין ופנה לרופא מייד, אם הבחנת באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

- כאב חמור ומתמיד באזור הבטן שעשוי להתפשט עד הגב, עם או ללא בחילות והקאות, מכיוון שאלה עלולים להיות סימנים של לבלב מודלק (דלקת הבלבל).
- תגובה אלרגית רצינית (ששכיחותה אינה ידועה), לרבות פריחה, חרלת, שלפוחיות על העור/עור מתקלף ונפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ובגרון, העלולה לגרום לקושי בנשימה או בבליעה. הרופא עשוי לרשום לך תרופה לטיפול בתגובה האלרגית ותרופה אחרת לטיפול בסוכרת.

יש לפנות מייד לרופא או לבית החולים הקרוב, אם אתה סובל מאחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

חמצת קטוטית סוכרתית (תופעת לוואי נדירה, עלולה להופיע ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000)

אלה הסימנים של חמצת קטוטית סוכרתית (ראה גם פרק "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בסטגלודין"):

- רמות גבוהות של "גופי קטון" בשתן או בדם שלך
 - איבוד מהיר של משקל
 - בחילה או הקאה
 - כאב בטן
 - צימאון יתר
 - נשימות מהירות ועמוקות
 - בלבול
 - ישנוניות או עייפות חריגה
 - ריח מתוק להבל הפה שלך, טעם מתוק או מתכתי בפה שלך, או ריח שונה לשתן או לזיעה שלך
- דבר זה עלול להתרחש ללא קשר לרמת גלוקוז בדם. הרופא שלך עשוי להחליט להפסיק באופן זמני או קבוע את הטיפול שלך בסטגלודין.

חיתולית נמקית של חייץ הנקבים או נמק על שם פורנייה (שכיחות אינה ידועה, תופעה ששכיחותה טרם נקבעה)

זיהום חמור של הרקמות הרכות של איברי המין או באזור שבין איברי המין לפי הטבעת (ראה תסמינים בפרק "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בסטגלודין").

אי ספיקת לב. אי ספיקת לב פירושה שליבך אינו שואב דם בצורה טובה דיה.

לפני שהינך מתחיל ליטול סטגלודין, ספר לרופא שלך אם אי פעם הייתה לך אי ספיקת לב או יש לך בעיות עם הכליות שלך. צור קשר עם הרופא שלך באופן מיידי אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים: קוצר נשימה מתגבר או בעיה לנשום, במיוחד כאשר אתה שוכב, נפיחות או אגירת נוזלים, בעיקר בכפות הרגליים, קרסוליים או רגליים, עלייה מהירה במיוחד במשקל, עייפות לא רגילה. אלו עלולים להיות תסמינים של אי ספיקת לב.

תגובות עוריות (שכיחות אינה ידועה)

חלק מהאנשים הנוטלים תרופות הנקראות מעכבי DPP-4 כמו סיטגליפטין עלולים לפתח תגובה עורית שנקראת בולוס פמפיגואיד (bullous pemphigoid) שבה ייתכן שיהיה צורך בטיפול בבית חולים. ספר לרופא שלך מייד אם אתה מפתח שלפוחיות או פציעה של השכבה החיצונית של העור שלך (שחיקה). ייתכן שהרופא שלך יגיד לך להפסיק לקחת סטגלוז'ן.

יש לפנות בהקדם האפשרי לרופא אם הבחנת בתופעות הלוואי הבאות:

דלקת בדרכי השתן (תופעת לוואי שכיחה מאוד, עלולה להופיע ביותר ממשמש 1 מתוך 10)

הסימנים לדלקת בדרכי השתן הם:

- תחושת צריבה בעת מתן שתן
- שתן שנראה עכור
- כאב באגן או באמצע הגב (כאשר הכליות נגועות)
- למרות שזה נדיר, אם יש לך חום או רואים דם בשתן, ספר לרופא מיד.

התייבשות (איבוד כמות גדולה מדי של מים מגופך; תופעת לוואי שכיחה, עלולה להופיע ב 1-10 משתמשים מתוך 100)

תסמינים של התייבשות כוללים:

- פה יבש
- הרגשת סחרחורת, סחרור, או חולשה, במיוחד כאשר אתה נעמד
- התעלפות

יש לך סיכוי גבוה יותר להתייבשות אם אתה:

- סובל מבעיות בכליות
- לוקח תרופות שמגבירות את ייצור השתן שלך (משתנים) או מורידות לחץ דם
- גילך 65 ומעלה

סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה; תופעת לוואי שכיחה)

הרופא שלך יאמר לך כיצד יש לטפל בסוכר נמוך בדם ומה יש לעשות אם אתה סובל מאחד מהתסמינים או הסימנים שלהלן. הרופא עשוי להוריד את מינון האינסולין שלך או תרופות אחרות לסוכרת.

סימנים או תסמינים של סוכר נמוך בדם עלולים לכלול:

- כאב ראש
- נמנום
- רגזנות
- רעב
- סחרחורת
- בלבול
- הזעה
- הרגשת עצבנות
- חולשה
- דפיקות לב מהירות

בעיות בכליות (שכיחות אינה ידועה)

המצריכות לפעמים דיאליזה.

כאב מפרקים (שכיחות אינה ידועה)

אנשים מסוימים הנוטלים תרופות הנקראות מעכבי DPP-4 כמו סיטגליפטין, עלולים לפתח כאב מפרקים אשר יכול להיות חמור. צור קשר עם הרופא שלך אם אתה סובל מכאב מפרקים חמור.

תופעות לוואי אחרות כוללות:

תופעת לוואי שכיחה מאוד

- זיהום פטרייתי בנרתיק (פטרות)

תופעות לוואי שכיחות

- זיהום פטרייתי של הפין

- שינויים במתן שתן, כולל צורך דחוף במתן שתן בתדירות גבוהה יותר, בכמויות גדולות יותר או בלילה
- צימאון
- גירוד בנרתיק
- בדיקות דם עלולות להראות שינויים בכמות השתן (אוראה) בדם שלך
- בדיקות דם עלולות להראות שינויים בכמות הכוללת של כולסטרול ובכמות הכולסטרול הרע (נקרא LDL – סוג של שומן בדם שלך)
- בדיקות דם עלולות להראות שינויים בכמות תאי הדם האדומים בדם שלך (נקראים המוגלובין)
- עצירות
- גזים
- התנפחות של כפות הידיים או כפות הרגליים
- שפעת
- כאב ראש
- זיהום בדרכי הנשימה העליונות
- אף סתום או נזלת וכאב גרון
- דלקת מפרקים ניוונית
- כאב בזרועות או ברגליים
- בחילה/הקאות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להופיע ב 10-1 משתמשים מתוך 1000)

- בדיקות דם עלולות להראות שינויים הקשורים לתפקודי כליה (כגון 'קריאטינין')
- כאבי בטן
- שלשול
- נמנום
- פה יבש
- סחרחורת
- גרד

תופעת לוואי נדירה

- ירידה במספר הטסיות

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)

- בעיות בכליות (הדורשות לעתים טיפול בדיאליזה)
- כאב מפרקים
- כאב שרירים
- כאב גב
- מחלת ריאות בין-רקמתית
- בולוס פמפיגואיד (שלפוחית עור מסוג מסוים)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי", שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן סטגלודין?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:**
- יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 30°C. יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מפני לחות.
- אין להשתמש בתרופה זו אם האריזה פגומה או יש עליה סימני פתיחה.
- אין להשליך תרופות לשפכים או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד יש להיפטר מהתרופה. זה יסייע לשמירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, סטגלוד'ן מכילה גם:

ליבת הטבליה: microcrystalline cellulose (E460), calcium hydrogen phosphate (anhydrous), sodium stearyl fumarate (E487), croscarmellose sodium, magnesium stearate (E470b).
ציפוי הטבליה: hypromellose (E464), hydroxypropyl cellulose (E463), titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172), iron oxide black (E172), carnauba wax (E903).

כיצד נראית סטגלוד'ן ומה תוכן האריזה

- **סטגלוד'ן 5/100 מ"ג טבליות** הן טבליות מצופות בצבע בז', בעלות צורת שקד, מוטבעות ב "554" בצד אחד וחלקות בצד השני.
- **סטגלוד'ן 15/100 מ"ג טבליות** הן טבליות מצופות בצבע חום, בעלות צורת שקד, מוטבעות ב "555" בצד אחד וחלקות בצד השני.

גודלי האריזות:

גודלי האריזות הם 14, 28, 30, 84, 90 ו-98 טבליות מצופות בבליסטרים לא מחוררים ו-1 x 30 טבליות מצופות בבליסטרים מחוררים עבור כל יחידה.

ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

בעל הרישום וכתובתו:

חברת מרק שארפ ודוהם (ישראל - 1996) בע"מ, ת.ד. 7121 פתח תקווה, 49170.

שם היצרן וכתובתו: מרק שארפ ודוהם קורפ., ניו ג'רזי, ארה"ב.

נערך בפברואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

סטגלוד'ן 5/100 מ"ג טבליות: 167-01-36006

סטגלוד'ן 15/100 מ"ג טבליות: 167-02-36036

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.