

ינואר 2022

הודעה על עדכון עלונים:

Descovy 200/10, 200/25 mg film coated tablets

(emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate)

רופאים ורוקחים נכבדים,

חברת גיליאד סיאנסז ישראל בע"מ מבקשת להודיעכם כי חל עדכון בעלון לרופא ובעלון לצריך של התכשיר בנדון.

ההתוויה הרשומה לתכשיר בישראל:

Descovy is indicated in combination with other antiretroviral agents for the treatment of adults and adolescents (aged 12 years and older with body weight at least 35 kg) infected with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1).

השינויים מסומנים בעליון המצורף כאשר הטעסט המודגש **באדום** הוסיף לעalon ואילו הטעסט המקורי בבקבוצה נגרע ממנו.

העדכנים המשמעותיים ביותר מופיעים במתכט זה, קיימים עדכנים מינוריים נוספים.

העלונים לרופא ולצריך נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

כמו כן, ניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום:

gilaid siemens israel בע"מ, רחוב החרש 4, ת.ד. 4524075, פרקלט העסקי הוד השרון
ישראל.

התכשיר משוק ע"י חברת סל"א.

בברכה,

מריה חריגין
רוקחת ממונה
gilaid siemens israel בע"מ

העדכנים המוחשיים בעליון לרופא:

4.2 Posology and method of administration

Hepatic impairment

No dose adjustment of Descovy is required in patients with ~~hepatic impairment~~~~mild (Child Pugh Class A) or moderate (Child Pugh Class B)~~ hepatic impairment. ~~Descovy has not been studied in patients with severe hepatic impairment (Child Pugh Class C); therefore, Descovy is not recommended for use in patients with severe hepatic impairment (see sections 4.4 and 5.2).~~

4.4 Special warnings and precautions for use

Nephrotoxicity

A potential risk of nephrotoxicity resulting from chronic exposure to low levels of tenofovir due to dosing with tenofovir alafenamide cannot be excluded (see section 5.3).

It is recommended that renal function is assessed in all patients prior to, or when initiating, therapy with Descovy and that it is also monitored during therapy in all patients as clinically appropriate. In patients who develop clinically significant decreases in renal function, or evidence of proximal renal tubulopathy, discontinuation of Descovy should be considered.

העדכנים המוחשיים בעליון לצרכן:

2. לפני שימוש בתרופה

לפני תחילת הטיפול בדסקובי, ספר לרופא:

- **אם הייתה לך מחלת כליות בעבר או במידה ובדיקות הדם הראו בעיות עם הכליות שלך. יתכן והרופא שלך יבקש לבצע בדיקות דם נוספת על מנת לבחון את פעילות הכליות שלך בתחילת ובמהלך הטיפול עם דסקובי.**