

أكامولي

فتائل 150 ملغ



التركيب

تحتوي كل فتيلة على:

باراسيتامول 150 ملغ

(Paracetamol 150 mg)

لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر، انظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطى هذا الدواء من دون حاجة لوصفة طبيب وهو مخصص للأطفال من عمر 3 سنين حتى 6 سنين لتخفيف السخونة ولتسكين الآلام.

بالإمكان استعمال الدواء لدى الكبار أيضاً.
عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تزول الأعراض خلال 5 أيام رغم استعمال الدواء.

يجب إعطاء الدواء بالشكل الصحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين الآلام ولتخفيف السخونة.

للاستعمال في فتحة الشرج (rectal).

الفصيلة العلاجية:

مسكن للآلام وخافض للسخونة.

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وجدت حساسية لـ باراسيتامول أو لأحد مركبات الدواء الأخرى المفصلة في الفقرة 6.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- إذا تطورت في الماضي لدى المتعالج/الطفل أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحوي باراسيتامول، فلا يجوز إعطائه المستحضرات التي تحوي باراسيتامول، كي لا تحدث ثانية أعراض جلدية خطيرة.
- يحتوي المستحضر على باراسيتامول الذي قد يسبب ضرراً في الكبد عندما:
 - يعطى بمقادير دوائية أعلى من الموصى بها أو لفترة مطوّلة.

- يتم شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج.
- يتم تناول أدوية إضافية التي تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز إعطاء هذا الدواء في أوقات مقاربة، بدون إستشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف السخونة وتسكين الآلام أو أدوية للزكام بدون إستشارة طبيب أو صيدلي، وذلك لمنع حدوث فرط المقادار الدوائي أو التسمم بالباراسيتامول.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية من "عائلة" أكامول أو مستحضرات إضافية التي تحوي باراسيتامول.
- يجب الإمتناع عن استعمال مقدار دوائي عالي (وذلك ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- إذا كان المتعالج حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إعطاء الدواء.

يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كان المتعالج يعاني أو عانى في الماضي من:

- مرض كبدى أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلية
- الإدمان على الكحول
- يرقان
- إذا كانت المتعاجة حاملاً أو مرضعة

التفاعلات بين الأدوية

إذا كان المتعالج يتناول، أو إذا تناول مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية وقيتامينات، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كان المتعالج يتناول دواء من المجموعات التالية أو إذا أنهى الآن العلاج بدواء:

- مضادات تخثر الدم، بالأخص وارفارين.
- المستحضرات التي تنتش إنتاج الإنزيمات في الكبد (مثلاً: ريفامبيسين، رابربوتور).
- أدوية للصرع - فينيتوئين، كاربامازيبين.
- المستحضرات المضادة للإلتهاب الالاستيروئيدية.
- ميتوكلوپراميد أو دومبيريدون (لمعالجة الغثيان، التقيؤ ومشاكل هضمية أخرى).
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- بروبنيسيد (لعلاج النقرس).
- كوليستيرامين (لخفض فائض شحوم الدم).

إستعمال الباراسيتامول وإستهلاك الكحول

لا يجوز إستهلاك الكحول أثناء العلاج بالباراسيتامول بسبب زيادة الخطورة لحدوث ضرر للكبد.

الحمل والإرضاع

إذا كانت المتعاجة حاملاً أو مرضعة يجب إستشارة الطبيب قبل بدء إستعمال الدواء.

الإستعمال لدى الأطفال

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل عرض جانبي وكذلك عن كل دواء إضافي يعطى للطفل.

لا يجوز إعطاء الطفل الكحول أو الأدوية التي تحتوي على الكحول، أثناء العلاج بهذا الدواء.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

يُحدد المقدار الدوائي بحسب وزن الطفل، يجب إستشارة الطبيب/الصيدلي لتحديد المقدار الدوائي المناسب لوزن طفلك.

هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال وللرضع دون عمر الستين، ومن أجلهم يجب إستعمال مستحضراً سائلاً.

القدار الدوائي الإعتيادي في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

أطفال حتى عمر 3 سنوات: حسب تعليمات الطبيب.

أطفال بعمر 3-4 سنوات: فتيلة واحدة، 4-5 مرات في اليوم.

أطفال بعمر 4-6 سنوات: فتيلة - فتيلتين، 4-5 مرات في اليوم.

يجب الإنتظار 4 ساعات على الأقل قبل إعطاء مقداراً دوائياً إضافياً.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمَت الأعراض أو لم تزول خلال 5 أيام رغم إستعمال الدواء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تلقى المتعالج/ الطفل بالخطأ مقداراً دوائياً مضاعفاً، يجب إستشارة الطبيب فوراً أو التوجه إلى غرفة الطوارئ.

إرشادات الإستعمال

ملاحظة: إذا كانت الفتيلة رخوة بحيث لا يمكن إدخالها، فبالإمكان تبريدها بتخزينها في البراد لمدة 30 دقيقة تقريباً، أو وضعها تحت تيار من الماء البارد قبل نزع الغلاف.

1) تعليمات الفتح: أفصل فتيلة واحدة عن شريط الفاتال. لنزع الغلاف البلاستيكي، يجب فصل اللسان من الجانب المسطح للغلاف البلاستيكي والسحب نحو الجوانب حتى خروج الفتيلة للخارج.

2) كيفية إدخال الفتيلة: أولاً، اغسل يديك جيداً.

3) قم بوضع المتعالج/ الطفل على جانبه، وأدخل الفتيلة بلطف بواسطة الأصبع عميقاً لداخل فتحة الشرج.

4) اغسل يديك جيداً بعد إدخال الفتيلة.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء معك. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب! حتى ولو كنت تشعر بحالة جيدة، فإن العلاج الفوري هو ضروري، بسبب خطورة تطور ضرر خطير للكبد. الأعراض الجانبية يمكن أن تكون غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية للطعام، آلام بطنية، إنتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية في أعلى البطن التي من الجائز أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فتائل أكامولي قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندم من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية نادرة (تؤثر على حتى متعالج 1 من بين 1,000 متعالج):

أعراض جانبية خطيرة، يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب فوراً في الحالات التالية:

- في حال ظهور ردود فعل تحسسية شديدة مثل طفح وحكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحنجرة و/أو الأطراف والتي قد تسبب صعوبات في التنفس أو في البلع.
- مشاكل جلدية مثل طفح أو حكة.

• إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية - پاراسيتامول قد يسبب في حالات نادرة جداً، ظهور أمراض جلدية شديدة التي علاماتها يمكن أن تكون: إحمرار، طفح، حويصلات، ضرر جلدي واسع.

أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر حتى ولو تناوت في الماضي مستحضرات تحوي المادة الفعالة پاراسيتامول بدون مشكلة.

• في حال ظهور علامات لتغيرات في جهاز الدم مثل: أنزفة وكدمات التي تظهر بسهولة أكبر، تطور التهابات بسهولة أكبر، ظهور سخونة مرتفعة وحويصلات في الفم والحنجرة.

• إذا ظهرت مشاكل في الكبد - فمن الجائز أن يتطلب منك إجراء فحوص الدم من أجل فحص الأداء الوظيفي للكبد.

أعراض جانبية شائعة (تؤثر على حتى متعالج 1 من بين 10 متعالجين):

• إحمرار وآلم في مكان إدخال الفتيلة (في فتحة الشرج) أو حوله.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمَت إحدى الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق التواصل مع الطبيب:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Witepsol W-35, Witepsol E-76

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تحتوي كل علبة على لوحة بلاستيكية (بليستر) وبداخلها معبأة فتائل بلون أبيض - كريم.

المنتج وصاحب الإمتياز:

تيفع إسرائيل م.ض.

شارع دفورا هفنيه 124، تل أبيب 6944020

تم إعداد هذه النشرة بتاريخ كانون الأول 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

027.08.21691.00

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.