

רופאה/ה רוקח/ת נכבד/ה,

חברת פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ מבקשת ליידע אתכם על עדכון העלונים לצרכן של התכשירים הבאים (תכשירים זהים בשמות מסחריים שונים):

**אקסידול קפלויות / Exidol caplets
פראמול טרגט קפלויות / Paramol target caplets**

הרכב התכשירים וחוזקם:
כל קפליה מכילה:

Acetylsalicylic acid 250 mg
Paracetamol 250 mg
Caffeine (anhydrous) 65 mg

התוויה הרשומה לתכשירים בישראל:

For temporary relief of the pain of headache, mild to moderate pain associated with migraine headache, pain of menstrual discomfort and pain accompanied by fever.

בהודעה זו מצוינים רק השינויים המהותיים בעלונים לצרכן המוגדרים כעדכוני בטיחות על רקע צהוב. קיימים עדכונים נוספים שאינם מהותיים ואינם נכללים בהודעה זו.

העלונים המעודכנים לצרכן נשלחים לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: <http://www.health.gov.il> וניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לחברת פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ בטלפון: 03-5773700

בברכה,
פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ

2. לפני השימוש בתרופה

הריון, הנקה ופוריות

אם את בהריון, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, ספרי לרופא שלך ואל תטלי את התרופה.

חשוב במיוחד לא ליטול את התרופה במהלך שלושת החודשים האחרונים של ההריון, מאחר שהדבר עלול להזיק לעובר או לגרום לבעיות בזמן הלידה.

לתכשיר זה קיימת תופעת לוואי אפשרית של פגיעה כלייתית בעובר ומיעוט מי שפיר החל משבוע 20 להריון. מומלץ להימנע משימוש בתכשירים ממשפחת ה- NSAIDs החל משבוע 20 להריון ולהיוועץ באיש צוות רפואי במידת הצורך.

4. תופעות לוואי

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה חווה אחת או יותר מתופעות הלוואי החמורות האלו:

- תגובה אלרגית עם נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון. הדבר עלול לגרום לקשיי בליעה, צפצופים בעת נשימה, קשיי נשימה, ותחושת לחץ בחזה (סימנים של אסתמה). עלולה להיות לך גם פריחה או גרד, או שתחוה עילפון.
- פריחה עורית (כולל חרלת, גרד), אדמומיות של העור, שלפוחיות בשפתיים, בעיניים או בפה, קילוף של העור, פצעים, כיבים בפה.
- דימום בקיבה או במעי, כיב קיבה או כיב במעי, אשר עלולים להיות מלווים בכאב בטן חריף, הקאה דמית, צואה דמית או שחורה. כמו בטיפול עם כל משככי כאבים ומורידי חום, תופעות אלו עלולות לקרות בכל זמן במהלך הטיפול, ללא היסטוריה קודמת ועלולות להיות קטלניות. תופעת לוואי זו חמורה במיוחד בקשישים.
- הצהבה של העור או העיניים (סימנים לכשל כבדי).
- סחרחורת (סימנים של לחץ דם נמוך).
- קצב לב לא סדיר.