

**إفكسور™ 75 XR**

تحتوي كل كبسولة على: ثينلافاكسين 75 ملг كملح هيدروكلوريド Venlafaxine 75 mg as hydrochloride salt

إفكسور™ 150 XR

تحتوي كل كبسولة على: ثينلافاكسين 150 ملг كملح هيدروكلوريد Venlafaxine 150 mg as hydrochloride salt

كبسولات ذات تحريك متأنى

للقائمة المواد غير الفعالة وموادات الحساسية في المستحضر، انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

ووقف هذا الدواء لعلاج مضرك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن

حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

إن الأدوية المضادة للإكتناب والقلق، تزيد من خطورة حصول سلوك وأفكار إنتشارية لدى الأطفال، المراهقين والكبار الشبان حتى عمر 25 سنة.

مع بداية العلاج بالدواء، يتوجب على الملاججين من كافة الأعمار وأقربائهم مراقبة التغيرات السلوكية مثل: تفاقم الإكتناب، أفكار إنتشارية، عدوانية وما شابه.

يجب التوجه حالاً للطبيب في حال حدوث مثل هذه التغيرات (انظر الفقرة 2).

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إفكسور™ XR مخصوص لعلاج المعالجين الذي يعانون من إكتناب وأيضاً كعلاج داعم للإكتناب المزمن، كذلك، لعلاج المعالجين الذين يعانون من مشاكل القلق التالية: القلق العام والقلق الاجتماعي.

الفصيلة العلاجية: إفكسور™ XR عبارة عن دواء مضاد للإكتناب ينتمي لفصيلة الأدوية المسماة SNRIs (مثبطات إعادة إمتصاص السيروتونين والنورايبيريفين).

هذه الفصيلة من الأدوية تستعمل لمعالجة الإكتناب والحالات أخرى، مثل اضطرابات القلق المختلفة، إن آلية عمل مضادات الإكتناب غير واضحة تماماً، لكن يمكن أن يكون للأدوية تأثير وذلك بواسطة رفع نسب السيروتونين والنورايبيريفين في الدماغ.

هناك أهمية بالغة في معالجة الإكتناب وأمراض القلق، من دون علاج، من الجائز لا تتبدل حالة لا بل قد تتفاقم، بحيث يصبح من الصعب علاجها في المستقبل.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- ✗ كنت حساساً (الرجري) لـ ثينلافاكسين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
- ✗ كنت تستعمل أو استعملت أدوية لعلاج الإكتناب أو مرض الباركنسون من نوع مثبطات الإنزيم مونوامين أوكتسيدان (MAOIs). إن تناول أدوية من نوع MAOI سوية مع إفكسور™ XR قد يسبب أعراضًا جانبية خطيرة وتشكل خطرًا على الحياة. يجب الإنتظار 14 يوماً من وقت انتهاء العلاج بـ إفكسور™ XR و حتى بداية العلاج بـ إفكسور™ 7 أيام على الأقل من وقت انتهاء العلاج بـ إفكسور™ XR و حتى بداية العلاج بـ MAOI.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ إفكسور™ XR إحكام للطبيب إذا:

- كنت تتناول أو كنت تتناول أدوية إنتشارية مثل مثبط مونوامين أوكتسيدان (MAOIs) (المعالجة الإكتناب):
- أدوية تحوى موكوبريميد، نوع من مثبط مونوامين أوكتسيدان (MAOI) (المعالجة الإكتناب):
- أدوية تحوى بيبوتوميرافان (اللتحفيف من العمال):
- أدوية تحوى تامادول، فنتانيل، تاپيتاندول، يبيتدين أو بنتازوسين (لتسكن الآلام):
- أدوية تحوى دكتستوميتوفان (اللتحفيف من العمال):
- أدوية تحوى مونوامين أوكتسيدان على الآثنيات أو لمعالجة الألم الشديد):
- أدوية تحوى أزرق الستينلين (المعالجة سبب مترافق من المتهماوغولوبين في الدم):
- مستحضرات تحرير الذهن (SSTIs) (سيسي أيسا هيبيريكوم بيدوفراتوم، خلاصة نباتات تستند لعلاج الإكتناب البسيط):
- مستحضرات تحوى تريپتوكان (المشكّل النوم والإكتناب):
- أدوية مضادة للذهن (العلاج مرض يترافق بأعراض مثل سماع، رؤية أو الشعور بأشياء غير موجودة، أفكار باطلة، شك غير عادي، منطق غير واضح، إنطواء). علامات وأعراض متلازمة السيروتونين من شأنها أن تشمل مزيجاً من عدم هدوء، هلوسة، قلة الانتباه، نشاط سريع، إرتفاع حرارة الجسم، تغيرات سريعة في ضغط الدم، تزايد المعنكفات، إسهال، سبات، شغاف، تقدير.

إن متلازمة السيروتونين يشكلها الآخرين يمكن أن تشبه متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (NMS). إن علامات وأعراض هذه المتلازمة من شأنها أن تشمل مزيجاً من سخونة مرتفعة، نظم قلب سريع، تعرق، تصلب شديد للعضلات، إرباك، زيادة في انتزيمات العضل (يحدد في فحوص الدم).

إحكام للطبيب حالاً، أو توجه لغرفة الطوارئ في المستشفى القريب، إذا كنت تعتقد بأن لديك متلازمة السيروتونين.

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناول أدوية تؤثر على نظم القلب. مثلاً:

• أدوية لعلاج اضطرابات نظم القلب مثل كينتين، أميدارون، سوتالول أو دوفيتيليد

• مضادات حيوية مثل إيريتروميسين أو موكسيفالوكاسين (العلاج للتلوث الجرثومي)

• مضادات الهيستامين (العلاج الحساسية).

من الجائز أن تتفاعل الأدوية التالية مع إفكسور™ XR، لذا يجب إستعمالها بحذر. من المهم بشكل خاص إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على:

• كيتوكازولون أو رسبيديرون (دواء مضاد للفطريات)

• هالوبيريدول أو ميتيدپروپولون (حاجب بيبي، لمعالجة ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب).

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول إفكسور™ XR مع الطعام (انظر الفقرة 3 «كيفية إستعمال الدواء»).

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يجب الإيمانع عن استهلاك الكحول خلال فترة تناولك لـ إفكسور™ XR.

الحمل والإرضا

يجب استشارة الطبيب قبل إستعمال هذا الدواء وذلك إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعقدندين بذلك حامل أو تحظين للحمل.

بالإمكان إستعمال إفكسور™ XR فقط بعد إستشارة الطبيب عن الفائدة الممكنة وعن المخاطر المحتملة للجنين.

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناولين إفكسور™ XR خلال فترة الحمل.

عند تناولك خلال فترة الحمل، من الجائز أن تكون هناك خطورة زائدة لحدوث شدید بعد وقت قصير من الولادة، خاصة إذا وجدت لديك سابقة لأمراض نزفية. XR.

تسبّب هذه الحالة للمولود التنفس بشكل أسرع وأن يبدو لهونه مائلاً للأرق. تظهر هذه الأعراض عادة خلال إلى 24 ساعة الأولى بعد ولادة الطفل، في حال حدوث هذا الأمر لرضيع، فعليك التوجه حالاً إلى الطبيب.

إذا تناولت إفكسور™ XR قبلها من نهاية فترة الحمل، من الجائز أن تكون هناك خطورة زائدة لحدوث شدید بعد وقت قصير من الولادة، خاصة إذا وجدت لديك سابقة لأمراض نزفية. XR.

عرض إضافي الذي قد يظهر لدى المولود الذي تناولت أنه إفكسور™ XR أثناء الحمل هو أن المولود لا يأكل كما يجب، إذا ظهرت هذه الأعراض لدى رضيعك بعد الولادة، وكانت قلة، فاتصلي بطبيبك.

ينتقل إفكسور™ XR إلى حليب الأم، لذلك توجه خطورة بأن يؤثر الدواء على الرضيع. لذلك يجب إستشارة الطبيب لإتخاذ القرارات هل يجب التوقف عن الإرضا أو التوقف عن العلاج بهذا الدواء.

السيادة وإستعمال الماكنت

لا يجوز قيادة المركبة أو تشغيل الماكنت حتى تكون مدركاً لكيفية تأثير الدواء عليك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي إفكسور™ 150 XR على أقل من 1 ميليجول (23 ملг) صوديوم في كل كبسولة.

أي يعتبر خال من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إلى إذا لم تكن واثقاً بخصوص البررة الولائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الولائية وطريقة العلاج يحدان من قبل الطبيب فقط.

- إرتباك، الشعور بانفصال عن ذاتك، عدم الإشباع الجنسي، تناقض في الرغبة الجنسية، عدم إرتياح، عصبية، أحالم شاذة
 - رجفان، الشعور بعدم هدوء أو عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف بدون حركة، الشعور بدبابيس وأب، تغيرات في حالة النتف، زيادة توتر العضل
 - إضطرابات في الرؤية يشمل تشوش الرؤية، توسيع الحدود، عدم قدرة العين على نقل التركيز من أشياء بعيدة إلى أشياء قريبة
 - **طنين في الأذنين (طنين)**
 - نظم قلب سريعة، الشعور بضربات القلب
 - إرتفاع في ضغط الدم، توفر
 - ضيق في التنفس، تناول
 - تقييد، إسهال
 - طفح سطيفي، حكة
 - إزدياد وتيرة التبول، عدم القدرة على التبول، صعوبة التبول
 - عدم إنتظام القلب (الدى النساء) مثل: النزف المتزايد أو تزايد النزف غير المنتظم، مشكلة في القذف /في بلوغ ذروة الإثارة الجنسية (الدى الرجال)، مشاكل في إنتحاب القضيب (العجز الجنسي)
 - ضغف عام، إرهاق، تشعربرة
 - إرتفاع في الوزن، إنخفاض في الوزن
 - إرتفاع في نسبة الكوكسترون
 - أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):**
 - فرط شاشات، تسارع الأفكار وانخفاض الحاجة للنوم (هوس)
 - هلوسة، الشعور بانفصال عن الواقع، مشاكل في بلوغ الإشباع الجنسي، خدر أو قلة الإحساس، الشعور بفرط إفتعال، كركرة الأسنان
 - إعماق، حرکات لا إرادية للإختلالات، إضطرابات في التنفس والتوازن
 - الشعور بدوران (خاصة عند الانتقال السريع لوضعية الوقوف)، إنخفاض في ضغط الدم
 - تقييد بارز أو دموي أو بارز أسود أو دموي (قد يكون علامة لنزف داخلي)
 - حساسية عند التعرض للشمnes، كدمات، تساقط غير اعتيادي للشعر
 - عدم السيطرة على التبول
 - تصلب، تقلصات وحركات عضلية لا إرادية
 - تغيرات طفيفة في نسبة إنزيمات الكبد في الدم
 - أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص):**
 - تشنجات أو اختلالات
 - سعال، ضيق في التنفس التي قد تترافق بسخونة مرتفعة
 - توهان وارتباك التي قد تترافق أحياناً بهذين (delirium)
 - استهلاك متزايد للدم (الذي يسمى أيضاً متلازمة الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول (SIADH))
 - إنخفاض نسبة الصوديوم في الدم
 - ألم شديد في العينين وضغط أو تنشوش في الرؤية
 - عدم سلامـة، سرعة أو عدم إنتظام نظم القلب، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإغماء
 - ألم شديد في البطن أو ألم شديد في الظهر (قد يدل على مشكلة خطيرة في الأمعاء، الكبد أو البنكرياس)
 - حكة، إصفرار الجلد أو العينين، بول داكن، أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا - أعراض لإلتهاب الكبد (hepatitis)
 - أعراض جانبية نادرة جداً (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 شخص):**
 - نزف مستمر، الذي يمكن أن يشكل علامة إنخفاض في عدد صفيحات الدم - قد يؤدي إلى زيادة الخطورة لحدوث كدمات وأنفحة
 - إنتاج شان حلبي الأم
 - نزف غير متوقع مثلاً نزف في اللثة، دم في البول أو في القيء، أو ظهور غير متوقع لكدمات أو اصابة في الأوعية الدموية (تكسير الأوردة)
 - أعراض جانبية شديدة غير معروفة (أعراض شيعوها لم يحدد بعد):**
 - أشكار إنتحارية وسلوك إنتحاري (بلغ عنها خلال العلاج وقرباً من التوقف عن العلاج بـ فينلافاكسين، أنظر الفقرة 2 بـ «تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء»)
 - عدوانية
 - دوار (غيريتها)
 - نزف مهبلي شديد بعد وقت قصير من الولادة (نزف بعد الولادة)، أنظري فقرة "الحمل والإرضاع" في الفقرة 2 لمعلومات إضافية.
 - إذا ظهر عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.
 - عرض جانبية لم يتذكر في هذه النشرة، لكنه قد يظهر في هذه النشرة.
 - لا يجوز استعمال الدواء بعد إختفاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إختفاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
 - يجب تخزين في مكان جاف، بدرجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية.
 - (6) معلومات إضافية:**
 - بالإضافة لل المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً:
 - إفكسور™: 75 XR
 - Microcrystalline cellulose, ethyl cellulose, hypromellose 2910, hypromellose 2208, talc.
 - Capsule shell: gelatin, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172), printing ink: shellac, iron oxide, propylene glycol, ammonium hydroxide, simeticone.
 - إفكسور™: 150 XR
 - Microcrystalline cellulose, ethyl cellulose, hypromellose 2910, hypromellose 2208, talc.
 - Capsule shell: gelatin, red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172), titanium dioxide (E171), printing ink: shellac, propylene glycol, sodium hydroxide, povidone, titanium dioxide.
 - كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
 - إفكسور™: 75 XR: كبسولات قاتمة بلون الدواجن مع العلامة W و- 75 بخط أحمر، ضمن عبوات لوبيحة (بليسترن).
 - إفكسور™: 150 XR: كبسولات قاتمة بلون برتقالي داكن مع العلامة W و- 150 بخط أبيض، ضمن عبوات لوبيحة (بليسترن).
 - يسوق كل من إفكسور™ 75 و- إفكسور™ 150 XR 150 مجم عن عبوة لوبيحة (بليسترن) التي تحتوي على 30، 20، 14، 10، 7.5 أو 5.6 كبسولة.
 - صاحب الامتياز وعنوانه: فايزر بي إف أي فارماستييكا إسرائيل م.ض، شارع شنكر 9، هرتسليا بيتوخ 46725.
 - رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
 - إفكسور™: 75 XR: 111.17.29394
 - إفكسور™: 150 XR: 111.18.29395
 - من أجل سهولة وتوسيع القراءة، نمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للكلا الجنسيين.
 - تم تحديثها في 12/2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- الجرعة الدوائية الإبتدائية الإعتيادية هي عادة 75 ملغ لل يوم. من شأن الطبيب أن يرفع الجرعة الدوائية وفقاً للحاجة.
- لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
- يجب تناول إفكسور™ XR (كبسولات ذات تحريك متأنٍ) مع الطعام، في نفس الساعة تقريباً كل يوم في الصباح أو في المساء. يجب بلع الكبسولات بشكلاً الكامل مع الماء، لا يجوز شطر، سحق، مضغ أو إذابة الكبسولة في الماء، لتجنب الإضرار بالتحريك المتأنٍ للدواء في الجسم. بدلاً من ذلك، بالإمكان فتح الكبسولة بحذر وبعثرة كامل محتواها على ملقة مليئة مهروس التفاح، يجب بلع هذا الخليط حالاً دون مضغ ويبق شرب كأس من الماء مباشرة بعد ذلك، لضمان بلع كامل محتوى الكبسولة (سفيروديث).
- إذا كان الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلى، لأن الجرعة الدوائية من الدواء من شأنها أن تكون مختلفة.
- لا يجوز التوقف عن تناول الدواء بدون استشارة الطبيب. إن التوقف المفاجئ قد يؤدي إلى أعراض فطام (أنظر أيضاً البند «إذا توقفت عن تناول الدواء»).
- إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر**
- إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأخذ حشرة الدواء معك.
- أعراض لجرعة دوائية مفرطة قد تشمل نظم قلب سريعة، تغيرات في مستوى اليقظة (ما بين الميل إلى النوم حتى السبات)، تشوش الرؤية، اختلالات أو تشنجات وتنقيمات.
- إذا نسيت تناول الدواء**
- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول الجرعة الدوائية حال تذكر ذلك. لكن إذا حان موعد تناول الجرعة الدوائية التالية، يجب تقويت الجرعة الدوائية المناسبة وتناول الجرعة الدوائية التالية كالمعتاد. لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول جرعتين دوائية، مما عوضاً عن الجرعة الدوائية المناسبة! لا يجوز تناول أكثر من الجرعة الدوائية اليومية التي وصفت من أجلك.
- يجب المواظة على العلاج حسب توصية الطبيب.
- إذا توقفت عن تناول الدواء**
- إذا توقفت عن تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول الجرعة الدوائية حال تذكر ذلك. لكن إذا حان موعد تناول الجرعة الدوائية التالية، يجب تقويت الجرعة الدوائية المناسبة وتناول الجرعة الدوائية التالية كالمعتاد. لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول جرعتين دوائية، مما عوضاً عن الجرعة الدوائية المناسبة! لا يجوز تناول أكثر من الجرعة الدوائية اليومية التي وصفت من أجلك.
- بعد العلاج ب لهذا الدواء.
- إن التوقف المفاجئ عن تناول الدواء أو الخض في العلاج بالدواء قد يسبب التوقف عن العلاج بالدواء أو تقليل الجرعة الدوائية بدون إستشارة الطبيب. يرشد الطبيب بخفض الجرعة الدوائية بشكل تدريجي قبل التوقف بشكل تام عن العلاج وذلك إذا كان الطبيب يعتقد بأنك لست بحاجة إلى العلاج بهذا الدواء.
- إن التوقف المفاجئ عن تناول الدواء أو الخض في العلاج بالدواء قد ينبع للجرعة الدوائية قد ترافق بأعراض جانبية، مثل أشكار إنتحارية، عدوانية، إرهاق، دوار، عصبية، عدم الراحة، إرثاك، كوبasis، جفاف في الفم، تناقص الشهية للطعام، غثيان، إسهال، عصبية، عدم الراحة، إرثاك، طنين في الأذنين، الشعور بوخز أو في أحيان نادرة الشعور بصدمة كهربائية، ضغف عام، تعرق، إختلالات أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مشاكل في الرؤية وإرتفاع ضغط الدم (الأمر الذي قد يؤدي إلى إسعاف، دوار، رنين في الأذنين، تقييد بطيء).
- يرشد طبيبك كيف تتوقف عن العلاج بالدواء بشكل تدريجي. قد يستغرق هذا الأمر فترة زمنية قد تراها عدة أيام أو أشهر. من الجائز أن يتم التوقف لدى بعض المتعالجين بشكل أثقل تدريجي لمدة شهر أو أكثر. إذا كنت تناولي أي من هذه الأعراض أو أعراض مقلقة أخرى، إستشر طبيبك.
- لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.
- (4) الأعراض الجانبية**
- كما بكل دواء، إن إستعمال إفكسور™ XR قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تنتهي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.
- يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ عند ظهور واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية:
- أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):**
- إنفاس الرئتين، صعوبة في التنفس
 - إنتفاخ الرئة، الغثيان، القيء، الحنجرة، الديدان أو راحتي القمهين وأو ضغف عام
 - عدوانية في البليغ أو في التنفس
 - أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص):
 - ضغط في الصدر، صفير، حكة أو شرى (آفات بارزة في الجلد بدون أحمر أو عديمة اللون التي تكون عادة حادة)
 - علامات وأعراض متلازمة السيروتونين التي من شأنها أن تشمل: عدم هدوء، هلوسة، قلة النشاط، تسرع نظم القلب، إرتفاع حرارة الجسم، تغيرات سريعة في ضغط الدم، زيادة المعنكشات، إسهال، سبات، غثيان، تقييد، متلازمة السيروتونين (NMS)، علامات وأعراض هذه المتلازمة يمكن أن تشمل مزيج من سخونة مرتفعة، نظم قلب سريعة، تعرق، تصلب شديد للعضلات، إرثاك، زيادة في إنzymات الغصل (تحدد في فحص الدم).
 - علامات متلازمة مفخخة مرتفعة، تشعيبرة، إرتجاف، صداع، تعرق وأعراض شبيهة بالإنفلونزا. قد تترجم هذه الأعراض نتيجة إضطراب في جهاز الدم، الذي يؤدي إلى زيادة الطحورة لحدث ثبات.
 - طفح جلدي شديد، حكة أو شرى
 - ألام عضلية غير مشخصة، حساسية أو ضغف عام، هذه يمكن أن تكون علامات لإنحلال العضلات المخططة (rhabdomyolysis).
- أعراض جانبية شديدة غير معروفة (أعراض شيعوها لم يحدد بعد):**
- علامات وأعراض متلازمة القلب المنكبس (stress cardiomyopathy) أو takotsubo cardiomyopathy التي من شأنها أن تشمل ألم في الصدر، ضيق في التنفس، دوار، إعماق، عدم انظام نظم القلب.
 - أعراض جانبية أخرى التي يتوارد على إبلاغ الطبيب عنها تشمل (شيعوا هذه الأعراض الجانبيّة يظهرون لاحقاً تحت «أعراض جانبية إضافية التي قد حدث»):
 - سعال، ضغف وأعراض في التنفس التي قد تترافق بسخونة مرتفعة
 - براز أسود أو دم في البراز
 - حكة، إصفرار الجلد أو العينين، أو بول داكن، التي قد تكون أعراض لإلتهاب في الكبد (hepatitis)
 - مشاكل في القلب مثل نظم سريعة أو غير منتظم للقلب، إرتفاع في ضغط الدم
 - مشاكل في العينين مثل تشوش الرؤية، توسيع الحدود
 - مشاكل حصبية مثل فرط النشاط وشعور شاذ بفرط الإنفعال
 - أعراض إنسحابية (أنظر الفقرة 3 في النشرة «كيفية إستعمال الدواء»، إذا توقفت عن تناول الدواء»)
 - نزف مستمر قد يستمر النزف لفترة أطول من المعتاد في حال أصبت أو جرحت إذالاحظت كرات بيضاء صغيرة أو حبيبات في البراز أثناء فترة العلاج - بـ إفكسور™ XR.
 - فلا داعي القلق، إن كل كبسولة من إفكسور™ XR تحتوي على سفirodiths (كرات بيضاء صغيرة) التي تحوي المادة الفعالة فينلافاكسين، السفirodiths الموجودة في الكبسولة تتحرر في معدتك والمادة الفعالة التي يدخلها تتحرر ببطء أثناء مرورها في المعدة وفي الأمعاء، إن غلاف السفirodiths لا يذوب ويطرح في البراز. يعني أن الجرعة الدوائية المطلوبة يتم إمتصاصها رغم ظهور سفirodiths في البراز.
 - أعراض جانبية إضافية يمكن أن تحدث:**
 - دوار، صداع، ناسس
 - أرق
 - غثيان، جفاف في الفم، إمساك
 - تعرق (بما في ذلك تعرق في الليل)
- أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):**
- دوار، صداع، ناسس
 - أرق
 - غثيان، جفاف في الفم، إمساك
 - تعرق (بما في ذلك تعرق في الليل)
- أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):**
- دوري الشهية للطعام