

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

## אפקסור™ 75 XR

**כל כמוסה מכילה:** ונלפאקסין 75 מ"ג כמלח הידרוכלוריד Venlafaxine 75 mg as hydrochloride salt

## אפקסור™ 150 XR

**כל כמוסה מכילה:** ונלפאקסין 150 מ"ג כמלח הידרוכלוריד Venlafaxine 150 mg as hydrochloride salt

### כמוסות בשחרור מושהה

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר, ראה פרק 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו ואלרגנים שתמשך בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להיקף להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופות נוגדות דבאון וחדרה, מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים עד גיל 25 עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים וקרוביהם, לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון: החמרת הדבאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה. במידה וחלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא (ראה פרק 2).

### 1.למה מיועדת התרופה?

אפקסור™ XR מיועדת לטיפול במטופלים הסובלים מדבאון וכן לטיפול אחזקתי בדבאון חוזר. כמו כן, לטיפול במטופלים הסובלים מבעיות החרדה הבאות: חרדה כללית וחרדה חברתית.

**קבוצה תרופוית:** אפקסור™ XR היא תרופה נוגדת דבאון השרייכת לקבוצת תרופות שקוראת SNRIs (מעכבי ספינה מחדש של סרטונין ונוראפינפרין). קבוצת תרופות זו משמשת לטיפול בדבאון ובמצבים אחרים, כגון הפרעות חרדה שונות. מנגנון הפעולה של נוגדי הדבאון אינו ברור דיו, אך התרופות יכולות להשפיע על ידי העלאת רמות סרטונין ונוראפינפרין במוח. יש חשיבות גבוהה לטיפול בדבאון ומחלות חרדה. לא טיפול, יתכן שמצבר לא יחלוף ואף עלול להחמיר, כך שקשה יהיה לטפל בעתיד.

### 2. לפני השימוש בתרופה

#### אין להשתמש בתרופה אם:

× אתה רגיש (אלרגי) לנולפאקסין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בפרק 6).
× אתה נוטל או נטלת תרופות לטיפול בדבאון או פרקיסון מסוג מעכבי האנזים מונואמין אוקסידאז (MAOIs). נטילת תרופות מסוג MAOI יחד עם אפקסור™ XR עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות ומסכנות חיים. יש להמתין 14 יום מעת סיום הטיפול ב- MAOI ועד התחלת הטיפול באפקסור™ XR, ולפחות 7 ימים מעת סיום הטיפול באפקסור™ XR ועד התחלת הטיפול ב- MAOI.

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

#### לפני הטיפול באפקסור™ XR ספר לרופא אם:

- הגן נוטל תרופות נוספות אשר מעלות את הסיכון לתסמונת סרטונין כאשר נלקחות יחד עם אפקסור™ XR (ראה סעיף "תרופות אחרות ואפקסור™ XR").
- הגן סובל ממחלות עיניים, כגון גלאוקומה מסוגים מסוימים (לחץ תוך עיני מוגבר).
- סבלת בעבר מלחץ דם גבוה.
- סבלת בעבר ממחלות לב.
- נאמר לך שאתה סובל מקצב לב מהיר או לא תקין.
- סבלת בעבר מעוויתות (פרכוסים).
- סבלת בעבר מרמות נמוכות של נתרן בחוץ (היפונטרמיה).
- סבלת בעבר ממחלות דמם (נטייה לתת חבורות (שטפי דם תת עוריים) או נטייה לדמם בקלות) או אם הגן נוטל תרופות העוללות להעלות את הסיכון לדימום, כגון וזאפרין (למניעת קרישי דם), או אם את בהיריון (ראי סעיף "היריון והנקה").
- סבלת בעבר או קרוב משפחתך סבל מאניה או מהפרעה דו קוטבית (מאניה דיפרסיה).
- יש לך היסטוריה של התנהגות תוקפנית.
- את בהיריון, מתכננת להיכנס להיריון או להניק (ראי "היריון והנקה" תחת פרק זה).

אפקסור™ XR עלולה לגרום לתחושת אי-שקט או חוסר יכולת לשבת או לעמוד ללא תחוה בשבועות הראשונים לטיפול. עליך לספר לרופא, אם הגן סובל ממצב זה.

**יתכן ואפקסור™ XR לא יתחיל לפעול מיד.** חלק מהאנשים הנוטלים נוגדי דבאון עשויים להרגיש רע יותר לפני שהם מרגישים טוב יותר. הרופא עשוי לבקש ממך לשוב אליו מספר שבועות לאחר תחילת הטיפול ובאופן קבוע עד שתתחיל שוב להרגיש טוב. ספר לרופא אם אינך מתחיל להרגיש טוב יותר.

**מחשבות אובדניות והחמרה בדבאון או בהפרעת החרדה שלך:**

אם הגן מדוכא ו/או סובל מהפרעת חרדה, יתכן ויהיו לך מחשבות של פגיעה עצמית או מחשבות אובדניות. מחשבות אלה עלולות להחמיר בתחילת השימוש בנוגדי דבאון, שמוש שולוקח זמן עד שתרופות אלה מתחילות לפעול, בדרך כלל שבועיים, אך לעיתים יותר. מחשבות אלה עלולות להופיע גם כאשר מינון התרופה מופחת או במהלך הפסקת הטיפול בתרופה.

יתכן ותהיה בסביבות יותר גבוהה לחשוב בצורה זו:

- אם היו לך בעבר מחשבות אובדניות או מחשבות על פגיעה עצמית.
- אם אתה מבוגר צעיר. מידע ממחקרים קליניים הראה כי קיים סיכון מוגבר להתנהגות אובדנית במבוגרים צעירים (מתחת לגיל 25) עם מצבים פסיכיאטריים שטופלו בנוגדי דבאון.
- אם יש לך מחשבות של פגיעה עצמית או מחשבות אובדניות בכל זמן שהוא, צור קשר עם הרופא או פנה מיד לחדר מיון של בית חולים.
- מומלץ לספר לקרוב משפחה או חבר אם הגן סובל מדבאון או הפרעת חרדה ולבקש מהם לקרוא עלון זה. שאל אותם אם לדעתם חלה החמרה בדבאון או בחרדה, או אם הם מודאגים משינויים בהתנהגותך.

**יובש בפה**

דווח על יובש בפה ב 10% מהמטופלים באפקסור™ XR. מצב זה עלול להעלות את הסיכון לעששת, ולכן יש להקפיד על היגיינת הפה.

**סוכרת**

רמת הסוכר בדם עלולה להשתנות בשל הטיפול באפקסור™ XR, לכן אם הגן חולה סוכרת, יש להתייעץ עם הרופא לגבי התאמת מינון התרופות לטיפול בסוכרת.

**הפרעות בתפקוד המיני**

תרופות כמו אפקסור™ XR, המכונות מעכבי ספינה מחדש של סרטונין ונוראפינפרין (SNRIs), עלולות לגרום לתסמינים של הפרעות בתפקוד המיני (ראה פרק 4). במקרים מסוימים, תסמינים אלה ממשכיכים לאחר הפסקת הטיפול.

אם אתה מרגיש חסר מנוחה, שאינך יכול לעמוד בשקט, תחושת 'ריחוף' או רגש יתר על המידה, יש לך תנועות שרירים מטלטלות שאתה לא יכול לשלוט בהן, פנה לרופא מיד. ראה פרק 4 "תופעות לוואי" למידע נוסף.

#### שימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18

תרופה זו אינה מומלצת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.

כמו כן, לידעיתך לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 יש סיכון מוגבר לתופעות לוואי כגון ניסיון התאבדות, מחשבות אובדניות ועוינות (בעיקר תוקפנות, התנגדות וכעס) כאשר הם נוטלים תרופה מסוג זה.

למרות זאת, הרופא יכול לרשום תרופה זו למטופלים מתחת לגיל 18 כאשר הוא חושב שהיא לטובתם. אף הרופא רשם את התרופה למטפל מתחת לגיל 18 ובוצרנון להתייעץ עם הרופא בקשר לכך - פנה אליו חזרה. יש לדווח לרופא אם אחד או יותר מהתסמינים המפורטים לעיל הופיעו או החמירו במטופלים מתחת לגיל 18 הנוטלים אפקסור™ XR. כמו כן, אין תזונים לגבי השפעות ארוכות טווח מהיבט בטחיות התרופה ביחס לגדילה, התבגרות, והתפתחות קוגניטיבית והתנהגותיות בקבוצה גיל זו.

#### בדיקות ומעקב

אפקסור™ XR לעיתים עלולה לגרום לתופעות בלתי רצויות שלא תהיה מודע להן, כגון עלייה בלחץ הדם או קצב לב לא תקין, שינויים קלים ברמות אנזימי הכבד, ברמות הנתרן או הכולסטרול בדם.

לעיתים רחוקות יותר, אפקסור™ XR עלולה לפגום בפעילות טסיות הדם ולגרום לעלייה בסיכון לחבורות או לדימום. לכן, יתכן והרופא יבקש לבצע בדיקות דם, מידי פעם, במיוחד אם אתה נוטל אפקסור™ XR לתקופה ממושכת.

#### תרופות אחרות ואפקסור™ XR

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אין להפסיק או להתיחיל לטיפול תרופות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה מבלי להתייעץ מתיחלה עם הרופא.**

אין לטויל מעכבי מונואמין אוקסידאז (**MAOIs**) המשמשים לטיפול בדבאון או במחלת הפרקינסון **יחד עם אפקסור™ XR**. ספר לרופא אם נטלת תרופות מסוג זה ב- 14 הימים האחרונים. ראה מידע מפורט בסעיף "אין להשתמש בתרופה אם", תחת פרק זה.

#### תסמונת סרטונין:

מצב שעלול לסכן חיים או תסמינים דמויי תסמונת נוירולפטית ממאירה (NMS) (ראה פרק 4 "תופעות לוואי") יכולים להתרחש בזמן טיפול עם ונלפאקסין. במיוחד כאשר תרופות נוספות נלקחות בו-זמנית. דוגמאות לתרופות אלה כוללות:
• טרופטנים (טיפול במיגרנה);
• תרופות אחרות לטיפול בדבאון, למשל: מעכבים סלקטיביים של ספינה מחדש של סרטונין (SSRIs), מעכבי ספינה מחדש של סרטונין ונוראפינפרין (SNRIs), נוגדי דבאון טרטיקליים, או תרופות המכילות ליתיום;
• תרופות המכילות אמפטמינים (טיפול בהפרעת קשב וריכוז - ADHD, נרקולפטיה, והשגמת יתר);
• תרופות המכילות לינוליד, אנטיביוטיקה (לטיפול ביהומים);
• תרופות המכילות מוקלובמיד, סוג של מעכב מונואמין אוקסידאז (MAOI) (טיפול בדבאון);

תרופות המכילות סיברטרמין (ליירדה במשקל);
תרופות המכילות טרמדול, פנטניל, טפנטאדול, פטדין או פנטוצין (לשיכון כאבים);
תרופות המכילות דקסטרומטורפאן (להקלת שיעול);
תרופות המכילות מקטן סטרומולין (להתמכרות לאופיאטים או לטיפול בכאב חריף);
תרופות המכילות מתילן בלו (טיפול ברמות גבוהות של מטהמולובין בדם);

תכשירים המכילים St. John's Wort (מכונה גם) היפריקום פרפורטום, תמיכת מחנים השומשת לטיפול בדבאון (ג);
תכשירים המכילים טריפטופן (לבעיות שינה ודכאון);
תרופות אנטי-פסיכוטיות (לטיפול במחלה עם תסמינים כגון שמיעה, ראייה או תחושת רע בדברים שלילי קיימים, מחשבות שונות, חשינות חיזאה, הגיון לא ברור, הסתגרות).
סימינים ותסמינים של תסמונת סרטונין עשויים לכלול שילוב של אי-שקט, הזיות, חוסר קואורדינציה, קצב לב מהיר, עלייה בחום הגוף, שינויים מהיריים בלחץ הדם, רפלקסים מוגברים, שלשול, תרדמת, בחילה, הקאה. תסמונת סרטונין בצורתה החמורה ביותר יכולה להידמות לתסמונת נוירולפטית ממאירה (NMS). סימינים ותסמינים של תסמונת זו עשויים לכלול שילוב של חום גבוה, קצב לב מהיר, הזעה, נוקשות שרירים חמורה, לבבול, עלייה באנזימי השריר (נקבע בבדיקת דם).

**ספר מיד לרופא, או פנה לחדר מיון של בית החולים הקרוב, אם אתה חושב שיש לך תסמונת סרטונין.**

יש לידע את הרופא אם הגן נוטל תרופות המשפיעות על קצב הלב. למשל:
• תרופות לטיפול בהפרעות קצב הלב יתר כינדיין, אמידארון, סטולול או דופטילד;
• תרופות אנטי-פסיכוטיות כגון תיאורידין (ראה גם "תסמונת סרטונין" (עלי).

- אנטיביוטיקות כגון אריתרומיצין או מוקסיפלוקסאצין (לטיפול ביהום חיידקי)
- אנטיהיסטימינים (לטיפול באלרגיה).
- התרופות הבאות יתכן ויגיבו עם אפקסור™ XR, לכן יש להשתמש בהן בהירות. חשוב במיוחד לידע את הרופא או הרוקח אם הגן נוטל תרופות המכילות:
  - קטוקונאזול (תרופה נגד פטריות)
  - האלופנדילול או ריספרידון (לטיפול במצבים פסיכיאטריים).
  - טופרולורל (חוסם בטא), לטיפול ביתר לחץ דם ובעיות לב).

#### שימוש בתרופה ומזון

יש לטויל אפקסור™ XR עם אוכל (כיצד תשתמש בתרופה?).

### שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להמנע מצריכת אלכוהול בזמן שאתה נוטל אפקסור™ XR.

### היריון והנקה

אם את בהריון או מתכננת להיירון, חושבת שהגן בהיריון או מתכננת היריון, יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

ניתן להשתמש באפקסור™ XR כיום אחת התייעצות עם הרופא לגבי הניתול האפשרית ולגבי הסיכונים האפשריים לעובר.

יש לידע את הרופא אם הגן נוטלת אפקסור™ XR במהלך ההיריון.

בזמן נטילה בתהיריון, תרופות ודומות (מעכבי ספינה חוזרת של סרטונין - SSRIs) עלולות העולות את הסיכון ליחיל לחץ בדם ריאתי מתמש בילוד (PPHN), מצב זה גורם לילוד לעשם מהר יותר ולהריות כחלתל. תסמינים אלה מופיעים בדרך כלל ב- 24 השעות הראשונות לאחר שהתינוק נולד.

אם זה קורה לתינוק שלך, עליך לפנות מיד לרופא.

אם לקחת אפקסור™ XR כאשר לטויל בסוף ההיריון, ייתכן שמוגבר שלדימום כבד בנתיב זמן קצר לאחר הלידה, במיוחד אם יש לך היסטוריה של מחלות דם. יש לידע את הרופא שהגן נוטלת אפקסור™ XR.

תסמון נוסף שעלול להופיע ביילוד שאמו נטלה אפקסור™ XR בזמן ההיריון הינו שהיילוד לא אוכל כראוי. אם לתינוק שלך מופיעים תסמינים אלה לאחר הלידה, ואת מודאגת, ציר קשר עם הרופא.

אפקסור™ XR עוברת חלב, יוצר קשר עם הרופא.
לכן קיים סיכון שהתרופה תשפיע על התינוק. לפיכך יש להתייעץ עם הרופא על מנת להחליט האם יש להפסיק להגיא את הטיפול עם תרופה זו.

### נהיגה ושימוש במכוונות

אין לנהוג ברכב או להפעיל מכוונת עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליך.

### מידע חשוב על מילה מהמרכיבים של התרופה

**אפקסור™ 150 XR מכילה מרכיבים מ-1 מיליגרם (מ"ג) נתרן לכל כמוסה, כלומר נחשבת נוטלת נתרן.**

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה באופן תמיך בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון ההתחלתי המקובל בדרך כלל הוא 75 מ"ג ליום. הרופא עשוי להגדיל את המינון, במידת הצורך.

#### אין לעבור על המנה המומלצת.

יש ליטול את אפקסור™ XR (כמוסות בשחרור מושהה) עם אוכל, בערך באותה השעה כל יום בבוקר או בערב. יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן עם מים. אין לחלק, לכתוש, ללעוס או להמיס את הכמוסה במים, על מנת שלא לפגוע בשחרור המושהה של התרופה בגוף.

לחלופין, ניתן לפתוח בהירות את הכמוסה ולפור את תוכנה בשלמותו על כך מלאה של מחית תפוחים. יש לבלוע תערובת זו מיידית מבלי ללעוס ויש לשתות כוס מים מיד לאחר מכן, על מנת להבטיח בליעה של כל תוכן הכמוסה (ספרואידים).

ספר לרופא שלך אם אתה סובל מבעיות כבכד או בכליות, מאחר והמינון של התרופה עשוי להיות שונה.

אין להפסיק ליטול את התרופה ללא התייעצות עם הרופא. הפסקה פתאומית עלולה לגרום לתסמיני גמילה (ראה גם סעיף "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").

#### אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בולע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארילת התרופה אתך.

תסמינים של מינון יתר עלולים לכלול קצב לב מהיר, שינויים ברמת הערנות (טבווח בין ישנוניות לתרדמת), ראייה מטושטשת, פרכוסים או עוויתות והקאות.

#### אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול את התרופה או בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מיד כשזוכרת. אך אם הגיע הזמן למנה הבאה, יש לדלג על המנה שנשכחה וליטול את המנה הבאה כרגיל. בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד במקום המנה שנשכחה! אין ליטול יותר מהמנה היומית שרשמה עבורך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

#### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך או להפסיק את הטיפול בתרופה או להפחית את המינון ללא התייעצות עם הרופא. הרופא יתה איתך להפחית את המינון באופן הדרגתי לפני הפסקת הטיפול לחלוטין במידה והוא חושב שאינך זקוק יותר לטיפול בתרופה זאת.

הפסקה פתאומית של התרופה או ירידה מהירה מדי במינון עלולה להיות מלווה בתופעות לוואי, כגון מחשבות אובדניות, תוקפנות, עייפות, סחרחורת, תחושת סחרור, כאב ראש, נדודי שינה, סיטוסים, יובש בפה, ירידה בתיאבון, בחילה, שלשול, עצבנות, חוסר מנוחה, לבבול, צלצולים באוזניים, תחושת קעקעץ או לעיתים נדירות תחושת של שוק חשמלי, חולשה, הזעה, פרכוסים או תסמינים דמויי שפעת, בעיות ראייה ועלייה בלחץ הדם (אשר עלולה לגרום לכאב ראש, סחרחורת, צלצול באוזניים, הזעה וכו').

הרופא יתנה אותך כיצד להפסיק את הטיפול בתרופה באופן הדרגתי. זה יכול לקחת פרק זמן של מספר שבועות או חודשים. יתכן שבחלק מהמטופלים ההפסקה צריכה להתרחש בהדרגתיות יתרה במשך חודשים או יותר. אם הגן חווה כל אחד מהתסמינים הללו או תסמינים מדאגים אחרים, היוועץ ברופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהגן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הגן זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באפקסור™ XR עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסכול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא או לחדר מיון בהופעת אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות:**

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע ב- עד 1 מתוך 100 אנשים):**

• גליפות של הפנים, הלשון, הפה, הגרון, הגחון, הידיים או כפות הרגליים ו/או פריחה מגרדת ובוולט (סרפדת), קושי בבליעה או בנשימה.

**תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע ב- עד 1 מתוך 1,000 אנשים):**

- פריחה חמורה בעור, גרד או חרלת (נגעים בולטים בעור בצבע אדום או חסרי וצבע שבידך כלל מגרדים)
- סימני תסמונת סרטונת (סרטונין שעשויים לכלול: אי-שקט, הזיות, חוסר קואורדינציה, קצב לב מהיר, עלייה בחום הגוף, שינויים מהירים בלחץ הדם, רפלקסים מוגברים, שלשול, תרדמת, בחילה, הקאה, תסמונת סרטונין בצורתה החמורה ביותר יכולה להידמות לתסמונת נוירולפטית ממאירה (NMS). סימינים ותסמינים של תסמונת זו עשויים לכלול שילוב של חום גבוה, קצב לב מהיר, הזעה, נוקשות שרירים חמורה, לבבול, עלייה באנזימי השריר (נקבע בבדיקת דם).
- סימינים של זיהום כגון חום גבוה, צמרמורת, רעד, כאבי ראש, הזעה ותסמינים דמויי שפעת. אלה עלולים לנבוע מהפרעה במערכת הדם, המובילה לסיכון מוגבר לזיהומים.
- פריחה חמורה שעלולה לגרום לשלפוחיות חמורות וקילוף של העור.
- כאבי שרירים בלתי מוסברים, רגישות או חולשה. אלו עלולים להיות סימינים של תמס שרירים (רבדומיליוסיס).

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):**

• סימינים ותסמינים של מצב ההכונה "תסמונת הלב השבור" (stress cardiomyopathy או takotsubo cardiomyopathy) אשר עשויים לכלול כאב בחזה, קוצר נשימה, סחרחורת, התעלפות, קצב לב לא סדיר.

תופעות לוואי אחרות שעליך לספר לרופא עליהן כוללות (שכיחותן של תופעות לוואי אלה מופיעה למטה תחת "תופעות לוואי נוספות שעלולות להתרחש"):

- שיעול, צפצפוסים וקוצר נשימה עלולים להיות מלווים בחום גבוה
- צואה שחורה או דם בצואה
- גרד, עור צהוב או עיניים צהובות, או שתן כהה, אשר עלולים להיות תסמינים של דלקת כבכד (הפטטיסיס)
- בעיות לב כגון קצב לב מהיר או בלתי סדיר, עלייה בלחץ הדם
- בעיות עיניים כגון טשטוש ראייה, אשונים מורחבים
- בעיות עצביות כגון סחרחורת, תחושת סיכות ומחטים, קושי בתנועה (התכווצות או נוקשות שרירים), פרכוסים או עוויתות
- בעיות פסיכיאטריות כגון היפראקטיביות ותחושה יוצאת דופן של התרגשות יתר
- תופעות גמילה (ראה בפרק 3 בעלון "כיצד תשתמש בתרופה?, אם אתה מפסיק את נטילת התרופה")
- דימום ממשך - הדימום עלול להמשך זמן ארוך יותר מהרגיל במידה נאפצעת או נחתכת

**אם הגן מבחין בכדורים לבנים קטנים או גרנולות בצואה בעת הטיפול באפקסור™ XR, אין צורך לדאוג. כל כמוסה של אפקסור™ XR מכילה ספרואידים (כדורים לבנים קטנים) שמכילים את החומר הפעיל ונלפאקסין. הספרואידים שבכמוסה משתחררים בקיבה שלך והחומר הפעיל שבתוכם משתחרר באיטיות במהלך המעבר שלהם בקיבה ובמעיים. המעטפת של הספרואידים אינה מתמוססת ומופרשת בצואה. כלומר, המנה הנדרשת נספגה למרות הופעת ספרואידים בצואה.**

#### תופעות לוואי נוספות שעלולות להתרחש

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (עשויות להופיע ביותר מ- 1 מתוך 10 אנשים):**

- סחרחורת, כאבי ראש, נמנום
- נדודי שינה
- בחילה, יובש בפה, עצירות
- הזעה (כולל הזעת לילה)

#### תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים):

• ירידה בתיאבון

• לבבול, הרגשה של ניתוק מעמך, העדר סיפוק מיני, ירידה בחשק המיני, חוסר מנוחה, עצבנות, תלמונות חריגים

• רעד, תחושת אי-שקט או חוסר יכולת לשבת או לעמוד ללא תזוהה, תחושת סיכות ומחטים, שינויים בחוש הטעם, עלייה במחח השריר

• הפרעות ראייה כולל טשטוש ראייה, אשונים מורחבים, חוסר יכולת של העין להעביר מיקוד מעממים רחוקים לקרובים

- צלצולים באוזניים (טנטון)
- קצב לב מהיר, הרגשה של דפיקות הלב
- עלייה בלחץ דם, הסמקה
- קוצר נשימה, פיהוק
- הקאה, שלשול
- פריחה קלה, גרד

• עלייה בתדירות מתן שתן, חוסר יכולת להטיל שתן, קושי במתן שתן ווסת לא סדירה (בנשים) כגון: דימום מוגבר או עלייה בדימום לא סדיר, בעיות בשפיכה/הגעה לאורגזמה (בגברים), הפרעות בקפה (אין אונות) חולשה, עייפות, צמרמורת

- עלייה במשקל, ירידה במשקל
- עלייה ברמות הכולסטרול

**תופעות לוואי לא שכיחות (עשויות להופיע ב**