



עלון לצריך לפני תקנות הרווחים (נכשויים) התשמ"י – 1986
התוורפה משוחרת על פ"י מרשם רופא בלבד.

הרין, הנקה ופוריות

הрин

אם את הרין, נכנסת להrinן או מתכנתת להrinן או מתקנת לאירוע רפואי, פנה מיד לרופא של רין על הסיכון והווראות דומות עלולות לגרום לתעופות לאי-נברברים. אם לתקת אפייר במהלך הרין שלר, הרופא שלר עשו לחותה על פיה או בזקנות דם ריגולות ולביקות אבחנויות נוספות כדי לתקן תרופה HIV במחלק הרין, היתרנוillard. בילויים שאומתויהם לקחו תרופה TsIs נספחים כחלק הרין, היתרנו של ההגנה מפני HIV עליה על הסיכון של תרופה לואו.

הנקה

נשימן נשיאו HIV חיוב להמנע מהנקה, מכיוון שזיהום של HIV עלול לבורר לתינוק בחלב אם. מנתה קטנה של המרכיבים באפייר יכול גם היא לעבור לחלב האם של.

אם את נינקה או חשבת להrin:

← דבר עם הרופא שלר מייד.

נרגזה ושימוש במכונות

לא סבר לשאפרר תרשיף על יכולת לנhog או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של אפייר

אם אתה סוכרתי, אנא שם לב של מיל מהנה (150 מ"ג = 15 מ"ל).

אפייר מכיל סוכרם סוכרם. אם אמר לך על ידי הרופא שלר שיש לך-

ביבול לsockים ומיטים

אפייר מכיל גם חומרם משמרם (פאראדוודוקס'טנאמיט) העולמים גורם לתגובהם של חומרם (תיתכן תגובה מאוחרת).

תרופה זו מכילה 300 מ"ג פרופילן גליקול בכל 15 מ"ל תרופה.

אפייר מכילנה ונרת

תרופה זו מכילה 39 מ"ג נתרן בכל 15 מ"ל. מנתה זו מהוה 1.9% מצרכת הנרתן היומיות המקסימלית המומלצת למבוגרים.

3. כיצד השתמש לפ'י הרווחת הרופא?

תמיד יש להשתמש לפ'י הרווחת הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח את סירותם של תרופה או סוכרים אחרים בטיחותם.

אין לעבור על המנה המומלצת

ניתן לך שאפריר עם או ללא מזון.

השר ברקש קבוע עם הרופא שלר

אפייר סוכרים שלשול במצבר. עליך להמשך לחתת אותה כל יום כדי-

למנוע תרופה מחלות זיהום HIV.

← שומר על קשר עם הרופא שלר ואל תפיסק לחתת אפייר מבלי להזעק ברופא שלר.

המיןן ואופן הטיפול ייקבע על ידי הרופא בלבד. **המיןן המקבול בדרכך**

כל הוא:

ביבור, מתפרקם ולודים השקלים לפחוט 25 ק"ג

המיןן המקבול בדרכך כל של אפייר הינו 30 מ"ל ליום (300 מ"ג) שילך-כך – 15 מיל (150 מ"ג) פעמיים ביום (בஹרים של כ-12 שעות בין כל מהנה) או כ-30 מיל (300 מ"ג) פעם ביום.

ילדים מגיל 3 חודשים השקלים פחות מ-25 ק"ג

המיןן המקבול בדרכך האך של הילך.

פעמיים ביום (בஹרים של כ-12 שעות בין כל מהנה) או 1 מיל/ק"ג (10 מ"ג/ק"ג) 10 מ"ג/ק"ג) פעם ביום.

השתמש במרקם המדודה לפחות דרך הפה המסתפק עם האירוע כדי-

את המנה של רופא בפוך דודו.

1. הסר את אנטיפטפסיה הפלסטיק מההורק/מתאמם.

2. הפרד את המזרק למטראמ.

3. הסר את פקק בבקבוק.

שמור אותו בצורה מושתת, שי לחוץ מטה ובו מניט לשוב שמאלת-

(נד. צוין תשען).

4. הכנס את המזרק בחזקה לתוך המתאמם.

5. הכנס את המזרק בחזקה על פי.

6. הפסיק את הבקבוק עד שהמזרק עמידה.

7. משורח החוצה את בוכנית המזרק עד שהמזרק יכול את החלק

הראשון של המה ממלאה שלא.

8. הפוך את הבקבוק חוזה כלפי מעלה. **הסר את המזרק מהמתאמם.**

9. **הכנס את המזרק לפה, מקם את קבוצת המזרק בצד הגוף של**

החלץ. **לחץ את הבוכנית באטיות נינמה,** כדי לאפשר עזון לעלה.

אל תלחץ חוץ מידי ומתייעץ את הגולת להלך התחוו שאל הגורן בכדי-

למנוע חנק.

10. **חזר על שלבים 3 עד 7** באותה דרך עד לקיחת כל המנה במלואה.

לדגומגה, אם המנה היא 15 מיל, ציריך לקחת מזרק וחצי מלאים של תרופה.

11. **הוציא את המזרק מהבקבוק ושותוף** אותו ביטודיות בימי נקיים.

תן לו לתהיביש לתהיביש פג'ני שתשתמש בו שוב.

12. **הזר או את הבקבוק היטב עם הפקק,** השאר את הפקק על הקשה הפתוח של הבקבוק.

ולסובב לכיוון ימין (בכוון השעון) עד לגירה מלאה.

ש להשמד את התמיסה לשתייה חדש לאחר הפתיחה הראשונה.

אם לך ליליך יש בעיה בבליליות, המנה עשויה להשתנות.

← דבר עם הרופא שלר אם הדבר חל עלייך או עלך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין (Lamivudine) ולאלג'רנים (אלה סעיף 2 – מ"ז יעד השוב על חילך המורכבים של אפייר) וסעיף 6 – מ"ז יעד נסיך".

↔ בדוק עם הרופא שלר אם אתה סבר שזה חל עלייך.

אחדות מיחוזת הנגוזות לשימוש בתרופה:

יש אנשים הולכים אפייר או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ב絲ון ומוגר לחותות תרופה לאו זיהום מודע לטיסונים:

• אם היה לך רגש (אלרגי) לאלייבודין (Lamivudine) ולאלג'רנים או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

3. לפני השימוש בתרופות

א. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכולה שזה חל עלייך.

↔ בדוק עם הרופא שלר אם אתה סבר שזה חל עלייך.

אחדות מיחוזת הנגוזות לשימוש בתרופה:

יש אנשים הולכים אפייר או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ב一丝ון ומוגר לחותות תרופה לאו זיהום מודע לטיסונים:

• אם היה לך רגש (אלרגי) לאלייבודין (Lamivudine) ולאלג'רנים או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ב. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ג. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ד. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ה. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ו. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ז. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ח. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ט. אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

ט' אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

טט' אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

טטט' אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

טטטט' אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגי) לאלייבודין או טיפולים מסוימים אשרם ל-HIV שמצוירים בסיכון:

ככל שמדובר בזיהום זיהום ברמה נמוכה. היא גם מפחיתה את סירותם היומיות המומלצת למבוגרים:

תאי CD4 CD4+

ולאför להליכם ביהום.

ללא כל אחד מגביל טיפול באפייר באופןו או במקרה זה:

עלילות הטיפול שלר.

טטטטט'