

تحتوي كل قنينة على:

ريسيبيلام 60 مل

risdiplam 60 mg

يحتوي كل مل من محلول الشرب على 0.75 مل من ريسبيلام

* معلومات حول المركبات غير الفعالة ومساهمات الحساسية، انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" ، والبند 6 "معلومات إضافية".

• أقرأ النشرة بتمعن حتى تهيتها قبل استعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

• يُوصى هذا الدواء لعلاج مرضك أو مرض ابنك، لا تعطيه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك أنّ مرضهم/ حالتهم الصحية شبيهان.

1. لم أعد هذا الدواء؟

لعلاج ضمور العضلات الشوكية (SMA) من النوع 1، 2 و 3 لدى المتعالجين بدءاً من عمر شهرين وأكثر.

المجموعة العلاجية: أدوية لمعالجة اضطرابات في الجهاز العصبي- العضلي.

يحدث ضمور العضلات الشوكية (SMA) نتيجة نقص في بروتين يدعى SMN (survival motor neuron).

يؤدي نقص في بروتين SMN لدى ابنك إلى فقدان العصيّنات الحركية التي هي خلايا عصبية تسيطر على العضلات، مما يؤدي إلى ضعف العضلات.

كيف يعمل إيفريسيدي:

يساعد ريسبيلام، المركب الفعال في إيفريسيدي، الجسم على إنتاج بروتينات SMN، وهكذا ينخفض فقدان العصيّنات الحركية وبالتالي قد تحسّن طريقة عمل العضلات لدى الأشخاص الذين لديهم SMA.

2. قبل استعمال الدواء**يمتنع استعمال الدواء إذا:**

• وُجدت لديك أو لدى ابنك حساسية (أرجية) لريسيبيلام أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).

إذا لم تكن متاكداً، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال إيفريسيدي.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

• استشر الطبيب أو الصيدلي قبل أن تتناول أنت أو ابنك إيفريسيدي.

قبل بدء العلاج بإيفريسيدي أخير الطبيب إذا:

• كنت حاملاً أو خططت للحمل أو إذا كنت رجلاً بالغًا تخطّط لأن يكون لديك طفل. قد يؤدي العلاج بإيفريسيدي إلى ضرر لدى الجنين أو قد يؤثّر في الإخصاب لدى الرجل. لمزيد من المعلومات انظر البند "الحمل، الإرضاخ والخصوبة".

• كنت تعاني أنت أو ابنك من عدم تحمل (حساسية) بعض السكريات.

• حصلت في الماضي على علاج ورائي لـ SMN1.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء ليس معداً للرضع دون سن شهرين.

إذا كنت أنت أو ابنك تتناولان، أو إذا تناولت أنت أو ابنك مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طيبة

ومكملات غذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك لا سيما إذا كنت أنت أو ابنك تتناولان أو تناولتما في الماضي:

• منفوريدين – دواء يستعمل لعلاج السكري من النوع 2

• أدوية أخرى لعلاج ضمور العضلات الشوكية (SMA)

استعمال الدواء والغذاء

يجرب تناول إيفريسيدي بعد الوجبة.

الحمل، الإرضاخ، والخصوبة

يجرب تناول إيفريسيدي أثناء الحمل.

لا يجوز تناول الدواء خلال فترة الحمل ضرراً بالجنين.

• قبل بدء العلاج بإيفريسيدي، يوصي لك الطبيب بإجراء فحص حمل، لأن إيفريسيدي قد يلحق ضرراً بالجنين.

• إذا أصبحت حاملاً أثناء العلاج بإيفريسيدي عليك إبلاغ الطبيب فوراً.

يقرر الطبيب معك ما هو الأفضل لك والجنين.

وسائل منع الحمل

لا يجوز أن تصبحي حاملاً.

• أثناء العلاج بإيفريسيدي

بعد مرور شهر على إيقاف العلاج بإيفريسيدي

يجب التحدث مع الطبيب عن وسائل منع الحمل الملائمة التي عليك أنت وشريك حياتك استعمالها خلال فترة العلاج

بإيفريسيدي وطوال شهر واحد بعد وقف العلاج.

للرجال

إذا كانت شريكة حياتك في سن الإخصاب، يجب الامتناع عن الحمل.

عليك استعمال وسائل منع الحمل أثناء العلاج

بإيفريسيدي وطوال 4 أشهر بعد وقف العلاج.

الإراضع

لا يجوز الإرضاخ أثناء تناول الدواء، لأنه من غير المعروف فيما إذا كان إيفريسيدي قادرًا على أن ينتقل إلى حليب الأم.

لهذا قد يلحق ضرراً بالطفل.

عليك استشارة الطبيب إذا كان يتعين عليك التوقف عن الإرضاخ أو عن العلاج بإيفريسيدي.

الخصوصية لدى الرجل

استناداً إلى النتائج التي شوهدت لدى الحيوانات، قد يلحق إيفريسيدي ضرراً بالخصوصية لدى الرجل خلال العلاج وطوال

4 أشهر بعد تناول الجرعة الأخيرة، إذا كنت تخطّط لأن تجب طفلًا، استشر الطبيب.

لا يجوز التبرع بالمني أثناء العلاج وطوال 4 أشهر بعد تناول الجرعة الأخيرة من إيفريسيدي.

السيادة واستعمال الماكينات

لا يتوثر إن إيفريسيدي على قدرتك على السيادة أو تشغيل الماكينات لأن إيفريسيدي لا يؤثّر أو أنه يؤثّر قليلاً في القدرة

على السيادة وتشغل الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

• يحتوي إيفريسيدي على كمية قليلة من الصوديوم (الملح) – في جرعة يومية قصوى مقدارها 5 مل من إيفريسيدي 6.6 مل من 0.75 مل/مل محلول للشرب هناك أقل من 23 مل (1 مل/مول) من الصوديوم. لهذا يعتبر الدواء "خالي من الصوديوم" ويمكن استعماله في حالات التغذية التي تتضمن كمية محدودة من الصوديوم.

• يحتوي إيفريسيدي على 0.375 مل من بنزوات الصوديوم في كل مل. قد يزيد بنزوات الصوديوم من البرقان (أصغر

الجلد والعينين) لدى الرضّن بعد الولادة حتى عمر 4 أسبوعي).

• يحتوي إيفريسيدي على 2.97 مل من إيزومالت في كل مل. إذا أخبرك الطبيب بأن لديك أو لدى ابنك عدم القدرة على تحمل (حساسية) سكريات معينة، عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

عليك أن تتحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

عليك أن تتحقق مع الطبيب على إيفريسيدي من الصيدلانية وهو على شكل سائل في قنينة (محلول للشرب). إذا كان الدواء في القنينة على شكل مسحوق، فلا يجوز اتصاله بالصيادة، ويجب الاتصال بالصيدلانية. تشمل العبوة على تعليمات تحضير الدواء معاً

لصيدلانية وعلى تعليمات استعمال الدواء المعدة لك. عليك قراءة تعليمات استعمال الدواء بعناية.

الجرعة الدوائية

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي:

الجرعة اليومية الموصى بها	الجرعة والوزن
بدءاً من سن شهرين وحتى سنين	0.20 مل/كم
سن عاشر فصاعداً (أقل من 20 كغم)	0.25 مل/كم
سن عاشر فصاعداً (20 كغم فصاعداً)	5 مل

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

- عليك أن تحصل على إيفريسيدي من الصيدلانية وهو على شكل محلول للشرب.
- يجب تناول إيفريسيدي مرة واحدة في اليوم بعد الإصداع، في حال كان ابنك يتغدى على حليب الأم، في ذات الساعة تغدى ابنك كل يوم. بعد التناول، يجب شرب الماء التالك من ابتلاع الجرعة بالكامل.

- لا يجوز خلط إيفريسيدي مع تركيبة تغذية للأطفال أو مع الحليب.
- يجب تناول/إعطاء إيفريسيدي مع تركيبة تغذية من القنبلة الفموية. إذا لم يتم تناول الدواء خلال 5 دقائق منذ نقله إلى المحفنة، يجب تخلص من هذا الدواء في المحفنة الفموية.

- إذا كنت أنت أو ابنك غير قادرٍ على الابتلاع أو إذا كان لديك أو لدى ابنك أنبوب آمني معدني (tube)، أو أنبوب آمني غير معدني، يمكن إعطاء إيفريسيدي عبر الأنابيب، ويجب شطف الأنابيب بعد إعطاء إيفريسيدي.

- إذا لامس إيفريسيدي جلدك أو جلد ابنك، يجب شطف المنطقة بالماء والصابون.

معلومات عن كيفية تناول جرعتك عبر المحفنة الفموية متعددة الاستعمال المضمنة في العبوة يجب قراءة تعليمات استعمال الدواء بعناية. يمكن أن تتناول أنت أو ابنك الدواء عبر الماء أو عبر الأنابيب.

إذا تناولت أنت أو ابنك جرعة مفرطة من الدواء أو إذا أتيحت طفال بالخطأ من هذا الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحبًا معك بذرة الدواء.

إذا تناولت أنت أو ابنك تناول جرعتك أو إذا أتيحت لها بعد تناول الجرعة

- إذا تناولت جرعة مبنية على شهرين أو أقل من الوقت الاعتيادي لتناول إيفريسيدي، يجب تناول أو إعطاء الجرعة المنسنة في أسرع وقت ممكن.

- إذا تناولت جرعة مبنية على شهرين أو أكثر من الموعود الاعتيادي لتناول إيفريسيدي، يجب تخلصي الجرعة المنسنة وتناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي من اليوم القادم. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنسنة.

- إذا تناولت أنت أو ابنك بعد تناول جرعة إيفريسيدي، أو إذا لم يتم ابتلاع الجرعة بالكامل، فلا يجوز تناول جرعة إضافية.

- يجب تناول الجرعة التالية في اليوم التالي في الوقت الاعتيادي في اليوم القادم. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استخدام إيفريسيدي من دون استشارة الطبيب.

إذا كانت لديك أسلة إمساكية (إمساكية بال نسبة إلى استعمال الدواء فأنت في الموضعية إلى استعمال الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال إيفريسيدي أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل الآتعاني من أي منها

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض ظهرت لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

• إسهال

• طفح

• صداع

• حمى

أعراض جانبية شائعة (أعراض ظهرت لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

• غثيان

• قرحة في الفم

• عدوى في المثانة البولية

• الالم في المفاصل

تم الإبلاغ عن العارض الجانبي التالي منذ بدء تسويق إيفريسيدي، ولكن وثيرته ليست معروفة:

- التهاب أو عدوى معدوية صغيرة يؤثر تدريجياً في الجلد (التهاب وعاني جدّي)

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبيةيمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بحسب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة على الرابط (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استماراة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>**5. كيف يخزن الدواء؟**

تحت التسمم يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متداول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأل الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تُسبّب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

شروط التخزين قبل التحضير (المسوخ):

لا يجوز تخزين المحلول على درجة حرارة أعلى من 25°C. يجب تخزين الدواء في القنبلة الأصلية لحمايته من الضوء.

على الحصول على شكل مسحوق، فلا يجوز تناول إيفريسيدي ويجب التوجه إلى الصيدلي.

يبيق محلول الشرب سبعة أيام على شفاعة الدواء. يُسخّل الصيدلي تاريخ انتهاء الصلاحية " يجب التخزين بعد تاريخ" على عبوة الدواء.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من ذات الشهر.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة ريسبيلام، يحتوي الدواء أيضًا على:

mannitol, isomalt, strawberry flavour, tartaric acid, sodium benzoate, macrogol/ polyethylene glycol 6000, sucralose, ascorbic acid, disodium edetate dihydrate

كيف يبيّن الدواء وما تحوّل العبوة؟

تحتوي كل عبوة على قنبلة واحدة، ملائمة لقنبلة الصيدلانية، محاقة لها عبارة عنوان الشركة، متعددة الاستعمال - محتويات حجم كل منها 6 مل ومحققين حجم كل منها 12 مل مع علامات تساعدك على سحب الجرعة الصحيحة.

• إيفريسيدي هو مسحوق لتحضير محلول للشرب، يسوق على شكل محلول للشرب بعد أن يحضره الصيدلي. لون المحلول أصفر مخضر حتى أصفر.

صاحب التسجيل وعنوانه: شركة روشن الصيدلانية (إسرائيل) م.ض.، هرارش 6، ص.ب. 6391، هشارون 4524079.

www.roche.co.il

اسم المنتج وعنوانه: هوفمان لاه روشن م.ض.، CH-4070، بازل، سويسرا.

تم تحريرها في كانون الثاني 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 99-36630-71-167.

لتيسطيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدوا معن لكان الجنسيين.