

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אובייטרל® 250 מיקרוגרם

תמייסה להזרקה תת עורית

mezrik mokon la hzirka
ut mokon la hzirka

החומר הפעיל וຄומתו:

קוריאוגונדוטרופין אלפא 250 מק"ג/0.5 מ"ל השווה ל- 6500
Choriogonadotropin alfa 250 mcg/0.5 ml equivalent to 6500
חוורמים בלתי פעילים – ראי סעיף 6.

קראוי בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנו אל הרופא או אל הרוקח. שימרי את העلون בהישג יד. יתכן שתצטרכិ לעיין בו שוב.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורי. אל תעבiri אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
אם את חוות תופעות לוואי מכל סוג שהוא, דברי עם הרופא שלך או הרוקח. זה כולל כל תופעת לוואי אפשרית שאינה רשומה בעلون זה.

1. למה מיועדת התרופה

התכשיר אובייטרל מכיל תרופה הנקרואט כוריאוגונדוטרופין אלפא המיוצרת בטכנולוגיה של DNA רקוביננטית. כוריאוגונדוטרופין אלפא דומה להורמון אשר נמצא באופן טבעי בגוף הנקרוא כורוניין גונdotropin הקשור למערכת הרבייה ולפוריות.
אובייטרל משמש ביחד עם תרופות אחרות:

- לעזר בהתפתחות והבשלה של מספר זקנים נשים העוברות טיפול הפריה כגון הפריה חוץ גופית (IVF). תרופות אחרות ינתנו תחיליה על מנת להביא להתפתחות של מספר זקנים.
- לעזר בשחרור ביצת מהשלה בנשים אשר אין מביצות או נשים המביצות לעיתים רחוקות. תרופות אחרות ינתנו תחיליה לצורך התפתחות והבשלה של הזקנים.

קבוצה רפואיית: הורמוניים גונdotרופינים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- את רגישה (אלרגיה) לחומר הפעיל כוריאוגונדוטרופין אלפא, או לאחד ממרכיבי התרופה (ראי סעיף 6).
- יש לך גידול בהיפופטלמוס או בבלוטת יותרת המוח (שניהם איזוריים במוח).
- יש לך שחלוות מוגדלות או שקי נזלים בשחלות (ציסות בשחלות) ממוקור לא ידוע.
- יש לך דימום וגינאלי ממוקור לא ברור.
- את סובלות מסרטן השחלות, סרטן הרחם או סרטן השד.
- יש לך דלקת ורידים חריפה או קריש דם בוורידים (הפרעות תרומבואמבוליות פעילות).
- יש לך מצב שאינו מאפשר הירון תקין, כגון גיל המעבר, גיל מעבר מוקדם (כשל שחלה),

או מום באיברי המין.

אל תשתמשי באובייטרל אם אחד מהמצבים שפורטו לעיל חל עלייך. אם אין בטוחה, היועצى ברופא שלך לפני השימוש בתרפיה.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרפיה

- עלייך ועל בן זוגך לתהיליך הפריון לעבר הערכתה על ידי רופא המנוסה בבעיות פוריות לפני התחלת הטיפול.

תסמונת גירוי-יתר של השחלה (OHSS - Ovarian Hyperstimulation Syndrome) הטיפול באובייטרל עלול להגדיל את הסיכון לפתח OHSS, מצב בו הזרקיקים מתפתחים יותר מדי והופכים לציסות גדולות.

אם את סובלת מכאב בבטן התחתונה, עולה במשקל במהירות, סובלת מהகאות או בחילות, או אם יש לך קשיי נשימה, **אל** תזריקי לעצמך את התרפיה, ואני מיד לרופא (ראי סעיף 4 "טופעות לוואי"). אם את מפתחת OHSS, יתכן שהרופא יאמר לך להימנע מקרים יחסית מין או להשתמש באמצעי מניעה חסימתיים (כגון קונדום, דיאפרגמה) במשך 4 ימים לפחות.

הסיכון ל-OHSS פוחת אם משתמשים במנה הרגילה של אובייטרל, ואם את תחת מעקב צמוד במשך כל מחזור הטיפול (כגון בדיקות דם לرمות אסטרדיול ואולטראסאונד).

הירון מרובה עוררים / או מומים מולדים

כאשר משתמשים באובייטרל, יש סיכון גבוה יותר להירון עם יותר מעובר אחד (hiryon maroba' overim, b'derek k'lta'otim) לעומת מתר להירון כתוצאה מהתüberות טבעיות. הירון מרובה עוררים עלול להוביל לסיבוכים רפואיים עוררים ובעור התינוקות שלו. כאשר עוררים טיפול רפואי, הסיכון להירון מרובה עוררים קשור לגילך, לאיכות ולמספר הביציאות המופורחות או העוררים המוחדרים. הירון מרובה עוררים ומאפיינים ספציפיים של זוגות עם בעיות פוריות (כגון גיל) עלולים להיות קשורים גם לעלייה בסיכון למומים מולדים.

הסיכון להירון מרובה עוררים פוחת אם את תחת מעקב צמוד במשך כל מחזור הטיפול (כגון בדיקות דם לرمות אסטרדיול ואולטראסאונד).

הירון חוץ רחמי (hiryon aktopofi)

הירון מחוץ לרחם (hiryon aktopofi) עלול להתרחש בנשים עם נזק בחיצרות (הציגו אשר מוביל את הביציאות מהשחלה לרחם). לכן, הרופא שלך צריך לבצע בדיקת אולטרסאונד מוקדמת לשולול אפשרות להירון חוץ רחמי.

הפלת טبيعית

ישנה סבירות גבוהה יותר לעבר הפלת טבעית בנשים אשר עוררות טיפול הפריה או גירוש שחלוות לייצור ביציאות, לעומת אישה ממוצעת.

בעיות בקנזרת דם (איורע תרומבואמבולוי)

שוחחי עם הרופא שלך לפני השימוש באובייטרל אם לך לאחד מבני משפחתך היו קריישי דם ברגליים או בריאות או התקף לב או شبץ. את עלולה להיות בסיכון גבוהה יותר לקריישי דם חמורים או להחמרהם של קריישי דם קיימים, עם הטיפול באובייטרל.

גידולים באיברי מין

היו דיווחים של גידולים בשחלות ובאיברי מין אחרים, הן שפירים והן ממאירים, בנשים שעברו משטרי טיפול מרובים לטיפול באירועי פריון.

בדיקות הירון

אם את עושה בדיקת הירון (דם או שתן) לאחר השימוש באובייטרל, ועד ל-10 ימים לאחר מכן, יתכן שתකבי תוצאה חיובית כוזבת. אם אין בטוחה, פני לרופא.

ילדות וمتבגרות
אובייטרל אינו מיועד לשימוש בילדות או מתבגרות.

תגובה בין תרופתיות
אם את לוקחת או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח.

הירון והנקה
אל תשתמש באובייטרל אם את בהירון או מיניקה.
אם את בהירון או מיניקה, היועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות
לא צפוי כי לאובייטרל תהיה השפעה על יכולת הנהוג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה
תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן למנה, ולכן נחשבת "נטולת-נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוחה בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן השימוש יקבעו על ידי הרופא בלבד.
המינון המקביל בדרך כלל הוא:
מזרק/עת אחד מוקן להזרקה (250 מיקרוגרם/0.5 מ"ל) הנitin ציריקה אחת.
הרופא יסביר לך מתי לבדוק להזריק את התרופה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

מזרק מוקן להזרקה:

- אובייטרל מיועד לשימוש תת-עוררי, כלומר ניתן להזרקה מתחת לעור.
- כל מזרק מוקן להזרקה הינו לשימוש חד פעמי בלבד. יש לשימוש רק בתמיסת צלולה ללא חלקיקים.
- הרופא או האחות יסביר לך כיצד להשתמש במזרק אובייטרל מוקן להזרקה.
- הזריקי את התרופה בהתאם להנחיות הרופא או האחות.
- לאחר ההזרקה, השליכי בבטחה את המזרק המשומש.


אופן השימוש – הוראות הזרקה:

אם את מזרקה אובייטרל בלבד, אנא קראי' היטב את ההנחיות הבאות:

1. שטפי את ידיך. חשוב שהידיים והאביזרים בהם את משתמשת יהיו נקיים ככל האפשר.
2. אספי את כל האביזרים שלהם תזדקק. אנא שמי' לב כי ספוגיות אלכוהול אין בכללות באריזה. מצאי אзор נקי והניחי את כל האביזרים:
 - 2 ספוגיות אלכוהול
 - מזרק מוקן להזרקה המכיל את התרופה

3. ההזרקה:
הזריקי מיד את התמיסה: הרופא או האחות הורו לך כבר היכן להזריק (לדוגמה - בטן או קדמת הירך). נגבי את האזור הנבחר להזרקה עם ספוגית אלכוהול.

לחצוי את העור בצביטה בין שתי אצבעותיך וגע כי בתנועת החדרה מהירה את מחת הזריקה בזווית של 90° - 45° . הזריקי מתחת לעור כפי שהדרכו אוטר. אין להזריק ישירות לתוך הוריד. הזריקי את התמיסה על ידי דחיפת הבוכנה בעדינות. הזריקי באיטיות את כל כמות התמיסה, ולאחר מכן הוציאי מיד את המחט מהעור ונקי את העור בעזרת ספוגית אלכוהול בתנועות סיבוביות.



4. השליכי את כל האביזרים בהם השתמשת: ברגע שסימנת להזריק, השליכי מיד את המזרק הריק למיכל לפסולת חדה. אם נותרה Tamishe שלא השתמשת בה יש להשליכה.

עת מוקן להזרקה:

- אם את מזריקה אובייטרל לעצמך, יש לקרוא ולעקוב אחר "הוראות שימוש" המשווקות באריזת הקרטון של התכשיר.
- אובייטרל מיועד לשימוש תת-עוררי, קלומר ניתן בהזרקה מתחת לעור.
- כל עט מוקן להזרקה הינו לשימוש חד פעמי בלבד.
- הרופא או האחות יסבירו לך כיצד להשתמש בעט אובייטרל מוקן להזרקה.
- הזריקי את התמיסה בהתאם להנחיות הרופא או האחות.
- לאחר ההזרקה, השליכי בבטחה את המחט המשומשת וזרק את העט.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר, תופעות של מינון יתר של אובייטרל אין ידועות, אולם תסמנות גירוי-יתר של השחלה עלולה להתרחש. ראי הסבר בסעיף 4. אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעל יلد מן התרפופה, פנו מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והביאו אריזת התרפופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרפופה, יש לדבר עם הרופא מיד כשנזכרת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדק הטעיות והמנה **בכל פעע** שהינך נטלה תרפופה. הרכיבי משקפיים אם הינך זקוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפופה, היועצי ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרפופה, השימוש באובייטרל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשמשות. אל תיבחלי במקרה רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבל, מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא מיד אם את מבחינה באחת מתופעות הלואוי החמורים הבאות – **יתכן שתציגרבי טיפול רפואי דוחף:**

- תגבות אלרגיות כגון פריחה, דופק מהיר או לא סדי, נפיחות של הלשון והגרון, התעטשות, צפוזים בנשימה או קושי חמור בנשימה. תופעות אלה נדירות מאוד (עלולות להופיע بعد משתמש אחת מתוך 10,000).
- כאב בבטן התחתונה, התנפחות הבطن או אי נוחות בבטן יחד עם בחילה או הקאות עלולים להיות תסמינים של תסמנות גירוי-יתר של השחלה (OHSS). זה עלול להוביל על תגובה יתר של השחלות לטיפול והתפתחות ציסודות שלחלתיות גדולות (ראוי גם סעיף 2 "تسمנת גירוי-יתר של השחלה"). תופעה זו הינה שכיחה (עלולה להופיע לאחר שימוש אחד מתוך 10).
- תסמנת גירוי-יתר של השחלה עלולה להוביל לחמרה עם שחלות מוגדלות באופן ניכר, ירידה בתפקות השתן, עלייה במשקל, קשי נשימה וצבירת נזלים אפשרית בבטן או בחזה. תופעה זו אינה שכיחה (עלולה להופיע לאחר שימוש אחד מתוך 100).
- סיבוכים חמורים של קרישי דם (אירועים תромבומאמבוליים), לעיתים ללא תלות ב-OHSS עלולים להתרכש לעיתים נדירות מאוד. זה עלול לגרום לכאבים בחזה, קוצר נשימה, שbez או התקף לב (ראוי גם סעיף 2 "בעיות בקרישת דם").

תופעות לוואי נוספת

- תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע לאחר השימוש אחת מתוך 10):
- כאב ראש
 - תגבות מקומיות באתר ההזרקה, כגון כאב, אדמומיות או נפיחות

- תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להופיע לאחר השימוש אחת מתוך 100):
- שלשול

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למ משרד הבריאות באמצעות ליציאה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין מחמירה או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה

- **מניע הרעליה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידיים וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תימנע הרעליה. אל תגרמי להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **מזרק מוכן להזרקה:** יש לאחסן במקרר בטמפרטורת החדר מתחת ל- 2°C . יש לשמור באזירה המקורית. ניתן לשמר אובייטרל בטמפרטורת החדר עד 25°C עד 30 יום, אך אין לקרר מחדש במהלך תקופה זו. אם במשך תקופה זו של 30 יום לא השתמש בתרופה יש להשליכה לפט.
- אובייטרל הינו לשימוש חד פעמי, כל תמיisha שלא השתמשו בה יש להשליכה.

- �ט מוכן להזרקה:** יש לאחסן במקירר בטמפרטורה של $2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$. אין להקפיא.
- אין לשתמש בתכשיר אם את מבחינה בסימני קלקלול, אם הנוזל מכיל חלקיקים או שאינם צלול.
- אין להשליך תרופות למערכת ניקוז השפכים (ביוב) או אשפה הבית. שאלי את הרוקח איך לזרוק את התרופות בהם אין משתמש יותר. אמצעים אלו יעצרו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

מזרק מוכן להזרקה:

Mannitol, L-methionine, poloxamer 188, diluted phosphoric acid, sodium hydroxide, water for injection

�ט מוכן להזרקה:

Mannitol, L-methionine, poloxamer 188, disodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, diluted phosphoric acid, sodium hydroxide, water for injection

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזירה**

מזרק מוכן להזרקה:

אובייטרל הינה תמיישה להזרקה המגיעה באזירה של מזרק יחיד מוכן להזרקה.

�ט מוכן להזרקה:

אובייטרל הינה תמיישה צלולה, חסורת צבע עד צהבהבה להזרקה בעט מוכן להזרקה. כל עט מכיל 0.5 מ"ל תמיישה ומגיע באזירה של עט אחד מוכן להזרקה ושתי מחטיטים להזרקה (אחת חולפית).

- בעל הרישום וכתובתו:** מרכז סרונו בע"מ, רח' הקישון 18, יבנה 81220
- שם הייצור וכתובתו:** MRC Serono S.p.A., Modugno (Bari), Italy
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 31099 74 132

נערך בדצמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.